АЙСЛЭНДЭР

СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА ICELANDER, 20 МЛ

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

АЙСЛЭНДЭР - СПРЕЙ С ПРИЯТНЫМ ВКУСОМ ДЫНИ



ПРИМЕНЯЙТЕ АЙСЛЭНДЭР ПРИ ПЕРШЕНИИ, ПОКРАСНЕНИИ И БОЛИ В ГОРЛЕ


КАК РАБОТАЕТ АЙСЛЭНДЭР?

Масляные экстракты УСПОКАИВАЮТ раздраженную, поврежденную и покрасневшую слизистую оболочку горла.
Они образуют защитный барьер, который ПРЕДОХРАНЯЕТ от нежелательного воздействия факторов окружающей среды.




ИСЛАНДСКИЙ МОХ

Экстракт исландского мха (лат. *Cetraria islandica* L. Ach.) содержит фенольные соединения, эфирное масло, полисахариды и флавоноиды. Полисахариды способствуют увлажнению и восстановлению слизистой оболочки. Обволакивающие компоненты образуют защитный слой, который уменьшает воспаление и стимулирует заживление мелких травм слизистой оболочки. Экстракт исландского мха также поддерживает нормальную деятельность дыхательных путей и иммунной системы.



МОРКОВЬ

(лат. *Daucus carota* L.)
Масляный экстракт моркови содержит антиоксиданты, такие как бета-каротин, витамины группы B, C, A, E, D, F и жирные кислоты.
Его компоненты увлажняют, уменьшают раздражение, а также успокаивают и регенерируют поврежденную слизистую оболочку.



ОБЛЕПИХА

(лат. *Hippophae rhamnoides* L.)
Масляный экстракт насыщен каротиноидами, витамином E и жирными кислотами. Облепиха обладает успокаивающим, уменьшающим раздражение, смягчающим действием.
Масло увлажняет и способствует ускорению заживления мелких травм слизистой оболочки.



КАЛЕНДУЛА


(лат. *Calendula officinalis* L.)
В состав масляного экстракта календулы входит множество биологически активных веществ (каротиноиды, сапонины, полисахариды), которые обладают противовоспалительным, антисептическим и регенерирующим действием.
Масло питает, смягчает и защищает слизистую оболочку от неблагоприятного воздействия внешних факторов и пересыхания, а также стимулирует заживление мелких повреждений и ожогов.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОСТАВ	В 1 МЛ, МГ	КОНЦЕНТРАЦИЯ В 3 ДОЗАХ, МГ	КОНЦЕНТРАЦИЯ В 6 ДОЗАХ, МГ	КОНЦЕНТРАЦИЯ В 9 ДОЗАХ, МГ
Водно-глицериновый экстракт исландского мха (*Cetraria islandica* L. Ach.)	2,00	1,11	2,22	3,33
Стандартизированный масляный экстракт моркови (*Daucus carota* L.), в состав которого входят:	14,00	8,29	16,58	24,87
Каротиноиды (на основе бета-каротина)	0,05	0,028	0,056	0,084
Стандартизированный масляный экстракт облепихи (*Hippophae rhamnoides* L.), в состав которого входят:	14,00	8,29	16,58	24,87
Пальмитиновая кислота	0,56	0,31	0,62	0,93
Стеролы (на основе ситостерола)	0,28	0,16	0,32	0,48
Каротиноиды (на основе бета-каротина)	0,018	0,01	0,02	0,03
Стандартизированный масляный экстракт календулы (*Calendula officinalis* L.), в состав которого входят:	1,21	0,67	1,34	2,01
Эфиры фарадиола	0,21	0,12	0,24	0,36
Стеролы (на основе ситостерола)	0,028	0,02	0,04	0,06
Каротиноиды (на основе бета-каротина)	0,01	0,005	0,01	0,015

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: подсолнечное масло, ароматизатор со вкусом дыни, масло розмарина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Следуйте инструкциям, указанным на рисунках **A B C.** Встряхните содержимое флакона, как показано на рисунке **A.** Снимите защитную крышку распылителя. Направьте трубку распылителя в полость рта (**B**) и нажмите дозатор 3 раза (**C**). После использования вытрите трубку распылителя бумажной салфеткой и верните трубку распылителя в исходное положение.
Не применяйте более 3 раз в день.
Предназначен для взрослых и детей старше 2 лет.
Спрей применяют до исчезновения симптомов болезни. Если ощущение дискомфорта и боль в горле не проходят после недели использования данного средства, следует проконсультироваться с врачом.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. У людей с повышенной чувствительностью (аллергией) к какому-либо компоненту продукта использование спрея может вызвать аллергические реакции (зуд, ощущение жжения, отек).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Не использовать при повышенной чувствительности (аллергии) к какому-либо компоненту в составе спрея. При возникновении аллергической реакции, немедленно прекратить использование спрея и обратиться к врачу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия флакона спрей использовать в течение 3 месяцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Изделие медицинского назначения не следует выбрасывать в канализацию или совместно с бытовыми отходами. Эти меры помогут вам защитить окружающую среду. Не применять изделие медицинского назначения при аллергии на любой из ингредиентов.
Не превышайте рекомендуемую суточную дозу.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
UAB «Innovative Pharma Baltics»,
Mokslininkų g. 6A, LT-08412, Вильнюс, Литва.

IPB nature & science

Форма выпуска и упаковка:
20 мл во флаконе с дозирующим устройством.
Один флакон в коробке вместе с инструкцией по применению.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CE