

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «БелАсептика»


В.А. Ходаль
«__» __ 20__ г.



Инструкция по применению

СРЕДА ПИТАТЕЛЬНАЯ СУХАЯ «СЕЛЕНИТОВЫЙ БУЛЬОН»
ТУ ВУ 100917107.203-2015

РАЗРАБОТЧИК
Химик-технолог
ЗАО «БелАсептика»

 И.А. Медведь
«__» __ 20__ г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая инструкция распространяется на среду питательную сухую «Селенитовый бульон» (далее по тексту – среда), предназначенную для накопления сальмонелл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям среда должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика или значение
1. Внешний вид	Мелкодисперсный порошок от светло-желтого до коричневого цвета
2. Концентрация водородных ионов (pH)	От 6,6 до 7,7
3. Специфическая активность	Селенитовый бульон должен обеспечивать во всех засеянных пробирках при посеве в 9 мл среды по 1,0 мл микробной взвеси из разведения 10^{-6} через 6 ч инкубации при температуре $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$ накопление каждого тест-штамма <i>S. paratyphi</i> ATCC 9150 и <i>S. tiphimurium</i> ATCC 14028, регистрируемого высевом на Эндо агар. Через 18-20 ч инкубации должен наблюдаться рост бесцветных колоний.
4. Показатель эффективности	Показатель эффективности должен быть не менее 10 (отношение среднего числа колоний <i>S. paratyphi</i> ATCC 9150 и <i>S. tiphimurium</i> ATCC 14028, выросших на чашках с Эндо агаром, либо на среде аналогичного назначения, после обогащения в течение 6 ч в селенитовом бульоне, к среднему числу колоний, выросших до обогащения.)
5. Показатель ингибиции	Показатель ингибиции должен быть не менее 3 (отношение среднего числа колоний <i>E.coli</i> ATCC 11229, выросших на чашках с Эндо агаром, либо на среде аналогичного назначения, до обогащения в селенитовом бульоне, к среднему числу колоний, выросших после обогащения в течение 6 ч).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Среда может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Хранение среды осуществляют в сухих, защищенных от света складских помещениях, вдали от нагревательных приборов. Избегать попадания прямых солнечных лучей и повреждающих упаковку воздействий.

Среда должна транспортироваться и храниться при температуре от плюс $2 ^\circ\text{C}$ до плюс $30 ^\circ\text{C}$.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением встряхнуть банку!

Навеску в количестве, указанном на этикетке для приготовления конкретной серии питательной среды, тщательно размешивают в 1 л дистиллированной воды, нагревают до температуры (55 ± 1) °C в течение 1-2 мин. Среду разливают в стерильные пробирки по 9 мл. Среду не стерилизуют.

Готовая к употреблению среда должна быть прозрачная, светло-желтого цвета. Готовую среду можно использовать в течение 7 суток при температуре хранения 2-8° C.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие среды установленным требованиям при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок годности – 2 года с даты изготовления среды.