Инструкция по применению

Игла для шприц-ручки для введения инсулина BD Micro-fine™ Plus

RU

Необходимо проконсультироваться у лечащего врача по поводу техники инъекции и выбора наиболее подходящей для Вас длины иглы. Для того чтобы ввести необходимую для Вас дозу лекарственного препарата, используя шприц-ручку, необходимо:

■ Провести проверку поступления в иглу лекарственного препарата после установки нового картриджа и перед каждой инъекцией

■ Для каждой инъекции следует использовать новую иглу, которая удаляется после каждой инъекции. Оставленная накрученной на шприц-ручке игла открывает доступ в картридж.

■ Ввести иглу под кожу, следуя рекомендации лечащего врача. После введения иглы нажмите кнопку введения инсулина на шприц-ручке и удерживайте ее минимум 5-10 секунд. Вытащите иглу. Если после инъекции инсулин продолжает выделяться из иглы, во время следующей инъекции удерживайте иглу под кожей более продолжительный период времени.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

RU

Необходимо проконсультироваться у лечащего врача по поводу техники инъекции и выбора наиболее подходящей для Вас длины иглы. Для того чтобы ввести необходимую для Вас дозу лекарственного препарата, используя шприц-ручку, необходимо:

■ Провести проверку поступления в иглу лекарственного препарата после установки нового картриджа и перед каждой инъекцией

■ Для каждой инъекции следует использовать новую иглу, которая удаляется после каждой инъекции. Оставленная накрученной на шприц-ручке игла открывает доступ в картридж.

■ Ввести иглу под кожу, следуя рекомендации лечащего врача. После введения иглы нажмите кнопку введения инсулина на шприц-ручке и удерживайте ее минимум 5-10 секунд. Вытащите иглу. Если после инъекции инсулин продолжает выделяться из иглы, во время следующей инъекции удерживайте иглу под кожей более продолжительный период времени.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

RU

Необходимо проконсультироваться у лечащего врача по поводу техники инъекции и выбора наиболее подходящей для Вас длины иглы. Для того чтобы ввести необходимую для Вас дозу лекарственного препарата, используя шприц-ручку, необходимо:

- Провести проверку поступления в иглу лекарственного препарата после установки нового картриджа и перед каждой инъекцией
- Для каждой инъекции следует использовать новую иглу, которая удаляется после каждой инъекции. Оставленная накрученной на шприц-ручке игла открывает доступ в картридж.
- Ввести иглу под кожу, следуя рекомендации лечащего врача. После введения иглы нажмите кнопку введения инсулина на шприц-ручке и удерживайте ее минимум 10 секунд. Вытащите иглу. Если после инъекции инсулин продолжает выделяться из иглы, во время следующей инъекции удерживайте иглу под кожей более продолжительный период времени.
- Рекомендуется выпонять инъекции под прямым углом к поверхности кожи без формирования кожной складки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

RU

Необходимо проконсультироваться у лечащего врача по поводу техники инъекции и выбора наиболее подходящей для Вас длины иглы. Для того чтобы ввести необходимую для Вас дозу лекарственного препарата, используя шприц-ручку, необходимо:

■ Провести проверку поступления в иглу лекарственного препарата после установки нового картриджа и перед каждой инъекцией

■ Для каждой инъекции следует использовать новую иглу, которая удаляется после каждой инъекции. Оставленная накрученной на шприц-ручке игла открывает доступ в картридж.

■ Ввести иглу под кожу, следуя рекомендации лечащего врача. После введения иглы нажмите кнопку введения инсулина на шприц-ручке и удерживайте ее минимум 5-10 секунд. Вытащите иглу. Если после инъекции инсулин продолжает выделяться из иглы, во время следующей инъекции удерживайте иглу под кожей более продолжительный период времени.

Becton Dickinson and Company
Специалист международного отдела регистрации/
International Regulatory Affairs Specialist
Адам Хаас/ Adam Haas

5-June-2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru