

PERSKINDOL



Active Gel

4 ml

Инструкция по применению

Что такое Perskindol Active Gel и когда его использовать?

Perskindol Active Gel – это гель предназначенный для охлаждения и вторичного согревания, содержащий в своем составе ментол и эфирные масла. Perskindol Active Gel имеет уникальное двойное действие, которое обеспечивает мгновенное охлаждающее и успокаивающее действие; в то же время нанесение геля стимулирует кровообращение, приводящее к комфортным ощущениям потепления и расслаблению мышц.

Рекомендуется использовать гель Perskindol Active для охлаждения и вторичного согревания с целью:

- чтобы облегчить и успокоить мышечную и легкую посттравматическую боль
- до и во время занятий спортом, путем втирания, чтобы стимулировать кровообращение и расслаблять мышцы, помогая предотвратить или успокоить мышечные боли и судороги
- после занятий спортом, чтобы охладить и расслабить напряженные мышцы

Каков состав геля Perskindol Active?

Состав: вода, каприловый / каприновый триглицерид, изопропиловый спирт, карбомер, ментол, эфирное масло сосны обыкновенной, трометамин, каприлиловый гликоль, акрилаты / C10–30 алкил акрилатный кроссполимер, неролиевое масло, эфирное масло грушанки лежачей (зимолюбки) содержит (метилсалицилат), этилацетат, эфирное масло бергамота, эфирное масло лимонной цедры, терпинеол, ацетат терпинеола, эфирное масло розмарина, эфирное масло лаванды узколистной, лимонен, линалоол, цитрал, гераниол, цитронеллол. Не содержит парабенов

Как использовать гель Perskindol Active?

Взрослым и детям старше 5 лет наносить тонкими слоями и втирать массирующими движениями в кожу несколько раз в день, на болезненный участок.

Важная информация

Perskindol Active Gel легко наносится на кожу, не оставляя жирных следов (при нанесении по назначению), оставляя руки, а также одежду чистой.

Не использовать Perskindol Active Gel в случаях повышенной чувствительности к салицилатам или другим ингредиентам, входящим в состав геля.

Не наносить на открытые раны или вокруг глаз. При попадании в глаза тщательно промыть водой.

Не применять в виде окклюзирующих повязок.

При непрерывном использовании более 21 дня рекомендуется перерыв в 3 дня.

Не должны использоваться детьми в возрасте до 5 лет. Хранить гель в недоступном для детей месте.

В качестве меры предосторожности не следует применять гель Perskindol Active Classic Gel во время беременности и при грудном вскармливании.

В случае возникновения нежелательных побочных эффектов необходимо прекратить применения геля. Если симптомы продолжаются, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Хранить продукт следует при температуре не выше 25°C.

Следует закрывать тубу должным образом после каждого применения.

Использовать Гель Perskindol Active можно только до даты, обозначенной «EXP» на упаковке.

Сделано в Швейцарии

Производитель:

VERFORA SA, Rte de Moncor 10
1752 Villars-sur-Glâne, Швейцария

Дистрибьютер (страна):

Имя дистрибьютора, адрес

CE

000000/01