Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом лечебным при искусственном анусе
БН3-02-01

1 Бандаж лечебный при искусственном анусе БН3-02-01 (далее бандаж) назначается больным со стомой в послеоперационный период после полного или частичного удаления кишечника. Бандаж способствует поддержке передней брюшной стенки у пациентов со стомой, профилактике образованию грыж в области стомы, служит для реабилитации при использовании дренажных приспособлений, снижает риск возникновения болевых ощущений, жжения или зуда, связанных с раздражением кожи вокруг стомы или с усиленной перистальтикой кишечника. Бандаж фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

1.2 Размер бандажа должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.


3 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье или без него, застегнуть на застежку текстильную «контакт», вывести калоприемник в отверстие, затем застегнуть клапан.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать застежку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом-поясом лечебным грыжевым (пупочным)
БН3-05, БН3-05-01

1 Бандаж-пояс лечебный грыжевой (пупочный) далее (бандаж) применяется при пупочных грыжах различной степени выраженности и вентральных грыжах различной локализации.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Режим ношения бандажа-пояса определяется лечащим врачом.

3 Бандаж рекомендуется надевать на нательное белье, в положении лежа.

4 Бандаж на теле фиксируется с помощью застёжки на пуговицы или крючки.

5 Грыжа удерживается пелотом и ремнём-подхватом.

6 Сняв бандаж рекомендуется ежелневно промывать тело тёплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем;

7 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- перед стиркой достать из кармана пелот;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не подвергать глажению.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом лечебным женским
БН3-03-01

1.1 Бандаж лечебный БН3-03-01 (далее – бандаж) назначается при опущении органов малого таза, слабости мышц стенок влагалища, выпадении и опущении шейки матки, вправимых паховых грыжах и грыжах белой линии живота у женщин. Бандаж служит для удержания органов малого таза в физиологическом положении, предотвращает дальнейшее опущении органов малого таза, создает правильное внутрибрюшное давление и ограничивает смещение внутренних органов.

1.2 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- дерматит, гнойничковая инфекция в области применения бандажа;
- невправимые грыжи;
- сдавливание и ущемление органов малого таза;
- синдром портальной гипертензии.

1.3 Размер бандажа должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, застегивать нужно начинать с нижнего крючка, затем застегнуть ластовицу и ремень-подхват.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- перед стиркой вынуть пелот из кармана;
- стирку производить вручную, при температуре воды 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом лечебным женским
БН3-03

1.1 Бандаж лечебный БН3-03 (далее – бандаж) назначается при опущении органов малого таза, слабости мышц стенок влагалища, выпадении и опущении шейки матки, вправимых паховых грыжах и грыжах белой линии живота у женщин. Бандаж служит для удержания органов малого таза в физиологическом положении, предотвращает дальнейшее опущении органов малого таза, создает правильное внутрибрюшное давление и ограничивает смещение внутренних органов.

1.2 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- дерматит, гнойничковая инфекция в области применения бандажа;
- невправимые грыжи;
- сдавливание и ущемление органов малого таза;
- синдром портальной гипертензии.

1.3 Размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.


2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать нужно с нижней пуговицы, затем затягивать и застегивать ластовицу и нижний ремень-подхват, далее застегнуть основной ремень-подхват.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110℃, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом грыжевым паховым двусторонним на широком эластичном поясе БН5-04-06

1.1 Бандаж грыжевой паховый двусторонний на широком эластичном поясе БН5-04-06 (далее – бандаж) назначается при двухсторонних прямых, косых пахово-мошоночных и паховых грыжах. Для профилактики увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактики развития одно- или двухсторонних грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле, а также для профилактики рецидивов грыж в послеоперационном периоде. Бандаж обеспечивает плотное прилегание пелота в области грыжевых ворот, надёжно удерживая грыжу во вправленном состоянии.

1.2 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- синдром портальной гипертензии;
- ущемление грыжи;
- невправимые грыжи.

1.3 Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.4 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер бандажа	0	1	2	3	4
Обхват бедер без учета живота , мм	780-870	880-970	980-1070	1080-1170	1800-1270

1.5 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом.

3 Бандаж рекомендуется надевать в положении лежа, после вправления грыжевого выпячивания. Пелоты вставляются в карманы бандажа с одной или двух сторон в зависимости от расположения грыжи.

4 Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело тёплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- перед стиркой застегнуть все застежки, вынуть пелоты из карманов;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не подвергать глажению.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом послеоперационным
БН3-08

1 Бандаж послеоперационный БН3-08 (далее – бандаж) назначается после операций по поводу грыж с неокрепшими послеоперационными рубцами, с рубцами после вторичного заживления раны, а также с целью профилактики расхождения послеоперационных рубцов. При обширных грыжах брюшной стенки назначается бандаж с пелотом на место расположения грыжевого кольца.

1.1 Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов. Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.2 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер бандажа	0	1	2	3	4	5	6
Обхват талии , мм	600-690	700-790	800-890	900-990	1000-1090	1100-1190	1200-1290

1.3 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.

3 Надевать бандаж в положении лежа на нательное белье.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать туловище.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- перед стиркой достать планшетки и пелот из карманов;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механических воздействий и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом грыжевым пахово-пупочным двусторонним
БН5-09-00

1 Бандаж грыжевой пахово-пупочный двусторонний БН5-09-00 (далее – бандаж) назначается для удержания двусторонних паховых грыж в сочетании с пупочной грыжей или другими грыжами передней брюшной стенки.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- дерматит, гнойничковая инфекция в области применения бандажа;
- невправимые грыжи;
- сдавливание и ущемление органов малого таза.

1.2 Размер бандажа должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье. Сначала следует неплотно застегнуть корпус на застежку текстильную «контакт», вправить грыжи, расположить пелоты над местами выпячивания грыж. Затем плотно зафиксировать корпус бандажа, застегнуть и отрегулировать подбедренники, подхваты. Вставить нужно аккуратно, придерживая паховые пелоты.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- перед стиркой вынуть пелоты из кармана и чехла;
- стирку производить вручную, при температуре воды 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом-поясом дородовым
БН1-03

1 Бандаж-пояс дородовый БН1-03 (далее – бандаж) предназначен для женщин в дородовый период для поддержания органов брюшной полости и плода в период второй половины беременности, и предупреждает растяжение, дряблость брюшной стенки и расхождение прямых мышц живота.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер бандажа	1	2	3	4	5
Обхват бедер без учета выступа живота , мм	850-940	950-1040	1050-1140	1150-1240	1250-1340

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.

3 Надевать бандаж в положении лежа на нательное белье.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать низ живота.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом-поясом дородовым
БН1-05

1 Бандаж-пояс дородовый БН1-05 (далее – бандаж) предназначен для женщин в дородовый период для поддержания органов брюшной полости и плода в период второй половины беременности и предупреждения растяжения, дряблости брюшной стенки и расхождения прямых мышц живота.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

1.2 Обхват бедер без учета выступа живота измеряют лентой сантиметровой по ТНПА, накладывая ее горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек и замыкая на правой стороне туловища.

Таблица 1

Размер бандажа	1	2	3	4	5
Обхват бедер без учета выступа живота , мм	850-940	950-1040	1050-1140	1150-1240	1250-1340

1.3 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливается врачом.

3 Надевать бандаж следует в положении лежа на нательное белье. Застегнуть сначала застежку основной детали, затем застежку ремня – подхвата.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать низ живота.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- перед стиркой вынуть планшетки из карманов;
- стирку производить вручную при температуре не выше 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механических воздействий и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- после высыхания вставить планшетки в карманы;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом послеродовым
БН2-01

1 Бандаж послеродовый БН2-01 (далее – бандаж) предназначен для женщин в послеродовый период для поддержания мышц брюшного пресса у женщин, а также при опущении внутренних органов малого таза, в послеоперационный период при слабости послеоперационных швов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер бандажа	0	1	2	3	4	5	6
Обхват талии, мм	600-690	700-790	800-890	900-990	1000-1090	1100-1190	1200-1290

1.2 При индивидуальном изготовлении размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.


3 Надевать бандаж следует в положении лежа на нательное белье.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать туловище.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механических воздействий и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом лечебным при искусственном анусе
БН3-02

1 Бандаж лечебный при искусственном анусе БН3-02 (далее – бандаж) назначается больным со стомой в послеоперационный период после полного или частичного удаления кишечника. Бандаж способствует поддержке передней брюшной стенки у пациентов со стомой, профилактике образования грыж в области стомы, служит для реабилитации при использовании дренажных приспособлений, снижает риск возникновения болевых ощущений, жжения или зуда, связанных с раздражением кожи вокруг стомы или с усиленной перистальтикой кишечника. Бандаж фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения.

Противопоказаниями к назначению являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.


2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье или без него, застегивать начиная с нижней пуговицы, вывести калоприемник в отверстие, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110℃, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом лечебным
БН3-00

1 Бандаж лечебный БН3-00 (далее – бандаж) назначается при опущении внутренних органов в послеоперационный период (опущение почек, печени, желудка и кишечника) при слабости послеоперационных швов, прогрессирующем истощении. Бандаж обеспечивает необходимое внутрибрюшное давление, ограничивает смещение внутренних органов.

Противопоказаниями к назначению бандажа являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.


2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать необходимо с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110℃, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за бандажом лечебным почечным
БН3-01

1 Бандаж лечебный почечный БН3-01 (далее – бандаж) назначается при опущении почек, почечно-каменной болезни, опухолях, пиелитах, послеоперационных грыжах и неокрепших рубцах или других послеоперационных состояниях.

Противопоказаниями: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом.

2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье.

3 Застегивать бандаж необходимо начиная с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку, застегивать ремень – подхват и подбедренники.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40℃ в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- утюжить при температуре не более 110℃, исключая эластичные вставки.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102302/1610

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru