Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
вул. Ажэшкі, 11, 230023, г. Гродна
тэл. (0152)73 10 73, факс 72 22 68
эл.пошта: pharmacia@mail.grodno.by
р/р BY81BLBB30120500059690001001 у Дырэкцыі ТАА «Белінвестбанк» па Гродзенскай вобласці, БІК BLBBBY2X АКПА 02013509, УНП 500059690

23.11.2020 № 5/11
на № _____ ад _____

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
ул. Ожешко, 11, 230023, г. Гродно
тел. (0152) 73 10 73, факс 72 22 68
эл.почта: pharmacia@mail.grodno.by
р/с BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК BLBBBY2X ОКПО 02013509, УНП 500059690

Инструкция по применению вложений, входящих в аптечку вида АУ-ГР ТУ BY 500059690.001-2008

1. Аммония раствор 10% - 1 мл № 10– применяют как раздражающее и отвлекающее средство для вдыхания или при обмороке, угаре. Ватный тампон или кусок марли смачивают раствором и подносят к носу на 0,5 – 1 с.
2. Валерианы экстракт 0,02 №50- вызывает умеренно выраженный седативный эффект при нервном возбуждении; расстройстве сна, связанные с перевозбуждением; мигрень; легкие функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой и пищеварительной системы. Внутрь, по 1-2 таблетки 3 раза в день .
3. Валидол 0,06 № 10 (0,1 № 20) – оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему, обладает умеренным сосудорасширяющим действием; применяют при легких приступах стенокардии, неврозах, истерии, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезнях. Таблетку или капсулу держат во рту (под языком) до полного растворения.
4. Глицерил тринитрат 0,0005 № 40 – сосудорасширяющее средство с преимущественным влиянием на венозные сосуды; применяется для купирования приступов стенокардии. Применяют по ½ - 1 таблетке помещают под язык и не проглатывают до полного рассасывания.
5. Дротаверин 0,04 № 40 – применяют при спазмах желудка и кишечника, спастических запорах, приступах желчно- и мочекаменной болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (лучше в сочетании с холинолитиками), иногда при спазмах периферических сосудов (эндартериит и др.). Принимают внутрь по 0,04 – 0,08 г (1 – 2 таблетки) 2 – 3 раза в день.
6. Йода раствор спиртовой 5%-1мл №10(флакон 10 мл)–применяют как противомикробное, обеззараживающее средство для наружного применения, смазывая края раны.
7. Калия перманганат 5,0 – применяют как антисептическое средство в водном растворе для промывания ран, полоскания рта и горла, промывания желудка. Применяют 0,1 – 0,5% растворы (слабо розовый раствор).
8. Кеторолак 0,01 №10 обладает выраженным обезболивающим, а также жаропонижающим и противовоспалительным действием. Применяется при болевом синдроме умеренной и сильной выраженности: послеоперационные боли, боли в суставах при травмах с разрывом связок, вывихи, растяжения; боли в спине и мышцах. Принимают внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч.
9. Лоратадин 0,01 № 10 (Цетиризин 0,01 №20) – применяется как антигистаминное, противоаллергическое, антиэкссудативное, противозудное средство при аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите, зудящих дерматозах, бронхиальной астме, аллергических реакциях на укусы насекомых. Принимают внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки до еды.
10. Магния сульфат 10,0 (20,0) – применяют в качестве слабительного, желчегонного средства, а также в качестве антидота при отравлениях. Как слабительное средство принимают внутрь (на ночь или натощак за полчаса до еды) 10-30 г в полстакане воды; как желчегонное – внутрь по 1 ст. ложке 20-25% раствора 3 раза в сутки. При отравлениях промывают желудок 1% раствором или дают внутрь 20-25 г в стакане воды.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. Натрия гидрокарбонат 10,0 (20,0) – применяют как антацидное средство при повышенной кислотности желудочного сока по 0,5 и – 1 г несколько раз в день; нейтрализующее кислоту средство при химических ожогах – в виде 2% раствора наносить на пораженные участки кожи, слизистых оболочек глаз или верхних дыхательных путей.

12. Нафазолин 0,1% (Ксилометазолин 0,1%) 10 мл – применяется как сосудосуживающее средство при остром рините, синусите, гайморите, ларингите,
носовых кровотечениях. Вводят интраназально (в нос) по 1-2 капли раствора в каждую ноздрю. При носовых кровотечениях – введение в полость носа тампонов, смоченных раствором.

13. Параскофен №10 - применяют при умеренно или слабо выраженный болевом синдроме различного генеза, для снижения повышенной температуры тела при простудных заболеваниях. Назначают внутрь (во время или после еды), по 1 таблетке каждые 4 ч. Цитрамон № 10 – применяется для устранения головной боли, невралгий, миалгий и как жаропонижающее средство при простудных заболеваниях. Принимают по 1-2 таблетки 2-3 раза в день.

14. Парацетамол 0,5 № 10 – применяют в качестве болеутоляющего средства при головной боли, невралгиях, миалгиях, в качестве жаропонижающего средства по 1 – 2 таблетки 2 – 3 раза в день.

15. Перекись водорода 3% - 40 мл – применяют в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего средства для промывания ран.

16. Сульфацетамид р-р 30% - 5 мл (20%-1 мл № 2) – применяют как антибактериальное средство для местного применения в офтальмологии (в виде глазных капель). Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капле 3-6 раз в сутки.

17. Уголь активированный 0,25 № 10 – применяют внутрь как адсорбирующее средство при пищевых интоксикациях, метеоризме, отравлениях солями тяжелых металлов, алкалоидами, гликозидами, лекарственными средствами и др. Принимают внутрь по 1-2-3 таблетке 3-4 раза в сутки. Для ускорения действия рекомендуется таблетки измельчить.

18. Бинты медицинские нестерильные 5м х 5см, 5 м х 10 см, 7м х 14 см – как перевязочное средство, накладываемое на поверхность тела, для фиксации стерильных перевязочных средств (тампоны, салфетки и т.п.) в зоне повреждения.

19. Вата гигроскопическая 50,0 – применяют как перевязочное средство и в виде тампонов для обработки глаз, раневых участков кожи и др.

20. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха – применяют для временной остановки кровотечения путем сжатия сосудов. Накладывают выше места ранения на одежду или предварительно подложенную ткань, под жгут помещается записка с указанием времени наложения жгута.

21. Лейкопластырь бактерицидный 4х10 (6х10) – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

22. Лейкопластырь 1 см х 500 см или 2 см х 500 см - применяется для фиксации повязок на ранах, а также для заклеивания ссадин и царапин.

23. Напальчник резиновый – используется для защиты раневой поверхности пальцев.

24. Ножницы тупоконечные – используются для разрезания одежды с целью открытия пораженных участков, а также для вскрытия упаковок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

25. Салфетки стерильные – применяются для изолирования раневых поверхностей от воздействия окружающей среды. Наложить салфетку, предварительно смоченную водой для улучшения контакта, на поврежденное место и зафиксировать лейкопластырем или бинтом.

26. Термометр медицинский – используют для измерения температуры тела.

Ген. директор — (должность)

(печать)

С.В. Местоев — (подпись) (инициалы, фамилия)

Зав. отделением по производству ИМН — К.А. Урбе

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
вул. Ажэшкі, 11, 230023, г. Гродна
тэл. (0152)73 10 73, факс 72 22 68
эл.пошта: pharmacia@mail.grodno.by
р/р BY81BLBB30120500059690001001 у Дырэкцыі ТАА «Белінвестбанк» па Гродзенскай вобласці, БІК BLBBBY2X АКПА 02013509, УНП 500059690

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
ул. Ожешко, 11, 230023, г. Гродно
тел. (0152) 73 10 73, факс 72 22 68
эл.почта: pharmacia@mail.grodno.by
р/с BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК BLBBBY2X ОКПО 02013509, УНП 500059690

23.11.2020 № 5/и
на № _____ ад _____

Инструкция по применению вложений, входящих в аптечку вида АТ-ГР.
ТУ BY 500059690.001-2008

1. Аммония раствор 10% - 1 мл № 10– применяют как раздражающее и отвлекающее средство для вдыхания или при обмороке, угаре. Ватный тампон или кусок марли смачивают раствором и подносят к носу на 0,5 – 1 с.
2. Йода раствор спиртовой 5% - 1 мл № 10 (флакон 10 мл) – применяют как противомикробное, обеззараживающее средство для наружного применения, смазывая края раны. Очистить кожу вокруг места поражения, нанести жидкость ватным или марлевым тампоном непосредственно на поврежденный участок и окружающую кожу.
3. Бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см, 5 м х 5 см – как перевязочное средство, накладываемое на поверхность тела, для фиксации стерильных перевязочных средств (тампоны, салфетки и т.п.) в зоне повреждения.
4. Бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см – перевязочное средство для открытых ран.
5. Бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, № 3, № 6 – применяется для фиксации повязок на конечностях и голове.
6. Вата гигроскопическая 50,0 – применяют как перевязочное средство и в виде тампонов для обработки глаз, раневых участков кожи и др.
7. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха – применяют для временной остановки кровотечения путем сжатия сосудов. Накладывают выше места ранения на одежду или предварительно подложенную ткань, под жгут помещается записка с указанием времени наложения жгута.
8. Лейкопластырь бактерицидный – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.
9. Лейкопластырь 1 см х 500 см или 2 см х 500 см – применяется для фиксации повязок на ранах, а также для заклеивания ссадин и царапин.
10. Ножницы тупоконечные – используются для разрезания одежды с целью открытия пораженных участков, а также для вскрытия упаковок лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
11. Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет – применяется в качестве холодного компресса при травмах (переломы, ушибы, гематомы, тепловые удары).
12. Салфетки стерильные – применяются для изолирования раневых поверхностей от воздействия окружающей среды. Наложить салфетку, предварительно смоченную водой для улучшения контакта, на поврежденное место и зафиксировать лейкопластырем или бинтом.

Ген. директор — С.В. Лесовец
(должность) (печать) (подпись) (инициалы, фамилия)

Зав. отделом по производству ИМН — К.А. Ус

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru