

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
изделия медицинского назначения
ЛАНТАМЕД
спрей для наружного применения

Состав на 1,0 г:

Лантана нитрат гексагидрат - 57 мг, полиэтиленгликоль 400 - 415 мг, глицерин - 20 мг, трометамол - 0,50 мг, вода очищенная до 1,0 г.

Описание:

Лантамед, спрей для наружного применения (далее - спрей) представляет собой бесцветную слегка опалесцирующую жидкость.

Свойства:

Спрей обладает восстанавливающим, успокаивающим, противоотечным, противомикробным и защитным действием. Его эффективность обусловлена свойствами входящего в его состав активного компонента. Лантана (III) нитрат оказывает ранозаживляющее, бактерицидное, противовоспалительное, обезболивающее и регенерирующее действие. Обеспечивает комплексную защиту кожного покрова и помогает его восстановлению. Спрей эффективно восстанавливает и защищает кожу при ожогах I-II степени, механических повреждениях (ушибах, синяках, ссадинах, мелких порезах), укусах разных видов насекомых, медуз, иглокожих (покраснение, припухлость, отек, зуд), может быть использован в качестве средства скорой помощи. Препарат ускоряет регенерирующие процессы в коже, восстанавливает ее природные защитные функции.

Лантамед не имеет противопоказаний к многократному и длительному применению.

Показания к применению:

Спрей может применяться у детей с 3 лет и взрослых с целью уменьшения сроков заживления, подавления микробной флоры, обезболивания при:

- порезах, ссадинах, потертостях, трещинах;
- спортивных и бытовых ушибах и растяжениях;
- для уменьшения отечности и зуда кожи при укусах насекомых (комары, осы, пчелы и др.);
- ожогах I-II степени.

Способ применения и дозы:

Перед первым применением спрея необходимо несколько раз нажать на распыляющую насадку, чтобы активировать работу распылителя.

Наносите препарат на поврежденные участки до 3 раз в день.

Повторяйте процедуру до полного исчезновения патологических изменений. Действие спрея сохраняется в течение 8 часов после нанесения.

Выполнение процедуры:

1. Снять с флакона защитный колпачок;
2. Распылить спрей на проблемный участок;
3. После применения очистить распылитель насадки флакона салфеткой, закрыть защитным колпачком.

Если спрей не использовался в течение 7 дней и более, необходима повторная прокачка распылителя, которая осуществляется путем нескольких нажатий на насадку до появления распыления спрея.

Побочные действия:

Возможно проявление аллергических и местных кожных реакций.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам спрея.

Меры предосторожности:

Избегать попадания спрея в глаза. При случайном попадании глаза можно промыть проточной водой.

Применение при беременности и лактации:

Данные по применению во время беременности и лактации отсутствуют.

Форма выпуска:

По 30 г во флаконе полиэтиленовом, укупоренным аэрозольным распылителем с защитным колпачком в пачке картонной с инструкцией по применению.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Не применяйте спрей после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Производитель:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс: +375 (212) 36-37-06, www.rubikon.by, e-mail: secretar@rubikon.by

