


Инструкция по применению

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


Горчичник требуемого размера отрезать ножницами. Перед применением горчичник-пакет (4 ячейки) встряхнуть в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по всем ячейкам пакета. Горчичник-пакет опустить, не изменяя положения, в воду, нагретую до температуры 37 °С на 15-20 сек, затем накладывать на кожу. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой.

Время процедуры – 5-20 мин (до появления стойкой красноты), у детей – 2, 3, 5 или 10 мин в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения необходимо ослабить на некоторое время прижим горчичника к телу или снять его, промыв водой участок кожи, на который он был нанесен.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.



Острый трахеит, бронхит,
пневмония, ларинготрахеит,
сухой загрудный кашель,
боль в сердце



Радикулит,
боль в мышцах



При боли в суставах



Общее недомогание
при реакции организма
на погоду

Изготовитель:

ИПУП «Мед-интерпласт», РБ, Минская обл.,
г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, комн. 204.

Тел./факс: 8 (01770) 2-30-72

ТУ ВУ 800000200/001-2004

Срок годности: 2 года.

Серия и дата изготовления
указаны на упаковке.




СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


Горчичник требуемого размера отрезать ножницами. Перед применением горчичник-пакет (4 ячейки) встряхнуть в горизонтальном положении для равномерного распределения порошка по всем ячейкам пакета. Горчичник-пакет опустить, не изменяя положения, в воду, нагретую до температуры 37 °С на 15-20 сек, затем накладывать на кожу. Для усиления эффекта горчичник закрывают полиэтиленовой пленкой и плотно прижимают к телу эластичным бинтом или другой повязкой.

Время процедуры – 5-20 мин (до появления стойкой красноты), у детей – 2, 3, 5 или 10 мин в зависимости от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения необходимо ослабить на некоторое время прижим горчичника к телу или снять его, промыв участок кожи, на который он был нанесен.


Хранить в сухом, защищенном от света месте.



Острый трахеит, бронхит,
пневмония, ларинготрахеит,
сухой загрудный кашель,
боль в сердце



Радикули,
боль в мышцах



При боли в суставах



Общее недомогание
при реакции организма
на погоду

Изготовитель:

ИПУП «Мед-интерпласт», РБ, Минская обл.,
г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, комн. 204.

Тел./факс: 8 (01770) 2-30-72

ТУ ВУ 800000200/001-2004

Срок годности: 2 года.

Серия и дата изготовления
указаны на упаковке.

