Box size: 5.5 x 7
Overall size: 18 x 22
Folds to: 3 x 5.5

COVIDIEN

SFS™
Reusable Skin Stapler

SM™
Skin Stapler Reload

1302746



EN

BEFORE USING PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

IMPORTANT!

This booklet is designed to assist in using the product. It is not a reference to surgical technique.

Refer to your facility's protocol for skin preparation, wound closure and removal. Only use reusable devices and reload or reprocessing of the SM™ skin staple cartridge that was used to its failure and subsequent staple ejection. Reprocessing and/or reremanufacture of the SM™ skin staples reload may cause the risk of contamination and patient infection. Do not reuse, reprocess or remanufacture the SM™ skin staples reload.

DESCRIPTION

SFS™ reusable skin stapler, together with SM™ skin staples reload, places skin staples each time the trigger is squeezed. The SFS™ reusable skin stapler is designed to place staples in one motion by holding the trocar together. There are different staple sizes, each contained in its own skin staples reload.

INDICATIONS

The SFS™ reusable skin stapler has applications in abdominal, gynecological, orthopedic, and thoracic surgery for closure of skin and fascia. Additional uses include: closure of incisions in vein stripping, thyroidectomy, and mastectomy procedures; closure of scalp incisions and for scalp flap harvesting; and for cosmetic skin closure.

CONTRAINDICATIONS

Do not use the reusable skin stapler for application directly over any clinical or in situ of an incident, bowtie, as cases of hypertrophic scar formation may occur. Do not use the reusable skin stapler in cases of allergy to stainless steel. Do not use the reusable skin stapler in the presence of infection. Do not use the reusable skin stapler in cases of bleeding or coagulation disorders. Do not use the reusable skin stapler in cases of subcutaneous tissue that is too thin to allow adequate penetration of the staple. Do not use the reusable skin stapler in cases of subcutaneous tissue that is too thick to allow adequate penetration of the staple. Do not use the reusable skin stapler in cases of subcutaneous tissue that is too thick to allow adequate penetration of the staple. Do not use the reusable skin stapler in cases of subcutaneous tissue that is too thick to allow adequate penetration of the staple.

ADVERSE EFFECTS / POTENTIAL RISKS

Adverse effects / potential risks associated with the use of the device include, but are not limited to: infection; pain; bleeding; tissue damage; allergic reaction; foreign body reaction; hypertrophic scar formation; keloid formation; dehiscence; necrosis; nerve damage; and/or other complications.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Do not remove the instrument from its container unless required.
2. Reusable devices must be carefully inspected prior to and after each use, as any damage may affect the performance of the device. Do not use the device if damage is found. Damage may cause malfunction, such as jamming, difficult operation, or unacceptable staple formation.
3. Devices with moving parts should be evaluated for proper function prior to application. If damage is suspected, contact your local representative for replacement or repair by the manufacturer.
4. Detergents and solutions for reusable devices should have a pH between 7.0 and 9.5.
5. Ventilation temperature should not exceed 273°F (135°C).

REPROCESSING INSTRUCTIONS

Reusable devices are supplied non-sterile. They must be cleaned and sterilized prior to use.

Repeated processing of the listed parameters has minimal effect on reusable devices. Wear and damage can be determined by frequency of use and inspection.

CAUTION: Reusable devices must be thoroughly inspected prior to and after each use, as any damage may affect the operation of the device. Failure to lubricate the device prior to sterilization may cause malfunctions such as jamming, difficult operation, or unacceptable staple formation.

Devices with moving parts should be evaluated for proper function prior to application. If damage is suspected, contact your local representative for replacement or repair by the manufacturer.

There's at least three reasons why devices with disposable valves:

Contaminants and Temperature. It is recommended that reusable instruments be reprocessed as soon as possible following use. They should be covered with a moist towel if reprocessing cannot be performed immediately.

Preparation for Cleaning. Reusable devices must be carefully disassembled prior to the cleaning process. Ensure that all accessible components are disassembled and cleaned. Refer to the manufacturer's instructions for disassembly.

Cleaning. Reusable devices must be thoroughly cleaned before they are sterilized. Failure to clean the device may result in the device not being sterilized. Ensure that all accessible components are cleaned and rinsed. Refer to the manufacturer's instructions for cleaning.

Sterilization. Reusable devices are provided non-sterile and are designed for reuse. They may be sterilized with the following process parameters:

Steam Sterilization

Pressure: Steam Cycle

Temperature: 270–275°F (132–135°C)

Dry Heat

Time: 4 minutes minimum of exposure, wrapped

Gravity Cycle

Temperature: 320–275°F (121–135°C)

Time: 15 minutes minimum of exposure, wrapped

Dry Heat

Time: 12 minutes minimum of exposure, wrapped

ETO Cycle

132°F (54°C), 600–700 mg/L, 40–60% RH, 2 hours exposure minimum, wrapped

160°F (38°C), 450–700 mg/L, 40–60% RH, 3 hours exposure minimum, wrapped

Maintenance: Visually inspect the instruments for damage or wear and check for proper function prior to each use.

Repeated autoclaving may tarnish or discolor instrument surfaces.

Packaging: Items may be placed in a Polyethylene pouch or standard hospital wrap.

Storage: Store at room temperature.

Additional Information: When sterilizing multiple instruments in one autoclave cycle ensure that the sterilizer manufacturer's stated maximum load is not exceeded.

1 SOMATIC VIEW

A) TOP VIEW

B) INSTRUMENT NOSE TIP VIEW

C) INSTRUMENT NOSE (BOTTOM)

D) ELEVATING ARROW

E) RELEASE

2 LOADING AND UNLOADING

1. Remove cartridge from sterile package.

2. Hold cartridge with locating arrow away from instrument nose. Align metal portion of cartridge with slot in instrument nose. Insert cartridge firmly into nose of instrument until there is an audible click.

The instrument is now ready for use.

The nose of the instrument with the cartridge can be rotated for ease of access to any closure.

3. When unloading, hold the cartridge with arrow in front. Push forward and away from handle, then pull out. Dispose of cartridge.

3 INSTRUCTIONS FOR USE

1. Ergonomic ease with Covidien™ three-approximating levers. Size may also be approximated by applying traction to one or both ends of the incision. Make certain skin edges are everted. Precock instrument handle by squeezing until a slight resistance is felt and staple points are visible.
PRECOCK FEATURE ALLOWS FOR MORE PRECISE PLACEMENT OF STAPLES.

2. Place cartridge with locating arrow directly in the center of approximated skin and squeeze handle. The cartridge should be placed very lightly on the skin at the angle of the bevel so the staple cross span forms in a raised position above the skin, resulting in a better cosmetic closure.

3. After completing the sequence, release the handle. This automatically disengages the staple, facilitating instrument removal in any direction.

4. Stainless steel staples closure

4 REMOVAL OF STAPLES

1. Slip lower jaws of Auto Suture™ Premium Extractor under staple. Make certain both tips are under staple. Close handle to extend staple and lift straight up (Remove at one end first staple). The Auto Suture™ Premium Extractor is supplied in a unrestricted package.

2. CUTTING FEATURES

5 TRIPLE SPECIFICATIONS

1. 5.8mm TA® Reload.

These cartridges each contain thirty-five (35) staples; steel staples, respectively, of 0.21 mm diameter wire. Staple formation is by means of two rows of staggered staples, 4.8 mm wide and 2.4 mm high when closed.

STERILITY FOR RESEALED

AVOID PROLONGED EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURES.

FR

SFS™
Agrafeuse cutanée réutilisable

SM™
Recharge d'agrafeuse cutanée

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS.

IMPORTANT !

Cette brochure vise à donner à l'utilisateur de l'produit. Elle ne constitue pas une référence en matière de techniques chirurgicales.

Se référer au protocole d'établissement pour la préparation de la peau, la fermeture et l'ablation de la plaie. Utiliser uniquement des dispositifs réutilisables et la recharge d'agrafes cutanées SM™ jusqu'à ce que l'agrafeuse ou la recharge d'agrafes cutanées SM™ ait provoqué un dysfonctionnement et l'éjection subséquente des agrafes. Le retraitement et/ou la refabrication de la recharge d'agrafes cutanées SM™ peuvent entraîner un risque de contamination et d'infection du patient. Ne pas réutiliser, retraiter ou refabriquer la recharge d'agrafes cutanées SM™.

DESCRIPTION

L'agrafeuse cutanée réutilisable SFS™, avec sa recharge d'agrafes cutanées SM™, place une agrafe à chaque fois que la gâchette du dispositif est serrée. Les agrafes cutanées sont conçues pour être placées en un mouvement en maintenant l'ensemble fermé. Différentes tailles d'agrafes, chacune dans sa propre recharge d'agrafes cutanées.

INDICATIONS

L'agrafeuse cutanée réutilisable SFS™ est conçue pour pratiquer des sutures cutanées et au aponévrose en chirurgie abdominale, gynécologique, orthopédique et thoracique. D'autres utilisations incluent notamment : suture des incisions pratiquées lors des procédures de stripping veineux, thyroïdectomie et mastectomie ; suture des incisions du cuir chevelu et prélèvement des lambeaux de cuir chevelu ; synthèse cutanée à visée esthétique.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser l'agrafeuse cutanée réutilisable directement au-dessus d'un site ou d'un incident, bowtie, au cours de l'application, car des cicatrices hypertrophiques peuvent se former. Ne pas utiliser l'agrafeuse cutanée réutilisable en présence d'une infection. Ne pas utiliser l'agrafeuse cutanée réutilisable en cas de troubles de la coagulation ou de saignement. Ne pas utiliser l'agrafeuse cutanée réutilisable en cas de tissu sous-cutané trop fin pour permettre une pénétration adéquate de l'agrafe. Ne pas utiliser l'agrafeuse cutanée réutilisable en cas de tissu sous-cutané trop épais pour permettre une pénétration adéquate de l'agrafe. Ne pas utiliser l'agrafeuse cutanée réutilisable en cas de tissu sous-cutané trop épais pour permettre une pénétration adéquate de l'agrafe.

EFFETS INDÉSIRABLES / RISQUES POTENTIELS

Les effets indésirables / risques potentiels associés à l'utilisation du dispositif incluent, sans toutefois s'y limiter : infection ; douleur ; saignement ; lésion tissulaire ; réaction allergique ; réaction à un corps étranger ; formation de cicatrice hypertrophique ; formation de chéloïde ; déhiscence ; nécrose ; lésion nerveuse ; et/ou autres complications.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

1. Ne pas retirer l'instrument de son conteneur sauf si nécessaire.
2. Les dispositifs réutilisables doivent être soigneusement inspectés avant et après chaque utilisation, car tout endommagement est susceptible d'affecter les performances du dispositif. Ne pas utiliser le dispositif en cas d'endommagement. Les dommages peuvent entraîner un dysfonctionnement, comme un bourrage, des difficultés d'utilisation ou une formation inadéquate des agrafes.
3. Les dispositifs avec des pièces mobiles doivent être évalués en amont afin de garantir leur bon fonctionnement. En cas de suspicion de dommages, contacter votre distributeur local pour faire remplacer ou réparer le dispositif par le fabricant.
4. Les détergents et solutions pour les dispositifs réutilisables doivent avoir un pH compris entre 7,0 et 9,5.
5. Ne pas dépasser des températures de ventilation de 135 °C.

INSTRUCTIONS DE RETRAITEMENT

Les dispositifs réutilisables sont fournis non stériles. Ils doivent être nettoyés et stérilisés avant utilisation.

Les traitements répétés des paramètres indiqués ont un effet minime sur les dispositifs réutilisables. L'usure et les dommages peuvent être déterminés par la fréquence d'utilisation et l'inspection.

ATTENTION : Les dispositifs réutilisables doivent être soigneusement inspectés avant et après chaque utilisation, car tout dommage est susceptible d'affecter les performances du dispositif. Le dispositif doit obligatoirement être lubrifié avant chaque stérilisation, faute de quoi il pourrait provoquer des dysfonctionnements tels qu'un bourrage, difficultés d'utilisation ou formation incorrecte des agrafes.

Avant toute application, contrôler le fonctionnement des dispositifs comportant des pièces mobiles. En cas de signes de détérioration, contacter votre distributeur local pour faire remplacer ou réparer le dispositif par le fabricant.

Caractéristique d'étanchéité : Même si les valves sont ouvertes, le joint d'étanchéité reste fermé.

Commerce et transport : Il est recommandé de retraiter les instruments réutilisables au plus tôt après leur utilisation. Si le retraitement ne peut pas être effectué immédiatement, ils doivent être recouverts d'un chiffon humide.

Préparation avant le nettoyage : Les dispositifs réutilisables sont livrés non stériles. Il convient de les nettoyer et de les stériliser avant utilisation. Avant chaque utilisation, il convient de démonter le applicateur et de jeter tout composant à usage unique.

ATTENTION : Les dispositifs réutilisables doivent être soigneusement inspectés avant et après chaque utilisation, car tout dommage est susceptible d'affecter les performances du dispositif. Le dispositif doit obligatoirement être lubrifié avant chaque stérilisation, faute de quoi il pourrait provoquer des dysfonctionnements tels qu'un bourrage, difficultés d'utilisation ou formation incorrecte des agrafes.

Les dispositifs avec des pièces mobiles doivent être évalués en amont afin de garantir leur bon fonctionnement. En cas de suspicion de dommages, contacter votre distributeur local pour faire remplacer ou réparer le dispositif par le fabricant.

Il y a au moins trois raisons pour lesquelles les dispositifs avec des valves à usage unique doivent être jetés :

Contaminants et température : Il est recommandé de retraiter les instruments réutilisables le plus tôt possible après leur utilisation. Ils doivent être recouverts d'un chiffon humide si le retraitement ne peut pas être effectué immédiatement.

Préparation au nettoyage : Les dispositifs réutilisables doivent être soigneusement démontés avant le processus de nettoyage. Veiller à ce que tous les composants accessibles soient démontés et nettoyés. Se référer aux instructions du fabricant pour le démontage.

Nettoyage : Les dispositifs réutilisables doivent être soigneusement nettoyés avant d'être stérilisés. Un nettoyage insuffisant du dispositif peut empêcher sa stérilisation. Veiller à ce que tous les composants accessibles soient nettoyés et rincés. Se référer aux instructions du fabricant pour le nettoyage.

Stérilisation : Les dispositifs réutilisables sont livrés non stériles et sont conçus pour être réutilisés. Ils peuvent être stérilisés avec les paramètres suivants :

Stérilisation à la vapeur

Pression : Cycle vapeur

Température : 270–275 °F (132–135 °C)

Chaleur sèche

Durée : 4 minutes d'exposition minimum, sous emballage

Cycle gravité

Température : 320–275 °F (121–135 °C)

Durée : 15 minutes d'exposition minimum, sous emballage

Chaleur sèche

Durée : 12 minutes d'exposition minimum, sous emballage

Cycle ETO

132 °F (54 °C), 600–700 mg/L, 40–60 % HR, 2 heures d'exposition minimum, emballé

160 °F (38 °C), 450–700 mg/L, 40–60 % HR, 3 heures d'exposition minimum, emballé

Maintenance : Avant chaque utilisation, inspecter visuellement les instruments afin de détecter tout dommage ou usure et vérifier leur bon fonctionnement.

L'autoclavage répété peut ternir ou décolorer les surfaces des instruments.

Emballage : Les instruments peuvent être placés dans un sachet en polyéthylène ou un emballage hospitalier standard.

Stockage : Conserver à température ambiante.

Informations supplémentaires : Lors de la stérilisation de plusieurs dispositifs au cours d'un même cycle d'autoclave, s'assurer que la charge ne dépasse pas la charge maximale spécifiée par le fabricant de l'autoclave.

1 VUE SOMMAIRE

A) VUE LATÉRALE

B) VUE DU BOUT DU NEZ DE L'INSTRUMENT

C) NEZ DE L'INSTRUMENT (DESSOUS)

D) FLÈCHE D'ÉLÉVATION

E) DÉCLENCHEUR

2 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

1. Sortir la cartouche de l'emballage stérile.

2. Tenir la cartouche avec la flèche de positionnement du côté opposé à l'extrémité du nez de l'instrument. Aligner la partie métallique de la cartouche avec la fente sur la tête du dispositif. Insérer fermement la cartouche dans la tête du dispositif, jusqu'à entendre un déclic.

Le dispositif est maintenant prêt à être utilisé.

Le nez de l'instrument avec la cartouche peut être tourné pour faciliter l'accès à n'importe quelle suture.

3. Lors du déchargement, tenir la cartouche avec la flèche orientée à l'avant. Pousser vers l'avant, à l'opposé de la poignée, puis tirer. Mettre la cartouche au rebut.

3 MODE D'EMPLOI

1. Ergonomie aisée avec trois leviers de fermeture de rapprochement de Covidien™. Il est également possible de rapprocher les bords d'une incision en tirant sur l'une ou les deux extrémités de celle-ci. Veiller à ce que les bords de la peau soient bien retournés. Armer la poignée de l'instrument en appuyant jusqu'à ce qu'une légère résistance soit ressentie et que les points d'agrafe soient visibles.
LA FONCTION D'ARMEMENT PERMET UNE MISE EN PLACE PLUS PRÉCISE DES AGRAFES.

2. Placer la cartouche avec la flèche de positionnement directement au centre de la peau rapprochée, puis presser la poignée. La cartouche doit être placée très légèrement sur la peau, à l'angle du biseau, de sorte que le petit tronçon transversal de l'agrafe soit surélevé par rapport à la peau afin d'obtenir une fermeture plus esthétique.

3. Après avoir procédé à la pression à fond, relâcher celle-ci. Ce dispositif automatiquement l'agrafe, ce qui facilite le retrait du dispositif dans n'importe quelle direction.

4 RETRAIT DES AGRAFES

1. Faire glisser les mâchoires inférieures de l'extracteur premium Auto Suture™ sous l'agrafe. S'assurer que les deux extrémités se trouvent sous l'agrafe. Fermer la poignée pour déployer l'agrafe et soulever verticalement. Jeter l'agrafe retirée en premier. L'extracteur premium Auto Suture™ est livré dans un emballage peu sécurisé.

2. CARACTÉRISTIQUES DES AGRAFES

5 TRIPLE SPÉCIFICATIONS

1. Recharge TA® : 5,8 mm.

Chaque cartouche contient trente-cinq (35) agrafes ; agrafes en acier inoxydable comprenant d'un fil de 0,54 mm de diamètre. Disposition de l'agrafes en de 16 rangs avant formation, après formation, la largeur est d'environ 4,5 mm et sa hauteur de 2,47 mm.

2. Recharge 3,8™ : 3,8

Ces cartouches contiennent chacune trente-cinq (35) agrafes en acier inoxydable comprises d'un fil de 0,17 mm de diamètre. Disposition de l'agrafes en de 16,2 mm avant formation, après formation, la largeur est d'environ 4,0 mm.

STÉRILITÉ EN CAS DE RESCELLAGE

ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.

DE

SFS™
Wiederverwendbares Hautklammerinstrument

SM™
Ladevorrichtung zum Hautklammerinstrument

VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

WICHTIG!

Diese Broschüre ist als Hilfestellet bei der Verwendung dieses Produkts vorgesehen. Sie ist nicht als Referenz für chirurgische Techniken gedacht.

Der SM™ Ladevorrichtung zum Hautklammerinstrument wurde ausschließlich im Hinblick auf seine Verwendung für einen einzigen Patienten entwickelt, gefertigt und getestet. Eine Wieder verwendung oder erneute Aufbereitung der SM™ Ladevorrichtung zum Hautklammerinstrument kann zu einem Versagen und damit zur Schädigung des Patienten führen. Das Aufbereiten und jeder erneute Gebrauch der SM™ Ladevorrichtung zum Hautklammerinstrument (auf Sicht wiederverwendet, aufbereitet oder erneut zerstört werden.

BESCHREIBUNG

Das wiederverwendbare SFS™ Hautklammerinstrument platziert in Verbindung mit der SM™ Ladevorrichtung bei jedem Betätigen des Auslösemechanismus jeweils eine einzelne Klammer. Das Instrument ist für eine einhändige Bedienung konzipiert. Es stehen verschiedene Klammergrößen zur Auswahl, die jeweils in der entsprechenden Ladevorrichtung zum Hautklammerinstrument enthalten sind.

INDIKATIONEN

Das wiederverwendbare SFS™ Hautklammerinstrument findet Verwendung bei abdominalen, gynäkologischen, orthopädischen und thoraxchirurgischen Eingriffen zum Verschließen von Haut und Faszien. Weitere Einsatzgebiete sind: Verschluss von Inzisionen bei Venenstripping-, Thyreoidektomie- und Mastektomie- Verfahren; Verschluss von Kopfhautinzisionen und Kopfhautlappen-Entnahme; Hautkompaktationen; plastische und kosmetische Hautverschlüsse.

KONTRAINDIKATIONEN

1. Die Hautklammer nie filamenten anstelliger über Knochen oder inneren Organen ist sprenell möglich, jedoch muss bei der Platzierung ein Abstand von mindestens 0,5 mm zwischen der Hautoberfläche bei Faux Suture sind dem darunter liegenden Gewebe eingehalten werden. Andernfalls kann es zu Gewebeschäden kommen. Die Hautklammer darf nicht verwendet werden, wenn eine erhebliche Infektion besteht oder vermutet wird, etwa sobald Anzeichen für Eiterbildung vorliegen. Falls sich dieser Absatzteile nicht durch Anheben des Gewebes von der Platzierung ernehmen lassen, ist der Einsatz der Haut- bzw. Faszienklammern kontraindiziert.

Ciclo di sterilizzazione a vapore con pressato

Temperatura: 132–125 °C (270–275 °F)

Esposizione: 4 minuti di esposizione minima, imballato

Ciclo a riscaldare naturale

Temperatura: 121–124 °C (250–255 °F)

Esposizione: 15 minuti di esposizione minima, imballato

Ciclo ETO

54 °C (130 °F), 600–650 mg/l, 40–60% umidità relativa, almeno 2 ore di tempo di esposizione, imballato

38 °C (100 °F), 650–700 mg/l, 40–60% umidità relativa, almeno 3 ore di tempo di esposizione, imballato

Manutenzione: prima dell'utilizzo, eseguire un'ispezione visiva dello strumento per rilevare eventuali danni o usura e controllare il corretto funzionamento.

Ripetuti cicli di autoclave possono provocare l'ossidazione o la colorazione delle superfici degli strumenti.

Confezionamento: gli articoli vanno inseriti in una busta di polietilene o in un involucro ospedaliero standard.

Conservazione: conservare a temperatura ambiente.

1 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A) VISTA LATERALE

B) VISTA DALL'ESTREMITÀ DELLA PARTE ANTERIORE DELLO STRUMENTO

C) PARTE ANTERIORE DELLO STRUMENTO (BASSO)

D) FRECCIA DI POSIZIONAMENTO

E) RILASCIO

2 CARICAMENTO E SCARICAMENTO

1. Rimuovere la cartuccia dalla confezione sterile.

2. Tenere la cartuccia con la freccia lontana dalla strumento. Allineare la parte metallica della cartuccia con l'alloggiamento della cartuccia sulla strumento. Inserire saldamente la cartuccia nella parte anteriore dello strumento, finché non si sente uno scatto.

Lo strumento è ora pronto per l'uso.

La parte anteriore dello strumento con la cartuccia può essere ruotata al fine di accedere facilmente a qualsiasi sutura.

3. Per scaricare la cartuccia, tenere lo strumento con la freccia in direzione opposta rispetto a se stessi. Premere in avanti e lontano dall'impugnatura, quindi estrarre. Smaltire la cartuccia.

3 ISTRUZIONI PER L'USO

1. Agevolazione ergonomica con tre leve di approssimazione. Le dimensioni possono anche essere approssimate applicando trazione a una o entrambe le estremità dell'incisione. Assicurarsi che i margini cutanei siano rovesciati. Caricare lo strumento premendo la leva fino a quando non si avverte una leggera resistenza e i punti metallici sono visibili.
LA FUNZIONE DI CARICAMENTO CONSENTE UN POSIZIONAMENTO PIÙ PRECISO DELLE GRAFFETTE.

2. Posizionare la cartuccia con la freccia di posizionamento direttamente al centro della pelle avvicinata, quindi premere l'impugnatura. La cartuccia deve essere posizionata sulla cute molto delicatamente con un angolo di inclinazione tale che la campata trasversale della graffetta si trovi in posizione rialzata sopra la cute, determinando una sutura cutanea migliore.

3. Dopo aver premuto completamente, rilasciare l'impugnatura. In questo modo si libera automaticamente il punto metallico, facilitando la rimozione dello strumento in qualsiasi direzione.

4. Sutura con punti metallici in acciaio inossidabile

4 RIMOZIONE DEI PUNTI METALLICI

1. Far scorrere le ganasce inferiori dell'estrattore di qualità eccelsa Auto Suture™ sotto il punto metallico. Accertarsi che entrambe le punte siano sotto il punto metallico. Chiudere l'impugnatura per estendere il punto metallico e sollevare direttamente (rimuovere dapprima il punto metallico posto all'estremità). L'estrattore di qualità eccelsa Auto Suture™ è fornito sterile in una confezione non limitata.

5 CARATTERISTICHE DEI PUNTI METALLICI

1. Ricarica TA™: 5,8

Queste cartucce contengono trentacinque (35) punti in acciaio inossidabile, rispettivamente, con diametro del filo da 0,54 mm. Disposizione dei punti metallici a 16 file avanti formazione, dopo formazione, la larghezza è di circa 4,5 mm e l'altezza è pari a 2,47 mm.

2. Ricarica 3,8™ : 3,8

Queste cartucce contengono trentacinque (35) punti in acciaio inossidabile, rispettivamente, con diametro del filo da 0,17 mm. Disposizione dei punti metallici a 16 file avanti formazione, dopo formazione, la larghezza è di circa 4,0 mm e l'altezza è pari a 2,41 mm.

STERILITÀ PER LE RICHIUSURE

La sterilità non è più garantita se la confezione è stata aperta o è stata danneggiata.

EVITARE ESPOSIZIONI PROLUNGATE A TEMPERATURE ELEVATE.

ES

SFS™
Grapadora dérmica reutilizable

SM™
Recarga para grapadora dérmica

LEA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN QUE SE FACILITA A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

IMPORTANTE!

Este folleto está pensado para ayudarle a usar este producto. No se trata de un documento de referencia sobre técnicas quirúrgicas.

Lea el protocolo de su centro para la preparación de la piel, el cierre y la extracción de la herida. Utilice solo dispositivos reutilizables y la recarga de grapas dérmicas SM™ hasta producir fallos y, como consecuencia, la expulsión de las grapas. El reprocesamiento y reesterilización de la recarga de grapas dérmicas SM™ puede provocar un riesgo de contaminación e infección del paciente. No reutilice, reprocese ni reesterilice la recarga de grapas dérmicas SM™.

DESCRIPCIÓN

La grapadora dérmica reutilizable SFS™, con la recarga para grapadoras dérmicas SM™, coloca una grapa cada vez que se aprieta el mango del instrumento. En primer lugar, la grapa queda presionada (a pie) a la piel y, a continuación, se forma la grapa. El diseño de la grapadora dérmica reutilizable SFS™ permite colocar las grapas en un solo movimiento sujetando el trocar. Hay diferentes tamaños de grapa y cada uno viene en su propia recarga para grapadoras dérmicas.

INDICACIONES

La grapadora dérmica reutilizable SFS™ se utiliza en cirugía abdominal, ginecológica, ortopédica y torácica para el cierre de piel y fascia. Otros usos incluyen: cierre de incisiones en flebectomías, tiroidectomías y mastectomías; cierre de incisiones del cuero cabelludo y colgajos de piel; cierres cutáneos estéticos.

CONTRAINDICACIONES

1. La grapa se puede colocar directamente sobre hueso o víscera, en ningún caso, directamente sobre la piel, ya que podría producirse una cicatrización hipertrófica. No utilice la grapadora dérmica reutilizable en pacientes con alergia al acero inoxidable. No utilice la grapadora dérmica reutilizable en presencia de infección. No utilice la grapadora dérmica reutilizable en pacientes con hemorragias o trastornos de la coagulación. No utilice la grapadora dérmica reutilizable en pacientes con tejido subcutáneo demasiado fino para permitir una penetración adecuada de la grapa. No utilice la grapadora dérmica reutilizable en pacientes con tejido subcutáneo demasiado grueso para permitir una penetración adecuada de la grapa. No utilice la grapadora dérmica reutilizable en pacientes con tejido subcutáneo demasiado grueso para permitir una penetración adecuada de la grapa.

EFECTOS ADVERSOS / RIESGOS POTENCIALES

Los efectos adversos / riesgos potenciales asociados con el uso del dispositivo incluyen, entre otros: infección; dolor; hemorragia; lesión tisular; reacción alérgica; reacción a cuerpo extraño; formación de cicatriz hipertrófica; formación de queloides; dehiscencia; necrosis; lesión nerviosa; y/o otras complicaciones.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. No retire el instrumento de su contenedor a menos que sea necesario.
2. Los instrumentos reutilizables se deben inspeccionar detenidamente antes y después de cada uso, pues cualquier daño podría afectar al rendimiento del dispositivo. Si no se detecta ningún daño en el dispositivo, no lo utilice. Los daños pueden provocar inconvenientes, por ejemplo, atascos, poca maniobrabilidad difícil manipulación o grapas inadecuadas.
3. Antes de la aplicación, se deben evaluar los dispositivos que tienen piezas móviles para determinar que funcionan correctamente. Si se sospecha de algún daño, póngase en contacto con su representante local para que el fabricante reemplace o repare el dispositivo.
4. Los detergentes y soluciones para dispositivos reutilizables deben tener un pH de entre 7 y 9,5.
5. La temperatura de ventilación no debe superar los 135 °C.

INSTRUCCIONES DE REPROCESAMIENTO

Los dispositivos reutilizables se suministran sin esterilizar. Se deben limpiar y esterilizar antes de utilizarlos.

El procesamiento repetido siguiendo los parámetros indicados tiene un efecto mínimo sobre los dispositivos reutilizables. El desgaste y los daños se pueden determinar por la frecuencia de uso y la inspección.

PRECAUCIÓN: los instrumentos reutilizables se deben inspeccionar detenidamente antes y después de cada uso, ya que cualquier daño podría afectar a la utilización del dispositivo. Si no se lubrica el dispositivo antes de la esterilización, podría funcionar incorrectamente, por ejemplo, atascarse, ser difícil de utilizar o producir grapas inadecuadas.

Antes de la aplicación, se deben revisar los dispositivos que tienen piezas móviles para comprobar que funcionan correctamente. Si se sospecha de algún daño, póngase en contacto con su representante local para que el fabricante reemplace o repare el dispositivo.

Puesta de uso: elimine el exceso de suciedad con toallitas desechables.

Limpieza y transporte: se recomienda reprocesar los instrumentos reutilizables tan pronto como sea posible después de utilizarlos. Si no pueden reprocesarse inmediatamente, deberán cubrirse con una toalla humeda.

Preparación para limpieza: los dispositivos reutilizables se suministran sin esterilizar. Por tanto, se deben limpiar y esterilizar antes de utilizarlos. Además, también que desarmar la pieza de mano antes de cada uso y combinarlos de acuerdo con las distintas de cargamento para cada indicación.

Limpieza: los dispositivos reutilizables se deben limpiar a fondo antes de esterilizarlos. Si no se limpia el dispositivo correctamente, podría no esterilizarse correctamente. Asegúrese de limpiar y enjuagar todos los componentes accesibles. Consulte las instrucciones del fabricante para la limpieza.

Esterilización: los dispositivos reutilizables se suministran sin esterilizar y están diseñados para reutilizarse. Se pueden esterilizar con los parámetros siguientes:

Esterilización con vapor

Presión: ciclo de vapor

Temperatura: 270–275 °F (132–135 °C)

Tiempo: 4 minutos de exposición mínima, envuelto

Ciclo de gravedad

Temperatura: 320–275 °F (121–135 °C)

Tiempo: 15 minutos de exposición mínima, envuelto

Calor seco

Tiempo: 12 minutos de exposición mínima, envuelto

ETO

54 °C (130 °F), 600–700 mg/l, 40 – 60% de humedad relativa durante 2 horas de tiempo de exposición mínima, envuelto

38 °C (100 °F), 450–700 mg/l, 40 – 60% de humedad relativa durante 3 horas de tiempo de exposición mínima, envuelto

Mantenimiento: inspeccionar los instrumentos visualmente por si estuvieran dañados o desgastados y comprobar que funcionan correctamente antes de cada uso.

La esterilización repetida en autoclave puede manchar o decolorar las superficies.

Envase: coloque los artículos en una bolsa de polietileno o en una envoltura de hospital.

Almacenamiento: almacene el dispositivo a temperatura ambiente.

Información adicional: cuando esterilice varios instrumentos en un ciclo de autoclave, asegúrese de no superar la carga máxima indicada por el fabricante del esterilizador.

1 VISTAINA

A) VISTA LATERAL

B) VISTA SUPERIOR DE LA PUNTA DEL INSTRUMENTO

C) PUNTA DEL INSTRUMENTO (GANCHO)

D) FLECHA DE ELEVACIÓN

E) DESCARGA

2 CARGA Y DESCARGA

1. Extraiga el cartucho de la envoltura estéril.

2. Sujete el cartucho con la flecha de localización en dirección opuesta a la punta del instrumento. Alinee la parte de metal del cartucho con la ranura de la punta del instrumento. Introduzca el cartucho con firmeza en la punta del instrumento hasta que oiga un chasquido.

El instrumento está preparado para ser utilizado.

La punta del instrumento con el cartucho se puede girar para facilitar el acceso a cualquier cierre.

3. Al realizar descargas, sujete el cartucho con la flecha enfrente. Empuje hacia adelante, en dirección opuesta al mango, y tire después hacia fuera. Tire el cartucho.

3 MODO DE EMPLEO

1. Ergonomía fácil con las pinzas de aproximación de triples Covidien™. La pinza también se puede aproximar aplicando tracción a uno o ambos extremos de la incisión. Verifique que los bordes estén evertidos. Monte el mango del instrumento apretando hasta notar un poco de resistencia y hasta que se vean los puntos de la grapa entre estilos.
LA CARACTERÍSTICA DE MONTAJE PERMITE UNA COLOCACIÓN MÁS PRECISA DE LAS GRAPAS.

2. Coloque el cartucho con la flecha de localización directamente en el centro de la piel aproximada y apriete el mango. El cartucho se debe colocar ligeramente sobre la piel, en el mismo ángulo que el bisel para que el puente de la grapa quede en posición elevada sobre la piel, lo que mejora el cierre de la herida.

3. Después de completar la secuencia, libere el mango. Así se libera la grapa automáticamente, facilitando la extracción del instrumento en cualquier dirección.

4. Cierre de grapas de acero inoxidable

4 EXTRACCIÓN DE GRAPAS

1. Deslice las mandíbulas inferiores del extractor premium Auto Suture™ debajo de la grapa. Verifique que ambas dos extremidades de la grapa. Cierre el mango para desplazar la grapa y tire directamente hacia arriba (retire primero la grapa de la extremidad). El extractor premium Auto Suture™ se suministra en un paquete estándar.

5 ESPECIFICACIONES DE LAS GRAPAS

1. Recarga TA™: 5,8

Estos cartuchos contienen treinta y cinco (35) grapas anchas de acero inoxidable, con diámetro de 0,54 mm de diámetro. La grapa mide 4,8 mm de ancho y 4,7 mm de alto cuando está cerrada.

2. Recarga 3,8™ : 3,8

Estos cartuchos contienen treinta y cinco (35) grapas de acero inoxidable, con diámetro de 0,21 mm de diámetro. La grapa mide 16,2 mm de ancho y aproximadamente 4,0 mm de alto cuando está cerrada.

ESTERILIDAD PARA RECARGAS

EVITE EXPOSIÓN PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS.

NL

SFS™
Herbruikbare huidstapler

SM™
Laadeenheid voor huidstapler

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE GRONDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

BELANGRIJK!

Deze brochure dient als ondersteuning voor het gebruik van het product. Het is geen naslagwerk voor chirurgische technieken.

Zie het ziekenhuisprotocol voor de huidpreparatie, wondsluiting en verwijdering. Het SM™ nietpatroon voor huidnieten mag alleen worden gebruikt in combinatie met herbruikbare instrumenten totdat het nietpatroon defect raakt en de nietjes worden uitgestoten. Het opnieuw verwerken en/of opnieuw vervaardigen van het SM™ nietpatroon voor huidnieten kan leiden tot infectie en/of besmetting van de patiënt. Het SM™ nietpatroon voor huidnieten niet opnieuw verwerken, opnieuw vervaardigen of opnieuw gebruiken.

BESCHRIJVING

De herbruikbare SFS™ huidstapler plaatst, met de SM™ nietpatroon voor huidnieten, één nietje per keer dat de handgreep van het instrument wordt geactiveerd. De instrumenten zijn ontworpen voor de hand te houden en met één hand te bedienen. Er zijn verschillende grootte

Box size: 7.40 x 22.10

Overall Size: 27 x 30

Folds to: 4.5 x 6

COVIDIEN™

Endo Clip™ III

Clip Applier with Clip Logic™ Technology

1082875

EN

BEFORE USING PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

IMPORTANT!

This booklet is designed to assist in using this product. It is not a reference to surgical techniques.

This device was designed, tested and manufactured for single-patient use only. Reuse or reprocessing of this device may lead to its failure and subsequent patient injury. Reprocessing and/or sterilization of this device may create the risk of contamination and patient infection. Do not reuse, reprocess or sterilize this device.

DESCRIPTION

The Endo Clip™ III clip applier contains 16 titanium clips. The applier is designed for introduction and use through an appropriately sized Covidien™ trocar sleeve, or larger with the use of a converter. The length of the shaft is approximately 33 cm (13").

INDICATIONS

The Endo Clip™ III clip applier is primarily indicated for patients undergoing laparoscopic surgical procedures involving dissection and occlusion of blood vessels, ducts and other tubular structures, and for radiographic marking.

CONTRAINDICATIONS

1. This device is not intended for contraceptive tubal occlusion, but may be used to achieve hemostasis following transection of the fallopian tube.
2. Do not use the Endo Clip™ III clip applier on the ureter circulatory system, renal artery, iliac artery, or other vessels which need ligating clips would not normally be used.

WARNING AND PRECAUTIONS

1. Prior to insertion or removal of the Endo Clip™ III clip applier from the trocar sleeve, ensure that a clip is not loaded into the jaws and that Clip Logic™ technology is not engaged. Clip Logic™ technology is engaged when the handle must be completely squeezed before removal from a trocar sleeve.
2. Upon insertion of the instrument through the trocar sleeve and prior to loading a clip into the jaws, ensure that the double line printed on the distal end of the applier shaft is fully visible. This indicates that the device jaws are clear of interference from the trocar sleeve.

WARNING: Ensure that the double line printed on the distal end of the instrument's shaft is fully visible before loading a clip.

3. The shaft of the Endo Clip™ III clip applier rotates 360° in either direction.
4. Gently squeeze the handle part way to activate Clip Logic™ technology and feed a clip into the jaw. An audible click will signify that the clip has been fully loaded. Further squeezing will form the clip. Do not attempt to perform fourth dissection after the first click on Clip Logic™ technology will no longer be engaged.

NOTE: Fully squeeze the clip prior to placing tissue within the jaws of the instrument.

5. Place the instrument jaw around the vessel or structure to be occluded, making certain that the vessel or structure fits completely within the confines of the jaw. Squeeze the handle completely to fire and form the clip. Release and close the clip on the vessel or structure. A second audible click at the end of the handle stroke will signify that the clip has been fully formed and the handle stroke is complete. Allow the handle to return completely after firing.

WARNING: Make certain that the structure to be occluded fits completely within the confines of the clip or bleeding and/or leakage may result.

WARNING: Firing the jaws over another clip or other obstructions may result in bleeding and/or leakage and may damage the instrument jaws.

WARNING: Squeeze the handle firmly as far as it will go. Failure to squeeze the handle completely may result in an improperly formed clip and possible bleeding and/or leakage. Failure to squeeze completely may prevent the jaws from opening.

6. Release the handle completely to disengage the ratchet for the jaws and release the instrument from the trocar. Repeat steps 1 through 5 for subsequent applications.
7. If tension binding and/or leakage is observed after application, electrocautery or manual sutures may be used to help ensure hemostasis.
7. The device will have 3 blue tips to serve as a visual indicator that the user is approaching the end of the clip stack. When the first blue clip is seen, there are 2 additional clips remaining in the device. A safety interlock feature will prevent the handle from being squeezed and the empty jaw from closing.
8. Instruction for a single clip applier is available.

WARNING: Do not perform cholangiograms with any catheter except a metal-tipped catheter which will allow for patent catheter lumen after clip closure.

9. It is possible to perform cholangiograms with metal-tipped catheters which allow for a patent catheter lumen after clip closure.

WARNING: Prior to removal of the Endo Clip™ III clip applier through the trocar sleeve, ensure that Clip Logic™ Technology is disengaged and a clip is not present in the jaws.

IN THE EVENT AN UNSPENT CLIP IS IN THE JAW OR Clip Logic™ Technology IS ENGAGED, SQUEEZE THE HANDLE AND REMOVE THE INSTRUMENT FROM THE TROCAR SLEEVE WITH THE JAW IN THE CLOSED POSITION. RELEASE THE HANDLE AND DROP THE FORMED CLIP AWAY FROM THE PATIENT.

2 CLIP SPECIFICATIONS

F) CLIP WIDTH

G) APPROXIMATE LENGTH (closed)

H) CLIP QUANTITY

I) SHAFT LENGTH

STORE AT ROOM TEMPERATURE. AVOID PROLONGED EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURES.

FR

Applicateur d'attache avec technologie Clip Logic™

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CI-DESSOUS.

IMPORTANT !

Cette notice est destinée à faciliter l'utilisation de ce produit. Elle ne constitue pas une référence en matière de techniques chirurgicales.

Ce dispositif a été conçu, testé et fabriqué pour un usage chez un seul patient. La stérilisation et/ou son retraitement peuvent provoquer un dysfonctionnement et des blessures chez le patient. Son retraitement et/ou sa stérilisation peuvent entraîner un risque de contamination et d'infection du patient. Ne pas stériliser, retraiter, ni restériliser ce dispositif.

DESCRIPTION

L'applicateur d'attache Endo Clip™ III contient 16 attaches en titane. L'applicateur est conçu pour être introduit et utilisé à l'intérieur d'un manchon de trocart Covidien™ de taille appropriée ou plus grand avec l'utilisation d'un convertisseur. La longueur de la tige est d'environ 33 cm (13 pouces)

INDICATIONS

L'applicateur d'attache Endo Clip™ III est principalement indiqué pour les patients subissant une intervention de chirurgie laparoscopique impliquant la dissection et l'occlusion de vaisseaux sanguins, de canaux et d'autres structures tubulaires, ainsi que pour le marquage radiographique.

CONTRE-INDICATIONS

1. Le dispositif n'est pas conçu pour l'occlusion tubaire contraceptive mais peut être utilisé pour obtenir l'hémostase après section de la trompe de Fallope.
2. Ne pas utiliser l'applicateur d'attache Endo Clip™ III sur le système circulatoire central, l'artère rénale, l'artère iliaque ou tout autre vaisseau sur lequel des attaches de ligature nécessitent normalement une traitement utilisées.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

1. Avant l'insertion ou le retrait de l'applicateur d'attache Endo Clip™ III du manchon de trocart, il convient de vérifier qu'aucune attache n'est chargée dans les mors et que la technologie Clip Logic™ n'est pas activée. La technologie Clip Logic™ est activée lorsque la poignée doit être entièrement pressée avant le retrait d'un manchon de trocart. Le symbole doit être entièrement pressé avant le retrait du manchon de trocart.
2. Lors de l'insertion de l'instrument dans le manchon de trocart, et avant de charger une attache dans les mors, s'assurer que la ligne double imprimée sur l'extrémité distale de la tige de l'applicateur est bien visible. Ceci indique que les mors du dispositif sont dégagés de toute interférence avec le manchon de trocart.

AVERTISSEMENT : vérifier que la ligne double imprimée sur l'extrémité distale de la tige de l'instrument est entièrement visible avant de charger une attache.

3. La tige de l'applicateur d'attache Endo Clip™ III tourne à 360° dans les deux sens.
4. Presser doucement la poignée à mi-chemin pour activer la technologie Clip Logic™ et charger l'attache dans les mors. Un clic sonore indique que l'attache a été complètement chargée. Une pression supplémentaire forme l'attache. Ne pas essayer de réaliser une deuxième tissection après un premier clic car la technologie Clip Logic™ ne sera plus active.

REMARQUE : Se chargement complet de l'attache dans les mors, avant le placement sur le tissu, n'est pas nécessaire.

5. Placer les mors de l'instrument autour du vaisseau ou de la structure à occlure, en s'assurant que le vaisseau ou la structure se trouve à l'intérieur des limites des mors. Serrer la poignée à fond pour actionner le dispositif et former l'attache sur le vaisseau ou la structure. Un deuxième clic sonore en fin de pression sur la poignée signifie que l'attache a été complètement formée et que la pression sur la poignée est complète. Attendre que la poignée revienne complètement après l'avoir actionnée.

AVERTISSEMENT : s'assurer que la structure à occlure s'insère complètement dans les deux extrémités de l'attache car dans le cas contraire des saignements ou des fuites peuvent apparaître.

AVERTISSEMENT : percer des mors une attache ou d'autres obstructions peut provoquer des saignements et/ou une fuite et peut endommager les mors de l'instrument.

AVERTISSEMENT : pour déclencher l'instrument, presser fermement la poignée jusqu'au bout. Si la poignée n'est pas complètement pressée, l'attache peut être mal formée et provoquer éventuellement un saignement et/ou une fuite. Si la poignée n'est pas complètement serrée, il ne peut pas les mors peuvent ne s'ouvrent pas.

6. Relâcher complètement la poignée pour libérer l'attache des mors et retirer le dispositif du vaisseau ou de la structure. Répéter les étapes 1 à 5 pour les applications suivantes.
7. Si un segment mineur et/ou une fuite sont observés après l'application, il est possible d'avoir recours à l'électrocautérisation ou aux sutures manuelles pour aider à réaliser l'hémostase.
7. Le dispositif est doté de 3 attaches bleues servant d'indicateur retrait pour signaler à l'utilisateur que la pile d'attaches est bientôt épuisée. Lorsque la première attache bleue apparaît, il reste seulement 2 attaches dans le dispositif. Un verrouillage de sécurité empêche alors d'actionner la gâchette et de fermer les mors vides.
8. Instruction for a single clip applier is available.

AVERTISSEMENT : Ne pas effectuer de cholangiographie avec n'importe quel cathéter, seul un cathéter à embout métallique permet de maintenir la lumière du cathéter dégagée après la fermeture de l'attache.

9. Il est possible d'effectuer des cholangiographies avec des cathéters à embout métallique qui permettent de maintenir la lumière du cathéter dégagée après la fermeture de l'attache.

AVERTISSEMENT : avant le retrait de l'applicateur d'attache Endo Clip™ III du manchon de trocart, vérifier que la technologie Clip Logic™ est désactivée et qu'il n'y a aucune attache dans les mors.

SI UNE ATTACHE NON APPLIQUÉE SE TROUVE DANS LES MORS OU QUE LA TECHNOLOGIE Clip Logic™ EST ACTIVÉE, PRESSER LA POIGNÉE ET RETIRER L'INSTRUMENT DU MANCHON DU TROCART AVEC LES MORS EN POSITION FERMÉE. RELÂCHER LA POIGNÉE ET RETIRER L'ATTACHE FORMÉE À L'ÉCART DU PATIENT.

3 CARACTÉRISTIQUES DE L'ATTACHE

F) LARGEUR DE L'ATTACHE

G) LONGUEUR APPROXIMATIVE (fermé)

H) QUANTITÉ D'ATTACHE

I) LONGUEUR DE LA TIGE

CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE ET ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.

DE

Hefter mit Clip Logic™ Technologie

VOR GEBRAUCH DES PRODUKTES SIND DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCHZULESEN.

WICHTIG!

Diese Broschüre ist als Hilfsmittel bei der Verwendung dieses Produkts vorgesehen. Sie ist nicht als Referenz für chirurgische Techniken gedacht.

Dieses Produkt wurde ausschließlich für Hebbild auf einer Verwendung für einen einzigen Patienten konzipiert, geprüft und hergestellt. Eine Wiederverwendung oder erneute Aufbereitung dieses Produkts kann zu seinem Versagen und damit zur Verletzung des Patienten führen. Das Aufbereiten und/oder erneute Sterilisieren dieses Produkts stellt ein potentielles Kontaminations- und Infektionsrisiko für den Patienten dar. Dieses Produkt nicht wiederverwenden, aufbereiten oder erneut sterilisieren.

BESCHREIBUNG

Der Endo Clip™ III Hefter enthält 16 Titan-Clips. Der Hefter ist zur Einführung und Verwendung durch eine Trokarhülse von Covidien™ von angemessener Größe oder größer mithilfe eines Konverters vorgesehen. Die Gesamtlänge des Schafts beträgt ca. 33 cm (13 Zoll).

INDIKATIONEN

Der Endo Clip™ III Hefter ist primär für Patienten indiziert, die sich laparoskopischen chirurgischen Eingriffen unterziehen müssen, die die Dissektion und Okklusion von Gefäßen, Gängen oder anderen röhrenförmigen Strukturen behandeln, sowie zur radiografischen Markierung.

KONTRAINDIKATIONEN

1. Dieser Vorrichtung ist nicht für den empfängnisverhütenden Eileiterverschluss vorgesehen, kann jedoch nach Eileiterdurchtrennung zum Erzielen der Hämostase eingesetzt werden.
2. Den Endo Clip™ III Hefter an folgenden Stellen nicht verwenden: Zentraler Blutkreislauf, Nierenarterie, Hüftarterie oder sonstige Gefäße, an denen normalerw Ligatur-Clips normalerweise keine Anwendung finden würden.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Vor der Einführung oder Entnahme des Endo Clip™ III Hefters in die bzw. aus der Trokarhülse sicherstellen, dass kein Clip in das Maul geladen wurde und dass die Clip Logic™ Technologie nicht aktiviert ist. Die Clip Logic™ Technologie wird aktiviert, wenn der Griff zusammengedrückt wird. Drücken Sie den Griff ganz zusammen, um die Clip Logic™ Technologie zu deaktivieren. Der Griff muss vollständig zusammengedrückt werden, bevor er durch die Trokarhülse entfernt wird.
2. Beim Einführen des Hefters durch die Trokarhülse und vor dem Einlegen eines Clips in das Instrumentenmaul sicherstellen, dass die zwei dünnen Linien auf der Hefterschaft aufgedruckt doppelte Linie vollständig zu sehen ist. Die doppelte Linie weist darauf hin, wann das Instrumentenmaul der Trokarhülse nicht mehr stört.
3. Wie der Platzierung eines Clips vorgehen, das das Instrumentenmaul frei von Clips oder anderen Hindernissen positioniert ist. Wenn das Maul über einem anderen Clip positioniert oder das Instrument über einen anderen Clip oder anderen Hindernissen abkommt wird, kann dies zu Blutungen und/oder mangelhafter Klammer führen, die Beschädigung des Instrumentenmauls kann die Folge sein.
4. Vergewissern Sie sich, dass das zu okkludierende Struktur sich vollständig im Clipbereich befindet, da es andernfalls zu Blutungen und/oder Lecks kommen kann.
5. Bei der Aktivierung des Instruments den Griff so weit wie möglich zusammendrücken. Bei Griff nicht vollständig zusammendrücken, kann dies zu einer schlechten Clip-Formung und evtl. zu Blutungen und/oder Lecks führen. Wenn der Griff nicht vollständig zusammengedrückt wird, kann dies verhindern, dass sich das Maul öffnet.
6. Wenn nach der Anwendung Blutungen und/oder Lecks beobachtet werden, können Elektrokauterisierung oder manuelles Vernähen eingesetzt werden, um die Hämostase zu gewährleisten.

7. Wenn Durchmessern einer Struktur nach der Platzierung eines Clips einen hinreichend großen distalen Geweberand belassen, um das Risiko einer Clip-Ablösung zu reduzieren. Die Ablösung eines Clips kann zu Blutungen und/oder Lecks führen.
8. Endoskopische Verfahren dürfen nur von Ärzten mit ausreichender Schulung und Erfahrung in endoskopischen Techniken durchgeführt werden. Von endoskopischen Verfahren ohne die medizinische Fachkenntnisse hinzugezogen werden, können verbundenen Verletzungen, Komplikationen und Risiken erwarten.

WARNUNG: Cholangiogramme dürfen nur mit einem Katheter mit Metallspitze durchgeführt werden, was nach dem Schließen des Clips die Durchgängigkeit des Katheterlumens gewährleistet.

9. Cholangiogramme können mit einem Katheter mit Metallspitze durchgeführt werden, was nach dem Schließen des Clips die Durchgängigkeit des Katheterlumens gewährleistet.

WARNUNG: Vor dem Entfernen des Endo Clip™ III Hefters durch die Trokarhülse sicherstellen, dass die Clip Logic™ Technologie deaktiviert ist und dass sich kein Clip im Maul befindet.

IM FALL, DASS SICH IN DEN MÄULERN NOCH EIN UNBENUTZTER CLIP IM MAUL BEFINDET ODER DASS DIE Clip Logic™ Technologie AKTIVIERT IST, DRÜCKEN SIE DEN GRIFF ZUSAMMEN UND ENTFERNEN SIE DAS INSTRUMENT MIT GESCHLOSSENEM MAUL AUS DER TROKARHÜLSE. LASSEN SIE DEN GRIFF LOS UND LAGERN SIE DEN GEFORMTEN CLIP OHNE PATIENTEN WEG MIT FARBE PATIENTEN.

3 CLIP SPEZIFIKATIONEN

F) CLIPBREITE

G) UNGEFÄHRE LÄNGE (geschlossen)

H) ANZAHL DER CLIPS

I) SCHAFTLÄNGE

BEI RAUMTEMPERATUR LAGERN. NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT ERHÖHTEN TEMPERATUREN AUSSETZEN.

IT

Applicatore di clip con tecnologia Clip Logic™

PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.

IMPORTANTE!

Il presente opuscolo funge da ausilio di assistere l'operatore nell'utilizzo del prodotto, non è pertanto da intendersi come materiale di riferimento per l'esecuzione di tecniche chirurgiche. Questo dispositivo è stato progettato, testato e realizzato esclusivamente per l'uso su un singolo paziente. Il riutilizzo o il trattamento ripetuti possono danneggiare il dispositivo e causare insuccesso del paziente. Trattamento ripetuti e/o la sterilizzazione di questo dispositivo possono determinare il rischio di contaminazione e di infezione a carico del paziente. Non riutilizzare, trattare ripetutamente o risterilizzare questo dispositivo.

DESCRIZIONE

L'applicatore di clip Endo Clip™ III contiene 16 clip in titanio. L'applicatore è stato progettato per l'introduzione e l'utilizzo attraverso un manicotto di trocar Covidien™ di tamaño appropiato o di misure più grandi con l'uso di un convertitore. La lunghezza del set di tige è di circa 33 cm (13 pollici).

INDICAZIONI

L'applicatore di clip Endo Clip™ III è indicato principalmente per pazienti sottoposti a procedure di chirurgia laparoscopica che comportano la dissezione e l'occlusione di vasi sanguigni, dotti e altre strutture tubolari, e per la marcatura radiografica.

CONTROINDICAZIONI

1. Il presente dispositivo non è stato previsto per la occlusie di tue trompe de Fallopio con fines anticoncezionales, pero puede utilizar para lograr la hemostasia después de cortar una trompa de Falopio.
2. No utilice el aplicador de clips Endo Clip™ III en el sistema circulatorio central, la arteriaa renal e iliaca, ni otros vasos en los que, por lo general, no se deberían utilizar clips metálicos indicados para ligadura.

AVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Antes de introducir o retirar el aplicador de clips Endo Clip™ III del manguito del trocar, asegúrese de que no haya ningún clip cargado en la mordaza y de que la tecnología Clip Logic™ no esté engaged. La tecnología Clip Logic™ se engaged cuando se aprieta el mango. Para desengatar la tecnología Clip Logic™, apriete el mango hasta el tope. Debe apretar el mango hasta el tope antes de la extracción a través del manguito del trocar.
2. Al introducir el aplicador a través del manguito del trocar, y antes de cargar un clip en la mordaza, asegúrese de que la doble línea impresa en el extremo distal del eje del aplicador esté perfectamente visible. La doble línea indica cuando las dos mordazas del dispositivo están libres de interferencias del manguito del trocar.

ADVERTENCIA: asegúrese de que la doble línea impresa en el extremo distal del eje del instrumento esté perfectamente visible antes de cargar un clip.

3. Il manico dell'applicatore di clip Endo Clip™ III ruota di 360° in entrambe le direzioni.
4. Premere parzialmente l'impugnatura con cautela per attivare la tecnologia Clip Logic™ e caricare una clip nella ganascia. Un rumore di scatto indicherà che la clip è stata completamente caricata. Premendo ulteriormente l'impugnatura si darà forma alla clip. Non eseguire alcun tentativo di dissezione ulteriore dopo avere udito questo primo rumore di scatto, in quanto la tecnologia Clip Logic™ non sarà innestata.

NOTA: non è necessario caricare completamente la clip prima di posizionare il tessuto tra le ganasce.

5. Posizionare le ganasce dello strumento attorno al vaso o alla struttura da ligare, assicurandosi che il vaso o la struttura si trovi completamente entro l'area delimitata dalla ganasce. Premere completamente l'impugnatura per attivare lo strumento e chiudere la clip sul vaso o sulla struttura. Un secondo rumore di scatto al termine della corsa dell'impugnatura indica che la clip è stata completamente formata e che l'impugnatura è arrivata a fine corsa. Rilasciare l'impugnatura completamente dopo l'applicazione della clip.

AVVERTENZA: verificare che la struttura interessata all'occlusione si trovi completamente entro l'area delimitata dalla clip, altrimenti potrebbero verificarsi sanguinamento o perdite.

AVVERTENZA: l'attivazione delle ganasce sopra un'altra clip o un'altra ostruzione potrebbe causare sanguinamento e/o perdite e danneggiare le ganasce dello strumento.

AVVERTENZA: premere a fondo l'impugnatura in modo deciso. Se l'impugnatura non viene premuta completamente, la formazione della clip potrebbe risultare incorretta con conseguente rischio di sanguinamento e/o perdite. L'incompleta pressione dell'impugnatura potrebbe inoltre impedire alle ganasce di aprirsi.

6. Rilasciare completamente l'impugnatura per liberare la clip dalle ganasce e rimuovere l'applicatore dal vaso o dalla struttura. Per le applicazioni successive, ripetere le fasi da 1 a 5.
7. Se viene osservata una fuoriuscita o un sanguinamento dopo l'applicazione, è possibile ricorrere all'elettrocauterizzazione o alla sutura manuale per garantire l'emostasi.
7. Durante la trasmissione di una struttura in seguito all'applicazione di una clip, lacciare un margine distale (tessuto) sufficiente a favorire la riduzione del rischio di spostamento della clip. Lo spostamento della clip può causare sanguinamento e/o perdite.
8. Le procedure endoscopiche devono essere effettuate esclusivamente da medici con un'adeguata preparazione e una buona conoscenza delle tecniche endoscopiche. Prima di eseguire procedure endoscopiche, consultare la letteratura medica e discutere con i medici esperti in merito a rischi, complicazioni e rischi.
9. Al fine di evitare rischi di scivolamento e ostruzioni, quando si applicano clip, assicurarsi che il tessuto sia inserito a fondo nelle ganasce e che la clip sia posizionata sulla parte più distale possibile del tessuto. Non applicare clip sulla punta o sulla parte laterale del tessuto.
10. Il bordo tagliente della clip è progettato per ridurre al minimo il rischio di lacerazione dei tessuti. Tuttavia, quando si applica una clip su tessuti molto fragili, come ad esempio i vasi sanguigni, esiste un rischio minimo di lacerazione.
11. Durante l'attivazione del dispositivo, evitare un'eccessiva torsione delle ganasce o la manipolazione dei tessuti. La deviazione delle ganasce e/o dell'asta durante l'attivazione può causare danni ai tessuti.
12. Questo dispositivo è fornito STERILE ed è esclusivamente monouso. SMALTIRE DOPO L'USO. NON RISTERILIZZARE.
13. L'applicatore di clip Endo Clip™ III non deve essere utilizzato accanto a vicino ad aree apparecchiature laser, qualora ciò fosse necessario, monitorare l'applicatore di Clip Endo Clip™ III per verificare il corretto funzionamento nella configurazione in cui sarà utilizzata.
14. Non eseguire colangiogrammi con nessun catetere, ad eccezione dei cateteri a punta metallica, i quali mantengono la pervietà del lume del catetere dopo la chiusura della clip.
15. Lo clip metallico in titanio di questo dispositivo non sono ferromagnetici. I pazienti a cui sono stati impiantati pertanto, possono essere esposti a RM e/o RMN da 3,0 Tesla o inferiore.

3 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

F) LARGHEZZA

G) LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA (chiusa)

H) QUANTITÀ DI CLIP

I) LUNGHEZZA DELL'ASTA

CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A TEMPERATURE ELEVATE.

ES

Aplicador de clips con tecnología Clip Logic™

LEA DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

¡IMPORTANTE!

Este folleto está diseñado para ayudarle a usar este producto. No se trata de un documento de referencia sobre técnicas quirúrgicas.

Este producto ha sido diseñado, probado y fabricado para utilizarse en un único paciente. La reutilización o el reprocesamiento de este producto puede provocar fallos y causar, como consecuencia, lesiones al paciente. El reprocesamiento y la esterilización de este producto pueden generar riesgo de contaminación y de infección para el paciente. No reutilice, reprocese ni esterilice este dispositivo.

DESCRIPCIÓN

El aplicador de clips Endo Clip™ III contiene 16 clips de titanio. El aplicador se ha diseñado para la introducción y utilización a través de un manguito de trocar Covidien™ de tamaño apropiado o de mayor calibre con el uso de un convertidor. La longitud del eje es de aproximadamente 33 cm (13").

INDICACIONES

El aplicador de Clips Endo Clip™ III está indicado principalmente para pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas laparoscópicas que incluyen la disección y la oclusión de vasos sanguíneos, conductos y otras estructuras tubulares, así como para marcados radiológicos.

CONTRAINDICACIONES

1. Este dispositivo no está previsto para la oclusión de las trompas de Falopio con fines anticonceptivos, pero puede utilizarse para lograr la hemostasia después de cortar una trompa de Falopio.
2. No utilice el aplicador de clips Endo Clip™ III en el sistema circulatorio central, la arteriaa renal e iliaca, ni otros vasos en los que, por lo general, no se deberían utilizar clips metálicos indicados para ligadura.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Antes de introducir o retirar el aplicador de clips Endo Clip™ III del manguito del trocar, asegúrese de que no haya ningún clip cargado en la mordaza y de que la tecnología Clip Logic™ no esté engaged. La tecnología Clip Logic™ se engaged cuando se aprieta el mango. Para desengatar la tecnología Clip Logic™, apriete el mango hasta el tope. Debe apretar el mango hasta el tope antes de la extracción a través del manguito del trocar.
2. Al introducir el aplicador a través del manguito del trocar, y antes de cargar un clip en la mordaza, asegúrese de que la doble línea impresa en el extremo distal del eje del aplicador esté perfectamente visible. La doble línea indica cuando las dos mordazas del dispositivo están libres de interferencias del manguito del trocar.

ADVERTENCIA: asegúrese de que la doble línea impresa en el extremo distal del eje del instrumento esté perfectamente visible antes de cargar un clip.

3. El eje del aplicador de clips Endo Clip™ III gira 360° en cualquier dirección.
4. Apriete el mango con suavidad para activar la tecnología Clip Logic™ y cargar un clip en la mordaza. Un chasquido significa que el clip se ha cargado correctamente. Al seguir apretando, se formará el clip. No intente llevar a cabo la disección cinco tras oír el primer chasquido, ya que la tecnología Clip Logic™ dejará de estar encajada.

NOTA: no es necesario la carga completa del clip antes de colocar el tejido en la mordaza.

5. Aplique las mordazas del instrumento rodeando el vaso o estructura que se desea ocluir, asegurándose de que dicho vaso o estructura se encuentra por completo dentro de las mordazas. Apriete el mango del todo para disparar el instrumento y crear el clip alrededor del vaso o la estructura. Un segundo chasquido al final del recorrido del mango indica que el clip está completamente formado y el mango ha llegado al tope. Deje que el mango regrese a su posición original tras disparar.

ADVERTENCIA: asegúrese de que la estructura que se va a ocluir cabe perfectamente entre los límites del clip; de lo contrario, puede producirse hemorragias e fugas.

ADVERTENCIA: la aplicación de las mordazas sobre otro clip o cualquier otra obstrucción podría producir hemorragias, anemia de hemostasia y daño a las mordazas del instrumento.

ADVERTENCIA: apriete el mango con firmeza hasta el tope. Si no se aprieta totalmente el mango, puede producirse una formación incorrecta del clip, con la posibilidad de hemorragia y/o fugas. Si no se aprieta al mango completamente, es posible que las mordazas no se abran.

6. Suelte el mango del todo para desengatar el clip de las mordazas y retire el instrumento del vaso o la estructura. Repita los pasos del 1 al 5 para las aplicaciones siguientes.
7. Si se observan hemorragias o fugas poco importantes después de la aplicación, puede utilizarse un electrocauterio o suturas manuales para garantizar la hemostasia.
7. El dispositivo tiene 3 clips azules que sirven de indicador visual de que se están agotando. Cuando aparece el primer clip azul, quedan 2 clips más en el dispositivo. La función de bloqueo de seguridad impedirá apretar el mango del aplicador y que se cierren las mordazas vacías.
8. Instruction for a single clip applier is available.

ADVERTENCIA: no realice colangiogramas con ningún catéter excepto un catéter con punta de metal que admita un catéter de luz permeable tras el cierre del clip.

9. Es posible llevar a cabo colangiogramas con catéteres de punta de metal que admiten un catéter de luz permeable tras el cierre del clip.

ADVERTENCIA: antes de extraer el aplicador de clips Endo Clip™ III a través del manguito del trocar, asegúrese de que la tecnología Clip Logic™ está desactivada y de que no haya ningún clip en las mordazas.

EN CASO DE QUE EN LAS MORDAZAS HAYA UN CLIP SIN DISPARAR O DE QUE LA TECNOLOGÍA Clip Logic™ ESTÉ ENCAJADA, APRIETE EL MANGO Y RETIRE EL INSTRUMENTO DEL MANGUITO DEL TROCAR CON LAS MORDAZAS CERRADAS. SUELTE EL MANGO Y DEJE CAER LOS CLIPS FORMADOS LEJOS DEL PACIENTE.

3 ESPECIFICACIONES DE LOS CLIPS

F) ANCHURA DEL CLIP

G) APROXIMADO APROXIMADO (cerrado)

H) CANTIDAD DE CLIPS

I) LONGITUD DEL EJE

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS.

PT

Aplicador de clipe com Tecnologia Clip Logic™

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INFORMAÇÕES.

IMPORTANTE!

Este folheto destina-se a auxiliá-lo na uso do produto. Ele não é fonte de consulta para técnicas cirúrgicas.

Este dispositivo foi projetado, testado e fabricado para uso em um único paciente. A reutilização ou o reprocessamento deste dispositivo pode gerar falhas no produto e lesões subsequentes ao paciente. O reprocessamento e/ou a esterilização deste dispositivo pode criar risco de contaminação e infecção no paciente. Não reutilize, reprocese ou esterilize este dispositivo.

DESCRIÇÃO

O aplicador de clips Endo Clip™ III possui 16 clipes de titânio. O aplicador foi projetado para a introdução e utilização através de uma bainha do trocarte Covidien™ de tamanho apropriado, ou maior, com o uso de conversor. O comprimento da haste é de aproximadamente 33 cm (13").

INDICAÇÕES

O aplicador de clipe Endo Clip™ III é, primordialmente, indicado para pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de laparoscopia envolvendo dissecção e oclusão de vasos sanguíneos, canais e outras estruturas tubulares, e para marcação radiográfica.

CONTRAINDICAÇÕES

1. Este dispositivo não se destina a oclusão tubária contraceptiva, mas pode ser utilizado para se conseguir hemóstase decorrente da transecção das trompas de Falópio.
2. Não utilize o aplicador de clipes Endo Clip™ III no sistema circulatório central, em artérias renais, artérias ilíacas ou em outros vasos nos quais normalmente não seriam usados clipes metálicos de ligadura.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. Antes de inserir ou remover o aplicador de clipes Endo Clip™ III do manguito do trocar, assegúrese de que se hapa ningún clip cargado en la mordaza y de que la tecnología Clip Logic™ no está engajada. La tecnología Clip Logic™ se engaja cuando se aperta el mango. Para desengajar la tecnología Clip Logic™, apriete el mango hasta el tope. Debe apretar el mango hasta el tope antes de la extracción a través del manguito del trocar.
2. Al introducir el aplicador a través del manguito del trocar, y antes de cargar un clip en la mordaza, asegúrese de que la doble línea impresa en el extremo distal del eje del aplicador esté perfectamente visible. La doble línea indica cuando las mordazas del dispositivo están libres de interferencias del manguito del trocar.

ADVERTÊNCIA: asegúrese de que la doble línea impresa en el extremo distal del eje del instrumento esté perfectamente visible antes de cargar un clip.

3. O cabo do aplicador de clipe Endo Clip™ III roda 360° em qualquer direção.
4. Aperte o mango com suavidade para ativar a tecnologia Clip Logic™ e alimentar um clipe dentro da garra. O som de um clique significará que o clipe foi totalmente inserido. Uma compressão adicional manipulará para utilizar o instrumento e fechar o clipe no vaso ou na estrutura. Um segundo clique será ouvido no final, significando que o clipe foi completamente modelado e a manopla foi manipulada totalmente. Após o disparo, deixe a manopla retornar totalmente à posição inicial.

ADVERTÊNCIA: Assegurar-se de que a estrutura a ser ocluída encaixe completamente dentro dos limites do clipe, caso contrário poderá ocorrer sangramento ou vazamentos.

ADVERTÊNCIAS: Duar as garras sobre outro clipe ou outras obstruções pode resultar em sangramento e/ou vazamento e pode danificar as garras do instrumento.

ADVERTÊNCIA: Comprima firmemente o manipulador. A falha em comprimir o manipulador completamente pode resultar em uma modelagem incorreta do clipe e possível sangramento e/ou vazamento. A falha em comprimir o manipulador completamente pode impedir as garras de se abrirem corretamente.

6. Solte completamente o manipulador para liberar o clipe das garras e remover o instrumento do vaso ou da estrutura. Repita os passos 1 a 5 para as aplicações subsequentes.
7. Se for observado sangramento e/ou vazamento mínimo após a aplicação, pode-se utilizar eletrocauterização ou suturas manual para auxiliar na hemostase.
7. O equipamento tem 3 clipes azuis que servem de indicador visual de que o cartucho está quase vazio. Quando o primeiro clipe azul aparecer, existem ainda 2 clipes adicionais restantes no dispositivo. Um recurso de intertravamento de segurança impede que o manipulador seja pressionado e que a garra vazia se feche.
8. Instruction for a single clip applier is available.

ADVERTÊNCIA: Colangiogramas não devem ser realizados com qualquer cateter exceto com um cateter de ponta metálica que permitirá lúmen de cateter patente após o fechamento do clipe.

9. É possível realizar colangiogramas com cateteres de ponta metálica que permitam lúmen de cateter patente após o fechamento do clipe.

ADVERTÊNCIA: Antes de remover o aplicador de clipe Endo Clip™ III através da bainha do trocarte, assegure-se de que a Tecnologia Clip Logic™ esteja desacoplada e que não haja nenhum clipe presente na garra.

NO CASO DE UM CLIPE NÃO UTILIZADO ESTIVER NA GARRA OU A TECNOLOGIA Clip Logic™ ESTIVER ACOPLADA, COMPRIMA O MANIPULADOR E REMOVA O INSTRUMENTO DA BAINHA DO TROCARTE COM A GARRA NA POSIÇÃO FECHADA. LIBERE O MANIPULADOR E REMOVA O CLIPE DO PACIENTE.

3 ESPECIFICAÇÕES DO CLIPE

F) LARGURA DO CLIPE

G) COMPRIMENTO APROXIMADO (fechado)

H) QUANTIDADE DE CLIPES

I) COMPRIMENTO DA HASTE

ARMAZENE EM TEMPERATURA AMBIENTE. EVITE EXPOSIÇÃO PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS.

NL

Krampistoel met Clip Logic™-technologie

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

BELANGRIJK!

Deze brochure dient als gebruiksaanwijzing voor dit product. Dit is geen naslagwerk voor chirurgische technieken.

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd voor slechts één patiënt. Hergebruik of verwerking van dit product kan leiden tot een slechte werking ervan, met event

13. Aplikator sweek Endo Clip™ ili by se normalno používat vedle jiného zařízení nebo když jeho součástí je dodatečné příslušenství, které by mohlo zasahovat do jeho činnosti.
14. Nepoužívejte chirurgických i jakýchkoli kartonů v výjimku kartónů s kovovým textem, které umožní vytvořit zprávy lumen po uvolnění svorky.
15. Tkanivové svorky s tvarem protínajúcej sa mřežovej je možné bez problémů vytvárať MRI artefakt pokiaľ v poli s intenzitě 3,0 Tesla nebo méně

3 **SOUČÁSTI SYSTÉMU**

A) CELKOVÝ
B) ZAVÁDĚCÍ LINKA
C) ZÁSOBNÍK KOMPONENTŮ
D) ROZLOŽENÝ

2 **NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Vložte aplikátor sweek Endo Clip™ do vhodné velkou trokarovou objímkou, čímž ručičnýje mohou být nastavený na maximální odtržitelné otáčením kruhového kloubovým uvolnění.
2. Po zavedení nástroje trokarovou objímkou a před otáčením svorky do cílové oblasti, zde je na vzdálenějším konci dílu vidět vyčištěná dvojitá linka. Ukazuje to, že jsou čelisti zatlačeny zcela a nedochází k trokarovou objímkou.

VAROVÁNÍ: Před zavedením svorky vytáhněte nástroje trokarovou objímkou zkontrolujte, zda se v kloubu nezachytil cévka a že není aktivní technologie Clip Logic™. Technologie Clip Logic™ se aktivuje po otáčení rukojeti. Rukojeť musí být zcela otočená, než může být odtržením z trokarovou objímkou.

3. Ujistěte se, že je rukojeť v uzamčené poloze a že je kloub zcela otevřený. Poté vložte distální konec aplikátoru do trokarové objímky a pomocí palce a ukazováku zatlačte na rukojeť, dokud se nezamkne.
4. Kontrolujte, zda je kloub zcela otevřený. Poté vložte distální konec aplikátoru do trokarové objímky a pomocí palce a ukazováku zatlačte na rukojeť, dokud se nezamkne.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte chirurgických i jakýchkoli kartonů s výjimku kartónů s kovovým textem, které umožní vytvořit zprávy lumen po uvolnění svorky.

5. Ujistěte se, že je kloub zcela otevřený. Poté vložte distální konec aplikátoru do trokarové objímky a pomocí palce a ukazováku zatlačte na rukojeť, dokud se nezamkne.

VAROVÁNÍ: Před zavedením aplikátoru uvnitř Endo Clip™ III trokarovou objímkou zkontrolujte, že je technologie Clip Logic™ deaktivována a že čelisti se nenachází uvnitř.

6. PŘÍPRAVA, ZE JE KLOUB APLIKÁTORU SWEEK Z ANTIK technologie Clip Logic™. STISKNĚTE RUKOJEŤ A VYJMĚTE NÁSTROJ Z TROKARICKÉ OBJÍMKY S ČELISTÍ SEVŘENÉ POLOZE. UVOLNĚTE RUKOJEŤ A OZUBENÉTO VYTVOŘENOU SVORKU Z PECKEN.

3 **TECHNICKÉ ÚDAJE A SYMBOLY**

TY ZÁSOBNÍKY
CZ PŘÍBALOVÁ ZLOŽKA (uvnitř krabice)
HU KÉZIKÖNYV SZÓRÓL
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SKLADOVÁNÍ PŘI DOPORUČENÉ TEPLOTĚ. OHŘÁTÍ PŘED DELŠÍ EXPOZICÍ ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM.

HU

Clip Logic™ technológiájú kapocsbehelyező

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI TUDNIVALÓKAT.
FONTOS
Ez a tájékoztató a termék használatának megkönnyítésére készült. Nem a sebészeti technikák kézikönyvének szánják.
Ezt az eszközt kizárólag egy képzett orvos használhatja. Ennek megfelelően ismernie kell, hogyan kell a gyakorlatban használni.
Ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e. Az eszköz újrahasználata vagy újrasterilizálása az eszköz szerkezetében és a gyártási megfelelőségben veszélyt tehet. Ne használja újra.
LEÍRÁS
Az Endo Clip™ kapocsbehelyező 10 klip kapocsot tartalmaz. A kapocsbehelyező megfelelő méretű vagy ernyő nagyságú, átlátszóval alkalmazott Covidien™ hiluhúrkamrán keresztül használható és használata tervezték. A nyelv hossza nagyjából 33 cm (13 hüvelyk).
JAVALLATOK
Az Endo Clip™ kapocsbehelyező elsődlegesen olyan beteg esetében történő használatra szánták, akiknél a vérelőnyek, ductusok, valamint egyéb tubulusi struktúrák ducorrójét és occlusióját is magában foglaló laparoszkópos sebészeti eljárást végeznek.
ELLENJAVALLATOK
1. A készülék nem contraceptív tubulis occlusiók esetén tervezték, de használható a fallopi-féle tumor típúl követő harmonizáció megkeresésére.
2. Ne használja az Endo Clip™ kapocsbehelyező készülékét a kapocsrét kereszthossz emelésére, a vese- és csípőartériák, valamint aneurizmák általában nem használhatóak a fentiről készült kapocsok.
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. Az Endo Clip™ kapocsbehelyező másodszori használat biztonságát és hatékonyságát nem vizsgálták. Ezért ne használja újra.
2. Ne használja a készüléket, ha a csomagolás sérült, vagy ha a kapocsbehelyező a használat előtt nem működik.
3. Ügyeljen arra, hogy a kapocsbehelyező nyelét ne hajlítsa meg. Ez károsíthatja a készüléket, az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja.
4. Ne használja a készüléket, ha a kapocsbehelyező nyelét ne hajlítsa meg. Ez károsíthatja a készüléket, az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja.
5. Ne használja a készüléket, ha a kapocsbehelyező nyelét ne hajlítsa meg. Ez károsíthatja a készüléket, az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja.
6. Ne használja a készüléket, ha a kapocsbehelyező nyelét ne hajlítsa meg. Ez károsíthatja a készüléket, az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja.
7. Amikor a kapocs behelyezése után nyílt állásban van, ne használja a kapocsbehelyezőt. Ez károsíthatja a készüléket, az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja.
8. Csak a megfelelő kapocsbehelyező eredetileg ki az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja. Az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja.
9. Az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja. Az eltérő irányú hajlítás pedig a készülék belsejében a vezetőrúd megtörését okozhatja.
10. Legyen készítésnél, ha a bármilyen fém kapocs-behelyezőeszközt tervezték alkalmaz. Ha figyelmeztetéssel egy kapocsban a kapocsrétből eltávolítsa a kapocsrétből a kapocsrétből a kapocsrétből

Box size: 7.13 x 21.13
Overall size: 18 x 18
Folds to: 3 x 6

COVIDIEN

Endo Clip™

Clip Applier



WARNING: DO NOT REMOVE THE APPLIER FROM THE CLOSED JAWS A CLIP IN THE JAW. TO DO SO MAY RESULT IN AN OPEN CLIP BEING DROPPED INTO THE BODY CAVITY. IN THE EVENT AN UNAPPLIED CLIP IN THE JAW, SUBJECT THE HANDLE AND/OR THE INSTRUMENT FROM THE TISSUE SLIGHTLY WITH THE JAW IN THE CLOSED POSITION. RELEASE THE HANDLE AND DROP THE UNAPPLIED CLIP AWAY FROM THE TISSUE.

CLIP SPECIFICATIONS

A APPROXIMATE CLOSURE

B CLIP QUANTITY

C APPROXIMATE LENGTH (MM)

AVOID PREMATURE EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURES.

FR

Applicateur d'attaches

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CI-DESSOUS. IMPORTANT :

Cette brochure est destinée à faciliter l'utilisation de ce produit. Elle ne constitue pas une référence en matière de technique chirurgicale.

Ce dispositif a été conçu, testé et fabriqué pour un usage chez un seul patient. La stérilisation et/ou un retraitement peuvent entraîner un risque de contamination et/ou de défaillance du dispositif. Ne pas modifier, réutiliser, ni retraiter ce dispositif.

DESCRIPTION

Le dispositif d'attaches Endo Clip™ contient 20 attaches en titane de taille M, 6 ML et 15 attaches en titane de taille L, ainsi qu'un applicateur à attaches. Les attaches sont chargées dans l'applicateur à attaches stérile prêt à l'emploi.

INDICATIONS

L'applicateur d'attaches Endo Clip™ est utilisable dans les procédures endoscopiques d'occlusion de vaisseaux et autres structures tissulaires, ainsi que pour le réapprochement des tissus.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce dispositif si la ligature des tissues a des fins contractiles, mais peut être employé pour l'occlusion de vaisseaux ou de tissus à ligaturer.

1. Ne pas utiliser l'applicateur d'attaches Endo Clip™ si usagé unique et présenté de l'autre étude, de l'autre étape et d'autre substance ou de l'autre contamination.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Ne pas chauffer l'applicateur d'attaches Endo Clip™ à usage unique à travers le marteau de tissus avant qu'une attache et chargée dans le mors et que celle-ci soit en contact avec le tissu à ligaturer.

2. Veiller à charger une attache dans le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas insérer, ni retirer, le mécanisme d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas insérer, ni retirer, le mécanisme d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

3. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

4. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

5. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

6. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

7. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

8. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

9. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

10. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

11. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

12. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

13. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

14. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

15. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

16. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

17. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

18. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

19. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

20. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

21. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

22. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

23. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

24. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

25. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

26. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

27. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

28. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

29. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

30. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

31. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

32. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

33. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

34. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

35. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

36. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

37. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

38. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

39. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

40. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

41. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

42. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

43. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

44. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

45. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

46. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

47. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

48. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

49. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

50. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

51. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

52. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

53. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

54. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

55. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

56. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

57. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

58. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

59. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

60. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

61. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

62. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

63. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

64. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

65. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

66. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

67. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

68. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

69. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

70. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

71. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

72. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

73. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

74. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

75. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

76. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

77. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

78. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

79. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

80. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

81. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

82. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

83. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

84. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

85. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

86. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

87. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

88. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

89. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

90. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

91. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

92. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

93. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

94. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

95. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

96. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

97. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

98. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

99. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

100. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient. Ne pas ouvrir le mors de l'applicateur d'attaches Endo Clip™ avant d'introduire le dispositif dans le corps du patient.

AVERTISSEMENT : ÉVITER DE SERRER TROP LA POIGNÉE. CELA PEUT ENTRAÎNER LA CHUTE D'UNE AGRAFE DANS LA CAVITÉ CORPORELLE. NE PAS RÉUTILISER, NI RETRAITER CE DISPOSITIF. LE RETRAITEMENT PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE CONTAMINATION ET/OU DE DÉFAILLANCE DU DISPOSITIF. CE DISPOSITIF NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

**MISE EN GARDE :