



Lotion for exfoliation

SALICYLICPEEL 15 % and 25 %
for professional use only

Medic Control Peel

Ingredients

Salicylic acid 15 or 25 g
Isopropyl alcohol up to 100 g

Description

SALICYLICPEEL 15 % or 25 % from Medic Control Peel is a transparent colorless liquid with a typical odor. In the case of keeping at low ambient temperature (less than +10 °C) reversible precipitation of salicylic acid crystals may occur. In case of precipitation of salicylic acid crystals SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel) should be kept at room temperature for 3 hours.

Use

SALICYLICPEEL 15 % or 25 % from Medic Control Peel is intended for aesthetic correction of minor defects of face and body: wrinkles, hyperkeratosis, post-traumatic and post-operative scars, post-acne scars and other defects of skin relief, lentigo and acne.

Indications for use

1. Seborrhea.
2. Acne.
3. Defects of skin microrelief.
4. Senile lentigo.
5. Actinic hyperkeratosis.
6. Fading skin.
7. Post-acne scars.

Contraindications

1. Hypersensitivity to the components.
2. Dermatoses in the acute phase and dermatitis of various etiologies, including infectious inflammatory diseases (herpes, pyoderma and so forth).
3. Damaged skin surface.
4. Chronic somatic diseases in acute and decompensated phases.
5. Pregnancy and lactation.
6. Sunbathing (also solariums) during the course of peeling, immediately after the peeling procedure, as well as during the rehabilitation period.

Method of application

For professional use only!

SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel) is allowed for use by trained and licensed specialists in accordance with current legislation!

Pre-peel preparation

Can be recommended at the discretion of a specialist. Patient with skin problems or acne should use CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) daily every other day for 7-14 days or GENTLE CLEANSER MOUSSE (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) daily. Patients with fading skin and hyperpigmentation should use PREPEEL ACTIVE cream (Medic Control Peel) every other day. Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) or UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) moisturizing cream serum daily during daylight hours.

Chemical peel

Step 1. Remove make-up including the eye area with MICELLAR CLEANSER for express make-up removal (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) or with ETHEREAL CLEANSER soft cleansing emulsion (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).

Step 2. Cleansing. Apply CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) onto the skin, massage lightly and leave for 15-20 seconds. Emulsify. Rinse with water. Dry the skin.

Step 3. Degrease the skin using PREPEEL LOTION (Medic Control Peel).

Step 4. Using cotton pads apply SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel) (moisten a cotton pad directly from the bottle) with fast movements onto the entire surface of the face. Patient will experience a burning sensation during the application of SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel). The liquid in SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel) should evaporate after 2-3 minutes and white salicylic acid crystals will appear on the skin. You can judge the evenness of application of the peel on all treated areas by the homogeneity of the white scurf. Do not rinse. You may need to apply a subsequent layer of the peel. The most common technique is to apply 3-4 layers of SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel). The number of layers is to be determined by a specialist, based on the individual characteristics of patient's skin, indications, and can be increased up to 7-8 layers*. Through 2-4 minutes after applying the last coat wash off composition the large amount of water. Dry the skin.

Step 5. Apply VEGEFARMA mask (Medic Control Peel) and leave for 10-15 minutes. Remove remaining product with a cosmetic tissue.

Step 6. Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) or UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) moisturizing cream serum.

Post-peel care

It is imperative to apply to the skin within 5-7 days after the treatment VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THRIPHALAN balm (Medic Control Peel) and protect the skin from UV radiation in the morning by applying MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) or UV EXPERT MOISTURIZER SPF 50+ (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) moisturizing cream serum.

Side effects

After applying SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel) by the most common technique (3 layers) erythema persists from several hours up to 14 days. 2 days after the treatment desquamation appears which lasts to 10 days. The patient must be warned that it is inadmissible to remove from skin occurred crusts or flakes.

Based on patient's individual characteristics possible subjective feeling of skin tightening and of discomfort, symptoms of contact dermatitis, pastosity, lichenification, eczematization, eruption of papules and pustules may appear in the post-peel period.

* In the case of increasing number of applied layers of SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel) side effects duration may be increased to 30 days.

Precautions

The protocol of the procedure is to follow!

Avoid contact with eyes! In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water, then with 2 % solution of sodium bicarbonate.

How supplied

30.0 ml of SALICYLICPEEL 15 % or 25 % (Medic Control Peel) is supplied in a glass bottle, packaged in a cardboard box together with instruction for use.

Storage conditions

Store in a place protected from light at the temperature between +5 and +25 °C.

After opening the bottle must be kept tightly closed to avoid evaporation of isopropyl alcohol.

Terms of sale

To be sold to specialized beauty salons and clinics.

Not for free sale.

Shelf life


3 years. Do not use after expiry date indicated on the package.

Complaints and claims on quality of medical device are accepted by an authorized representative of the manufacturer.

Manufacturer

"Laboratory THOSCANE" LLC, Russia

Symbols on the package





Материал для эксфолиации
SALICYLICPEEL JS
САЛИЦИЛИКПИЛ JS
для профессионального
применения
ТУ 9398-006-58568834-2011

Medic Control Peel

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12109 от 14.10.2011 г.
Материал для эксфолиации САЛИЦИЛИКПИЛ (SALICYLICPEEL)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Состав

Салициловая кислота	14 г
Резорцин	14 г
Молочная кислота	10 г
Спирт изопропиловый	до 100 г

Описание

SALICYLICPEEL JS Medic Control Peel представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом. В случае хранения при пониженной температуре окружающей среды (ниже +10 °C) возможно обратимое выпадение кристаллов салициловой кислоты. В случае выпадения кристаллов салициловой кислоты следует выдержать SALICYLICPEEL JS при комнатной температуре в течение 3 часов.

Назначение

SALICYLICPEEL JS предназначен для проведения профессиональной процедуры химического пилинга кожи лица и тела. Применяется для профилактики и коррекции эстетических недостатков кожи: морщин, гиперкератоза, посттравматических и послеоперационных рубцов, гиперпигментации, следов постаппе и других нарушений рельефа кожи, лентиги, а также акне лёгкой степени тяжести.

Показания к применению

1. Увядающая кожа.
2. Мелкие и глубокие морщины.
3. Себорея.
4. Акне.
5. Нарушения микрорельефа кожи.
6. Признаки фотостарения кожи.
7. Гиперпигментация.
8. Солнечное и себорейное лентиги.
9. Актинический гиперкератоз.
10. Рубцы и пятна постаппе.

Противопоказания к применению

1. Повышенная чувствительность к компонентам.
2. Дерматозы в стадии обострения и дерматиты различной этиологии, в том числе инфекционные воспалительные заболевания (герпес, пиодермия и пр.).
3. Нарушение целостности кожных покровов.
4. Хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации.
5. Беременность и лактация.
6. Фотосенсибилизация, посещение солярия или принятие интенсивных солнечных ванн во время проведения курса пилинга, сразу после проведения процедуры пилинга, а также в период реабилитации.

Способ применения

Только для профессионального применения!
SALICYLICPEEL JS разрешен к применению специалистами, прошедшими обучение и аттестацию в соответствии с действующим законодательством!

Предпилинговая подготовка

Может быть рекомендована на усмотрение специалиста. При проблемной коже или акне пациент должен через день в течение 7-14 дней очищать кожу муссом CLEANSER MOUSSE. Если показаниями к пилингу являются увядающая кожа или гиперпигментация, необходимо через день использовать крем PREPEEL ACTIVE. Ежедневно в светлое время суток необходимо наносить солнцезащитный крем MEDISCREEN SPF 85.

Протокол проведения химического пилинга

1 шаг. После демакияжа нанести очищающий CLEANSER MOUSSE, распределить легкими массажными движениями. Тщательно смыть водой. Кожу просушить.

2 шаг. Обезжирить кожу, используя PREPEEL LOTION.

3 шаг. Ватными дисками быстрыми движениями нанести SALICYLICPEEL JS (ватный диск смачивают непосредственно из флакона) на всю кожу лица. Во время нанесения SALICYLICPEEL JS пациент ощущает жжение. Через 2-3 мину-

ты жидкая фракция испаряется и на коже появляется белый налет, образованный кристаллами салициловой кислоты. По однородности налета можно судить о равномерности нанесения пилингового состава на все обработанные зоны. Не смывать. Далее можно наносить следующий слой. Наиболее распространённой методикой является нанесение 3-4 слоев SALICYLICPEEL JS. Количество слоев определяется специалистом, исходя из индивидуальных особенностей кожи пациента, показаниями, а также желаемой глубиной пенетрации, и может быть увеличено до 6-8*.

4 шаг. Через 4 часа пациент должен самостоятельно смыть состав водой и нанести восстанавливающий бальзам THRIPHALAN, излишки промокнуть салфеткой.

5 шаг. В дневное время нанести регенерирующий солнцезащитный крем MEDISCREEN SPF 85.

Постпилинговый уход

В течение 7-14 дней после процедуры (в зависимости от длительности реабилитационного периода) пациент должен использовать регенерирующие средства: SMART LOTION для восстановления pH кожи и восстанавливающий бальзам THRIPHALAN; в дневное время применять солнцезащитный крем MEDISCREEN SPF 85.

Побочные эффекты

После применения SALICYLICPEEL JS по наиболее распространённой методике (3 слоя) эритема сохраняется от нескольких часов до 14 суток. Через 2 дня после процедуры начинается шелушение, которое продолжается от 5 до 14 суток. Необходимо предупредить пациента о недопустимости принудительного удаления появившихся корочек, чешуек или пленок.

В зависимости от индивидуальных особенностей пациента в постпилинговом периоде могут наблюдаться симптомы раздражения и чувствительности кожи, пастозность, лихенификация, экзематизация, папулопустулезная сыпь.

* В случае увеличения количества слоев нанесения SALICYLICPEEL JS длительность побочных эффектов может увеличиваться до 30 суток.

Меры предосторожности

Соблюдать протокол проведения процедуры!

Не допускать попадания в глаза! При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, затем 2% раствором гидрокарбоната натрия.

Форма выпуска

SALICYLICPEEL JS поставляется по 30,0 мл в стеклянном флаконе. Флакон помещается вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C. После вскрытия флакон следует плотно закрыть во избежание испарения спирта изопропилового.

Условия реализации

Реализуется в специализированные учреждения.

Не предназначен для свободной реализации населению.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Рекламации и претензии по качеству медицинского изделия принимаются производителем.

Производитель

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия
11123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3
тел.: +7 (495) 280 89 16, info@thoscane.ru

Символы на упаковке



Осторожно!



Обратитесь к инструкции по применению



25 °C
5 °C
Предел температуры



Не допускать воздействия солнечного света

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани

Лаборатория Тоскани



Lotion for exfoliation
SALICYLICPEEL JS
for professional use only

Medic Control Peel

INSTRUCTIONS FOR USE FOR MEDICAL DEVICE

Composition

Salicylic acid	14 g
Resorcin	14 g
Lactic acid	10 g
Isopropyl alcohol	up to 100 g

Description

SALICYLICPEEL JS Medic Control Peel is a transparent colorless liquid with a typical odor. In the case of keeping at low ambient temperature (less than +10 °C) reversible precipitation of salicylic acid crystals may occur. In case of precipitation of salicylic acid crystals SALICYLICPEEL JS should be kept at room temperature for 3 hours.

Use

SALICYLICPEEL JS is intended for professional peeling procedure of face and body skin. It is intended for prevention and correction of aesthetic skin defects: wrinkles, hyperkeratosis, post-traumatic and post-operative scars, hyperpigmentation, post-acne scars and other defects of skin relief, lentigo and acne of mild severity.

Indications for use

1. Fading skin.
2. Superficial and deep wrinkles
3. Seborrhea.
4. Acne.
5. Defects of skin microrelief.
6. Signs of photo-aging
7. Hyperpigmentation.
8. Solar and senile lentigo.
9. Actinic hyperkeratosis.
10. Post-acne scars and pigmentation.

Precautions for use

1. Hypersensitivity to the components.
2. Dermatoses in the acute phase and dermatitis of various etiologies, including infectious inflammatory diseases (herpes, pyoderma and so forth).
3. Damaged skin surface.
4. Chronic somatic diseases in acute and decompensated phases.
5. Pregnancy and lactation.
6. Photosensitization, intensive sunbathing or solariums during the course of peeling, immediately after the peeling procedure, as well as during the rehabilitation period.

Method of application

For professional use only!

SALICYLICPEEL JS is allowed for use by trained and licensed specialists in accordance with current legislation!

Pre-peel preparation

Can be recommended at the discretion of a specialist. Patients with skin problems or acne should use CLEANSER MOUSSE.

Patients with fading skin or hyperpigmentation should use PREPEEL ACTIVE cream every other day. Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream daily during daylight hours.

Chemical peel

Step 1. After make-up removing apply CLEANSER MOUSSE onto the skin, massage lightly. Rinse with water. Dry the skin.

Step 2. Degrease the skin with PREPEEL LOTION.

Step 3. Using cotton pads apply SALICYLICPEEL JS (moisten a cotton pad directly from the bottle) with fast movements onto the entire surface of the face. Patient will experience a burning sensation during the application of SALICYLICPEEL JS. The liquid in SALICYLICPEEL JS should evaporate after 2-3 minutes and white salicylic acid crystals will appear on the skin. You can judge the evenness of application of the peel

on all treated areas by the homogeneity of the white scurf. Do not rinse. You may need to apply a subsequent layer of the peel. The most common technique is to apply 3-4 layers of SALICYLICPEEL JS. The number of layers is to be determined by a specialist, based on the individual characteristics of patient's skin, indications and desired depth of penetration, and can be increased up to 6-8 layers*.

Step 4. After 4 hours the patient should wash the treated area with water and apply regenerating balm THRIPHALAN. Remove remaining product with a cosmetic tissue.

Step 5. Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream during daylight hours.

Post-peel care

Depending on duration of rehabilitation period it is imperative to apply to the skin within 7-14 days after the treatment: SMART LOTION to restore skin pH and regenerating balm THRIPHALAN. Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream during daylight hours.

Side effects

After applying SALICYLICPEEL JS by the most common technique (3 layers) erythema persists from several hours up to 14 days. 2 days after the treatment desquamation appears which lasts from 5 to 14 days. The patient must be warned that it is inadmissible to remove from skin occurred crusts or flakes. Based on patient's individual characteristics symptoms of skin irritation and sensitivity pastosity, lichenification, eczematization, eruption of papules and pustules may appear in the post-peel period.

*In the case of increasing number of applied layers of SALICYLICPEEL JS side effects duration may be increased to 30 days.

Warnings

The protocol of the procedure is to follow!

Avoid contact with the eyes! In case of contact with the eyes rinse immediately with plenty of water, then with 2% solution of sodium bicarbonate.

How supplied

30,0 ml of SALICYLICPEEL JS is supplied in a glass bottle, packaged in a cardboard box together with instruction for use.

Storage conditions

Store in a place protected from light at the temperature between +5 and +25 °C.

After opening the bottle must be kept tightly closed to avoid evaporation of isopropyl alcohol.

Terms of sale

To be sold to specialized beauty salons and clinics.

Not for free sale.

Shelf life

3 years. Do not use after expiry date indicated on the package.

Complaints and claims on quality of medical product are accepted by an authorized representative of the manufacturer.

Manufacturer

"Laboratory THOSCANE", LLC, Russia

Symbols on the package

