

ПЕРЕЧЕНЬ
вложенный, входящих в аптечку первой помощи универсальную

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество из расчета на 2-10 человек
1	Бинт медицинский стерильный размер 5 м x 10 см	штука	1
2	Бинт медицинский стерильный размер 7 м x 14 см	штука	1
3	Глицерил принтират 0,5 мг	таблетка	20
4	Дрогаверин таблетки 40 мг	таблетка	10
5	Жгут кровоостанавливающий Эсмарха	штука	1
6	Каптоприл таблетки 25 мг	таблетка	20
7	Кеторолак таблетки 10 мг	таблетка	10
8	Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 x 10 см	штука	3
9	Лоратадин таблетки 10 мг	таблетка	10
10	Маска медицинская нестерильная одноразовая	штука	5
11	Ножницы atraumaticкие для резки бинта и одежды	штука	1
12	Пакет гипотермический охлаждающий	штука	1
13	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный	штука	2
14	Парашетамол таблетки 500 мг	таблетка	10
15	Перекись водорода 3 % – 100 мл	флакон	1
16	Перчатки медицинские нестерильные	пара	5
17	Салфетка антисептическая с этанолом	штука	10
18	Салфетка стерильная размером не менее 10x10	шт	5
19	Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения	штука/ампула	10/10
20	Термометр медицинский электронный	штука	1
21	Термометр	штука	1
22	Уголь, активированный таблетки 250 мг	таблетка	20
23	Фенотерол раствор или ингаляций 1 мг/мл во флаконах 20 мг/сальбутамол аэрозоль или ингаляций дозированный 100 мкг/доза в ингаляторе 200 доз	флакон	1

ПЕРЕЧЕНЬ
вложенный, входящих в аптечку первой помощи универсальную

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество из расчета на 2-10 человек
1	Бинт медицинский стерильный размер 5 м x 10 см	штука	1
2	Бинт медицинский стерильный размер 7 м x 14 см	штука	1
3	Глицерил принтират 0,5 мг	таблетка	20
4	Дрогаверин таблетки 40 мг	таблетка	10
5	Жгут кровоостанавливающий Эсмарха	штука	1
6	Каптоприл таблетки 25 мг	таблетка	20
7	Кеторолак таблетки 10 мг	таблетка	10
8	Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 x 10 см	штука	3
9	Лоратадин таблетки 10 мг	таблетка	10
10	Маска медицинская нестерильная одноразовая	штука	5
11	Ножницы atraumaticкие для резки бинта и одежды	штука	1
12	Пакет гипотермический охлаждающий	штука	1
13	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный	штука	2
14	Парашетамол таблетки 500 мг	таблетка	10
15	Перекись водорода 3 % – 100 мл	флакон	1
16	Перчатки медицинские нестерильные	пара	5
17	Салфетка антисептическая с этанолом	штука	10
18	Салфетка стерильная размером не менее 10x10	шт	5
19	Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения	штука/ампула	10/10
20	Термометр медицинский электронный	штука	1
21	Термометр	штука	1
22	Уголь, активированный таблетки 250 мг	таблетка	20
23	Фенотерол раствор или ингаляций 1 мг/мл во флаконах 20 мг/сальбутамол аэрозоль или ингаляций дозированный 100 мкг/доза в ингаляторе 200 доз	флакон	1



Инструкция по применению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, входящих в аптечку первой помощи универсальную

1. Бинт медицинский стерильный применяется для фиксации и наложения повязок, для остановки кровотечения, для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.
2. Глицерил триглицерид (нитроглицерин) – сосудорасширяющее средство (предшественно коронарные артерии и сосуды мозга), применяется для купирования приступов стенокардии (1 таб. помещают под язык до полного рассасывания). При отсутствии терапевтического эффекта в течение первых 5 мин необходимо принять еще одну таблетку препарата. При отсутствии терапевтического эффекта после 2-3 - кратного приема необходимо вызвать врача (вероятность развития инфаркта миокарда). Длительность действия нитроглицерина около 45 минут.
3. Дрогверин (ношпа) спазмолитическое средство, снимает боль, вызванную спазмами гладкой мускулатуры. 1-2 таблетки 3 раза в сутки.
4. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха используется для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей. Кроме того, его можно использовать при синдроме сдавливания в качестве защитных жгутов, а также при отеке легких – в качестве турникетных жгутов. При повреждении кровеносных сосудов наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более, чем на 1,5 часа.
5. Катетриол применяется при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности (в составе комбинированной терапии). Внутрь, за 1 час до еды. При артериальной гипертензии: начальная доза – 25 мг 2 раза в сутки, при необходимости разовую дозу увеличивают до 50 мг 2 раза в сутки с интервалами 2-4 нед. поддерживающая доза 25 мг 2-3 раза в сутки, максимальная суточная доза – 150 мг. При хронической сердечной недостаточности, в постинфарктном периоде: начальная доза – по 6,25 мг 3 раза в сутки с последующим повышением (каждые 2-3 нед) до поддерживающей дозы 25 мг 2-3 раза в сутки или до 50 мг 3 раза в сутки (в постинфарктном периоде). Максимальная суточная доза – 150 мг.
6. Кеторолак применяется для краткосрочного купирования умеренной боли. Взрослым Кеторолак назначают по 10 мг каждые 4-6 часов при необходимости. Не рекомендуется применять препарат в дозах, которые превышают 40 мг в сутки.
7. Лейкопластырь применяется для защиты порезов, царапин, ранок и других повреждений кожи от заражения бактериями. Открыть упаковку, вынуть лейкопластырь, отрезать нужный размер. Снять защитный слой, не прикасаясь пальцами к антисептической подушке лейкопластыря. Приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем. Менять по мере необходимости.
8. Лоратадин оказывает противоаллергическое, противоотечное действие, применяется по 1 таб. 1 раз в сутки до еды (взрослым).
9. Маска медицинская нестерильная одноразовая предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от инфекционных заражений через дыхательные пути во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения.
10. Ножницы травматические предназначены для резки бинта и одежды.
11. Пакет гипотермический охлаждающий – пакет раздавать, положить на место травмы при ушибах, гематомах, при локальных ожогах приложить к стерильной повязке.
12. Пакет гипотермический индивидуальный стерильный предназначен для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи при несчастных случаях, стихийных бедствиях, техногенных авариях и других экстремальных ситуациях, в том числе в военных условиях.
13. Парашеатомол жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство, взрослым по 1 таб. 3-4 раза в сутки.
14. Перекись водорода 3%-100мл. применяют как дезинфицирующее средство для промывания ран.
15. перчатки медицинские нестерильные применяются в качестве защитного средства при оказании первой помощи.
17. салфетка антисептическая с этанолом обладает антимикробной активностью. Применяется для обработки кожи пациентов.
18. Салфетка стерильная размером не менее 10х10 применяются при повреждении кожных покровов.
19. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аминак раствор для наружного применения (100 мг/мл в ампулах 1 мл Аминак раствор 10% (аминияк, нашатырный спирт) – применяют при обмороке, утаре. Кусок ваты или бинта смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек.
20. Термометр медицинский электронный применяется для измерения температуры тела.
21. Тонометр предназначен для измерения артериального давления и частоты пульса.
22. Уголь активированный применяют при диспепсии, метеоризме, пищевых интоксикациях.
23. Фенотерол раствор или ингаляций 1 мг/мл во флаконах 20 мл/салфубатомол аэрозоль или ингаляций дозированных 100 мг/доза в ингаляторе 200 доз предназначен для купирования обострения симптомов бронхальной астмы, включая острый бронхоспазм, можно применять 1 ингаляцию (100 мг) как минимальную стартовую дозу. В случае необходимости дозу можно увеличить до 200 мг (2 ингаляций).

Инструкция по применению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, входящих в аптечку первой помощи универсальную

3. Бинт медицинский стерильный применяется для фиксации и наложения повязок, для остановки кровотечения, для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.
4. Глицерил триглицерид (нитроглицерин) – сосудорасширяющее средство (предшественно коронарные артерии и сосуды мозга), применяется для купирования приступов стенокардии (1 таб. помещают под язык до полного рассасывания). При отсутствии терапевтического эффекта в течение первых 5 мин необходимо принять еще одну таблетку препарата. При отсутствии терапевтического эффекта после 2-3 - кратного приема необходимо вызвать врача (вероятность развития инфаркта миокарда). Длительность действия нитроглицерина около 45 минут.
3. Дрогверин (ношпа) спазмолитическое средство, снимает боль, вызванную спазмами гладкой мускулатуры. 1-2 таблетки 3 раза в сутки.
4. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха используется для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей. Кроме того, его можно использовать при синдроме сдавливания в качестве защитных жгутов, а также при отеке легких – в качестве турникетных жгутов. При повреждении кровеносных сосудов наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более, чем на 1,5 часа.
5. Катетриол применяется при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности (в составе комбинированной терапии). Внутрь, за 1 час до еды. При артериальной гипертензии: начальная доза – 25 мг 2 раза в сутки, при необходимости разовую дозу увеличивают до 50 мг 2 раза в сутки с интервалами 2-4 нед. поддерживающая доза 25 мг 2-3 раза в сутки, максимальная суточная доза – 150 мг. При хронической сердечной недостаточности, в постинфарктном периоде: начальная доза – по 6,25 мг 3 раза в сутки с последующим повышением (каждые 2-3 нед) до поддерживающей дозы 25 мг 2-3 раза в сутки или до 50 мг 3 раза в сутки (в постинфарктном периоде). Максимальная суточная доза – 150 мг.
6. Кеторолак применяется для краткосрочного купирования умеренной боли. Взрослым Кеторолак назначают по 10 мг каждые 4-6 часов при необходимости. Не рекомендуется применять препарат в дозах, которые превышают 40 мг в сутки.
7. Лейкопластырь применяется для защиты порезов, царапин, ранок и других повреждений кожи от заражения бактериями. Открыть упаковку, вынуть лейкопластырь, отрезать нужный размер. Снять защитный слой, не прикасаясь пальцами к антисептической подушке лейкопластыря. Приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем. Менять по мере необходимости.
8. Лоратадин оказывает противоаллергическое, противоотечное действие, применяется по 1 таб. 1 раз в сутки до еды (взрослым).
9. Маска медицинская нестерильная одноразовая предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от инфекционных заражений через дыхательные пути во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения.
10. Ножницы травматические предназначены для резки бинта и одежды.
12. Пакет гипотермический охлаждающий – пакет раздавать, положить на место травмы при ушибах, гематомах, при локальных ожогах приложить к стерильной повязке.
13. Пакет гипотермический индивидуальный стерильный предназначен для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи при несчастных случаях, стихийных бедствиях, техногенных авариях и других экстремальных ситуациях, в том числе в военных условиях.
14. Парашеатомол жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство, взрослым по 1 таб. 3-4 раза в сутки.
15. перекись водорода 3%-100мл. применяют как дезинфицирующее средство для промывания ран.
16. перчатки медицинские нестерильные применяются в качестве защитного средства при оказании первой помощи.
17. салфетка антисептическая с этанолом обладает антимикробной активностью. Применяется для обработки кожи пациентов.
18. Салфетка стерильная размером не менее 10х10 применяются при повреждении кожных покровов.
19. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аминак раствор для наружного применения (100 мг/мл в ампулах 1 мл Аминак раствор 10% (аминияк, нашатырный спирт) – применяют при обмороке, утаре. Кусок ваты или бинта смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек.
20. Термометр медицинский электронный применяется для измерения температуры тела.
21. Тонометр предназначен для измерения артериального давления и частоты пульса.
22. Уголь активированный применяют при диспепсии, метеоризме, пищевых интоксикациях.
23. Фенотерол раствор или ингаляций 1 мг/мл во флаконах 20 мл/салфубатомол аэрозоль или ингаляций дозированных 100 мг/доза в ингаляторе 200 доз предназначен для купирования обострения симптомов бронхальной астмы, включая острый бронхоспазм, можно применять 1 ингаляцию (100 мг) как минимальную стартовую дозу. В случае необходимости дозу можно увеличить до 200 мг (2 ингаляций).

ПЕРЕЧЕНЬ
вложенный, входящих в аптечку для оснащения транспортных средств

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество из расчета на 2-10 человек
1	Бинт медицинский стерильный размер 5 м x 10 см	штука	1
2	Бинт медицинский стерильный размер 7 м x 14 см	штука	1
3	Жгут кровоостанавливающий Эсмарха	штука	1
4	Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 x 10 см	штука	10
5	Ножницы аправматические для резки бинта и одежды	штука	1
6	Одеяло изотермическое 160 см x210 см	штука	1
7	Пакет гипотермический охлаждающий	штука	1
8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	штука	2
9	Перекись водорода 3 % – 40 мл	флакон	1
10	Перчатки медицинские нестерильные	пара	3
11	Салфетка марлевая медицинская стерильная размером не менее 10x10 №1	шт	5
12	Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл	штука/ампула	2/2

ПЕРЕЧЕНЬ
вложенный, входящих в аптечку для оснащения транспортных средств

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество из расчета на 2-10 человек
1	Бинт медицинский стерильный размер 5 м x 10 см	штука	1
2	Бинт медицинский стерильный размер 7 м x 14 см	штука	1
3	Жгут кровоостанавливающий Эсмарха	штука	1
4	Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 x 10 см	штука	10
5	Ножницы аправматические для резки бинта и одежды	штука	1
6	Одеяло изотермическое 160 см x210 см	штука	1
7	Пакет гипотермический охлаждающий	штука	1
8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	штука	2
9	Перекись водорода 3 % – 40 мл	флакон	1
10	Перчатки медицинские нестерильные	пара	3
11	Салфетка марлевая медицинская стерильная размером не менее 10x10 №1	шт	5
12	Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл	штука/ампула	2/2



Инструкция по применению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, входящих в аптечку первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильную)

1. Бинт медицинский стерильный применяется для фиксации и наложения повязок, для остановки кровотечения, для предохранения раны от вторичного заражения и высушивания.
2. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха используется для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей. Кроме того, его можно использовать при синдроме сдавливания в качестве защитных жгутов, а также при отеке легких – в качестве турникетных жгутов. При повреждении кровеносных сосудов наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более, чем на 1,5 часа.
3. Лейкопластырь применяется для защиты порезов, царапин, ранок и других повреждений кожи от заражения бактериями. Открыть упаковку, вынуть лейкопластырь, отрезать нужный размер. Снять защитный слой, не прикасаясь пальцами к антисептической подложке лейкопластыря. Приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем. Менять по мере необходимости.
4. Ножины травматические предназначены для резки бинта и одежды.
5. Пакет гипотермический охлаждающий – пакет раздавить, положить на место травмы при ушибах, гематомах, при локальных ожогах приложить к стерильной повязке
6. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный предназначен для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи при несчастных случаях, стихийных бедствиях, техногенных авариях и других экстремальных ситуациях, в том числе в военных условиях.
7. перекинь водорода 3%-100мл. применяют как дезинфицирующее средство для промывания ран.
8. перчатки медицинские нестерильные применяются в качестве защитного средства при оказании первой помощи
9. Салфетка стерильная размером не менее 10х10 применяются при повреждении кожных покровов.
10. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл Аммония раствор 10% (аммиак, нашатырный спирт) – применяют при обмороке, утаре. Кусок ваты или бинта смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек
11. Одежда изотермическое 160 см x210 см предназначено для защиты пострадавшего от переохлаждения или перегрева в чрезвычайных ситуациях

Инструкция по применению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, входящих в аптечку первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильную)

3. Бинт медицинский стерильный применяется для фиксации и наложения повязок, для остановки кровотечения, для предохранения раны от вторичного заражения и высушивания.
4. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха используется для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей. Кроме того, его можно использовать при синдроме сдавливания в качестве защитных жгутов, а также при отеке легких – в качестве турникетных жгутов. При повреждении кровеносных сосудов наложить выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, рану забинтовать. Жгут накладывается не более, чем на 1,5 часа.
3. Лейкопластырь применяется для защиты порезов, царапин, ранок и других повреждений кожи от заражения бактериями. Открыть упаковку, вынуть лейкопластырь, отрезать нужный размер. Снять защитный слой, не прикасаясь пальцами к антисептической подложке лейкопластыря. Приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем. Менять по мере необходимости.
4. Ножины травматические предназначены для резки бинта и одежды.
5. Пакет гипотермический охлаждающий – пакет раздавить, положить на место травмы при ушибах, гематомах, при локальных ожогах приложить к стерильной повязке
6. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный предназначен для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи при несчастных случаях, стихийных бедствиях, техногенных авариях и других экстремальных ситуациях, в том числе в военных условиях.
7. перекинь водорода 3%-100мл. применяют как дезинфицирующее средство для промывания ран.
8. перчатки медицинские нестерильные применяются в качестве защитного средства при оказании первой помощи
9. Салфетка стерильная размером не менее 10х10 применяются при повреждении кожных покровов.
10. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100 мг/мл в ампулах 1 мл Аммония раствор 10% (аммиак, нашатырный спирт) – применяют при обмороке, утаре. Кусок ваты или бинта смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5-1 сек
11. Одежда изотермическое 160 см x210 см предназначено для защиты пострадавшего от переохлаждения или перегрева в чрезвычайных ситуациях

