ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

VIZO-1

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Раствор медицинский для офтальмологии: VIZO-1, капли глазные 10 мл.

СОСТАВ:
Действующие вещества:
натрия гиалуронат – 2,0 мг/мл,
цитиколина натриевая соль – 20,0 мг/мл;
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, бензалкония хлорид, натрия дигидрофосфат додекагидрат, натрия фосфат моногидрат, вода для инъекций.

ОПИСАНИЕ:
Прозрачный бесцветный раствор.

VIZO-1 — офтальмологический нейропротектор.
Натрия гиалуронат, входящий в состав VIZO-1, улучшает мукомимические и мукоадгезивные свойства раствора, обеспечивая равномерное, устойчивое увлажнение и защиту слизистой оболочки глаза, сохраняя стабильность слезной пленки. Кроме того, создает благоприятную микросреду для процессов реэпителизации и восстановления глазной поверхности в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы, способствует удержанию действующих веществ на поверхности глаза.
Цитиколин в составе VIZO-1 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных глазных патологий (например, глаукомы).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Для местного применения в офтальмологии
Увлажняющие и защитные свойства VIZO-1 обеспечивают облегчение в случае раздражения, жжения, покраснения и ощущения инородного тела, вызванного экологическими факторами, такими как ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, яркий свет, кондиционер и отопление, а также длительным использованием видеоустройств и контактных линз, при хирургии глаза.
VIZO-1, благодаря структурному действию цитиколина на ганглиозные клетки сетчатки, показан в качестве коадъюванта к антигипертензивной терапии у пациентов с глаукомой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
По 1 капле 2–3 раза в сутки или по назначению врача.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ:
После закапывания глазных капель возможна временная нечеткость зрения. Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкости зрения. В случае любой нежелательной реакции следует прекратить использование VIZO-1 и проконсультироваться с врачом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышенная чувствительность к компонентам VIZO-1.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:
Не выявлены.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Если симптомы не исчезают в течение нескольких дней или возникают какие-либо нежелательные реакции, следует обратиться к врачу.
Не использовать в случае повреждения флакона.
Раствор является стерильным до открытия флакона.
Чтобы предотвратить загрязнение раствора, необходимо плотно закрывать флакон после использования и не прикасаться кончиком дозатора к глазу или другим предметам.
VIZO-1 предназначен только для наружного использования в офтальмологии.
Если VIZO-1 используется с целью лечения, следует обратиться к врачу.
После закапывания необходимо подождать 10–15 мин перед использованием других местных офтальмологических средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- Не использовать в случае индивидуальной гиперчувствительности к некоторым компонентам VIZO-1.
- Не смешивать с другими увлажняющими каплями.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:
До настоящего времени сведений о передозировке не имеется.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ:
2 года.
После вскрытия флакона препарат использовать в течение 1 месяца.
Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:
Без рецепта.

ASEPTICA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «Aseptica»
Республика Узбекистан
г. Ташкент,
Алмазарский район,
ул. Чангалзор-Мавзук, 3
www.aseptica.uz

PROMO SOLUTION

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ООО «ПромоСолюшн»
Республика Беларусь
г. Минск, ул. Могилевская, 39А, офис 210
Тел.: +375 29 158 83 05
e-mail: info@promosolution.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru