RU

ODM 5®

**Гиперосмолярные глазные капли, не содержащие консервантов**

**УПАКОВКА:**

10 мл мультидозовый флакон, без консервантов.

**СОСТАВ:**

Натрия хлорид 5%, Натрия гиалуронат 0.15%.

Вспомогательные ингредиенты: Очищенная вода, тринатрий цитрата дигидрат, лимонной кислоты моногидрат, гидроксипропилметилцеллюлоза.

ODM 5® содержит натрия гиалуронат. Этот компонент в норме присутствует в глазах людей и его смазывающие свойства защищают роговицу глаза.

**В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ODM 5®?**

ODM 5® рекомендуется для уменьшения отечности роговицы глаза: отека вызванного дистрофией роговой оболочки глаза, пост-травматического отека и постоперационного отека. Отек роговой оболочки глаза характеризуется избытком жидкости в роговице. ODM 5®, солевой раствор притягивает избыток жидкости из роговицы посредством осмотического эффекта, позволяя роговице приобрести нормальное состояние гидратации на короткий период времени. Таким образом ODM 5® участвует в улучшении качества зрения.

**КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ODM 5®?**

- Тщательно вымойте руки перед применением глазных капель.
- закапывайте 1-2 капли 4 раза в день, согласно рекомендации врача. Капли следует делать в нижний конъюнктивальный мешок глаза, для этого нужно смотреть вверх и оттянуть слегка нижнее веко вниз.
- После применения капель, закройте глаза на 1-2 минуты.
- Избегайте контакта кончика флакона с глазами или веком.
- не требуется споласкивать после применения.
- ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ.




1. При использовании в первый раз, убедитесь, что защищающее от открывания детьми кольцо не повреждено.

2. Снимите защитный колпачок, потянув вверх.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. Переверните флакон дозатором вниз над глазом. Держите флакон посередине над глазом с зафиксировав между большим и указательным пальцами.

4. Слегка надавите на флакон двумя пальцами, пока на кончике не появится капля нужного объема. Закапайте по 1-2 капли в глаз.

5. После каждого использования снова закрывайте защитным колпачком, убедившись, что на кончике нет остаточных капель; если капли присутствуют, стряхните их.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Не глотать.
- Не использовать, если флакон поврежден (риск контаминации).
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на флаконе.
- Использовать в течение 3 месяцев после открытия флакона (риск контаминации и потеря эффективности продукта).
- Хранить при комнатной температуре (между + 2 и 25°C).
- Аккуратно закройте флакон после каждого использования, убедившись, что на кончике нет остатков капель (риск контаминации).
- Не касайтесь век, глаз или рук кончиком флакона (риск микробной контаминации).
- Не касайтесь и не сушите кончик флакона руками или не стерильной тканью (риск микробной контаминации).
- Если врач назначил Вам дополнительно другие глазные капли, выждите интервал не менее 15 минут между их применением.
- Хранить в месте, недоступном для детей.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

- Повышенная чувствительность к одному из компонентов.
- Ношение контактных линз (ODM5® не совместим с контактными линзами).

**ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ:**

- В некоторых случаях могут возникать временные нарушения, такие как легкое жжение или болезненные ощущения и помутнение зрения в момент применения капель.
- Если наблюдаются устойчивые отрицательные эффекты или не описанные в этой инструкции эффекты, прекратите применять препарат и проконсультируйтесь с врачом.

Изделие медицинского назначения, соответствующее требованиям Директивы 93/42/EEC.

Дата регистрации: октябрь 2013.

Дата последнего изменения текста: декабрь 2015. Патентная заявка на рассмотрении.

Производитель: HORUS Pharma, Франция. EAN: 3401520128170

CE 0459

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru