Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
вул. Ажэшкі, 11, 230023, г. Гродна
тэл. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.пошта: pharmacia@mail.grodno.by
р/р BY81BLBB30120500059690001001 у Дырэкцыі ТАА «Белінвестбанк» па Гродзенскай вобласці, БІК BLBBBY2X
АКПА 02013509, УНП 500059690

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
ул. Ожешко, 11, 230023, г. Гродно
тел. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.почта: pharmacia@mail.grodno.by
р/с BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК BLBBBY2X
ОКПО 02013509, УНП 500059690

09.08.2024 №01-29/ б/н
на № _____ ад _____

Инструкция
по применению вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств АТ-ГР ТУ BY 500059690.001-2008 изм. «5»
(В соответствии с Приложением №3 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 №178)

1. Бинт медицинский стерильный размер 5 м х 10 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

2. Бинт медицинский стерильный размер 7 м х 14 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

3. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха – применяют для временной остановки кровотечения путем сжатия сосудов. Накладывают выше места ранения на одежду или предварительно подложенную ткань, под жгут помещается записка с указанием времени наложения жгута.

4. Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 см х 10 см – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

5. Ножницы атравматические для резки бинта и одежды - разрезать одежду над раной для полного осмотра поврежденной области в целом.

6. Одеяло изотермическое 160 см х 210 см - для сохранения тепла в критических ситуациях и оказания первой помощи[. Обернуть пострадавшего поверх его нательного белья, закрепить лейкопластырем, скотчем.

7. Пакет гипотермический (охлаждающий) – применяется в качестве холодного компресса при травмах (переломы, ушибы, гематомы, тепловые удары).

8. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный - для наложения повязок (давящей, асептической), для тугой тампонады ран, для закрытия выпавших внутренних органов, для фиксации шин.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9. Перекись водорода 3% - 40 мл – применяют в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего средства для промывания ран.

10. Перчатки медицинские нестерильные - средство защиты кожи от биологических жидкостей. Надеть перед проведением осмотра пострадавшего и оказанием ему первой помощи.

11. Салфетка марлевая медицинская стерильная размером не менее 10 см х 10 см – применяются для изолирования раневых поверхностей от воздействия окружающей среды. Наложить салфетку, предварительно смоченную водой для улучшения контакта, на поврежденное место и зафиксировать лейкопластырем или бинтом.

12. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100мг/мл в ампулах 1мл - салфетку или кусочек марли смоченный раствором подносят к носу на 0,5 – 1 секунды при обмороке, предобморочном состоянии. (*вложенное подчеркнуть)*

Генеральный директор В.Г. Боровик

Удот +375336556706

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
вул. Ажэшкі, 11, 230023, г. Гродна
тэл. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.пошта: pharmacia@mail.grodno.by
р/р BY81BLBB30120500059690001001 у Дырэкцыі ТАА «Белінвестбанк» па Гродзенскай вобласці, БІК BLBBBY2X АКПА 02013509, УНП 500059690

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
ул. Ожешко, 11, 230023, г. Гродно
тел. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.почта: pharmacia@mail.grodno.by
р/с BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК BLBBBY2X ОКПО 02013509, УНП 500059690

09.08.2024 №01-29/ б/н
на № _____ ад _____

Инструкция
по применению вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную АУ-ГР с термометром, тонометром.
ТУ BY 500059690.001-2008 изм. «5»
(В соответствии с Приложением №2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 №178)

1. Бинт медицинский стерильный размер 5 м х 10 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

2. Бинт медицинский стерильный размер 7 м х 14 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

3. Глицерил тринитрат таблетки подъязычные 0,5 мг или спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/доза в баллонах 10г. – сосудорасширяющее средство с преимущественным влиянием на венозные сосуды; применяется для купирования приступов стенокардии. Применяют по ½ - 1 таблетке помещают под язык и не проглатывают до полного рассасывания. Спрей распыляют подъязычно, одно распыление составляет 1 дозу (0,4 мг). (*вложенное подчеркнуть)*

4. Дротаверин таблетки 40мг – применяют при спазмах желудка и кишечника, спастических запорах, приступах желчно- и мочекаменной болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (лучше в сочетании с холинолитиками), иногда при спазмах периферических сосудов (эндартериит и др.). Принимают внутрь по 0,04 – 0,08 г (1 – 2 таблетки) 2 – 3 раза в день.

5. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха – применяют для временной остановки кровотечения путем сжатия сосудов. Накладывают выше места ранения на одежду или предварительно подложенную ткань, под жгут помещается записка с указанием времени наложения жгута.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Каптоприл таблетки 25 мг — применяется для снижения артериальное давления, по 1 таблетке внутрь до еды. Если каптоприл принимается под язык, то его абсорбция происходит быстрее, чем при приеме внутрь.

7. Кеторолак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг - обладает выраженным обезболивающим, а также жаропонижающим и противовоспалительным действием. Применяется при болевом синдроме умеренной и сильной выраженности: послеоперационные боли, боли в суставах при травмах с разрывом связок, вывихи, растяжения; боли в спине и мышцах. Принимают внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч.

8. Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 см х 10 см – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

9. Лоратадин таблетки 10мг или Дезлоратадин таблетки 5 мг – применяется как антигистаминное, противоаллергическое, антиэкссудативное, противозудное средство при аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите, зудящих дерматозах, бронхиальной астме, аллергических реакциях на укусы насекомых. Принимают внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки до еды. (*вложенное подчеркнуть)*

10. Маска медицинская нестерильная одноразовая — это средство профилактики распространения инфекции, передающейся воздушно-капельным путём. Продолжительность ношения маски составляет не более 2 часов, а при невозможности замены не более 4-х часов.

11. Ножницы атравматические для резки бинта и одежды - разрезать одежду над раной для полного осмотра поврежденной области в целом.

12. Пакет гипотермический (охлаждающий) – применяется в качестве холодного компресса при травмах (переломы, ушибы, гематомы, тепловые удары).

13. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный - для наложения повязок (давящей, асептической), для тугой тампонады ран, для закрытия выпавших внутренних органов, для фиксации шин.

14. Парацетамол таблетки 500 мг – применяют в качестве болеутоляющего средства при головной боли, невралгиях, миалгиях, в качестве жаропонижающего средства по 1 – 2 таблетки 2 – 3 раза в день.

15. Перекись водорода 3% - 100 мл – применяют в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего средства для промывания ран.

16. Перчатки медицинские нестерильные - средство защиты кожи от биологических жидкостей. Надеть перед проведением осмотра пострадавшего и оказанием ему первой помощи.

17. Салфетка антисептическая с этанолом - антисептическое средство для наружного применения.

18. Салфетка стерильная размером не менее 10 см х 10 см – применяются для изолирования раневых поверхностей от воздействия окружающей среды. Наложить салфетку, предварительно смоченную водой

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

для улучшения контакта, на поврежденное место и зафиксировать лейкопластырем или бинтом.

19. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100мг/мл в ампулах 1мл - салфетку или кусочек марли смоченный раствором подносят к носу на 0,5 – 1 секунды при обмороке (предобморочном состоянии). (*вложенное подчеркнуть)*

20. Термометр медицинский электронный – используют для измерения температуры тела.

21. Тонометр - прибор предназначен для применения в качестве индивидуального средства контроля артериального давления и частоты пульса.

22. Уголь активированный таблетки 250 мг – применяют внутрь как адсорбирующее средство при пищевых интоксикациях, метеоризме, отравлениях солями тяжелых металлов, алкалоидами, гликозидами, лекарственными средствами и др. Принимают внутрь по 1-2-3 таблетке 3-4 раза в сутки. Для ускорения действия рекомендуется таблетки измельчить.

23. Фенотерол раствор для ингаляций 1мг/мл во флаконах 20мл /Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 100мкг/доза в ингаляторе 200доз (400 доз) - профилактика и купирование бронхообструктивного синдрома: при бронхиальной астме, хроническом бронхите, бронхолегочных заболеваниях по 1-2 ингаляций, но не более 8 ингаляций в сутки. (*вложенное подчеркнуть)*

Генеральный директор В.Г. Боровик

Удот +375336556706,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
вул. Ажэшкі, 11, 230023, г. Гродна
тэл. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.пошта: pharmacia@mail.grodno.by
р/р BY81BLBB30120500059690001001 у Дырэкцыі ТАА
«Белінвестбанк» па Гродзенскай вобласці, БІК BLBBBY2X
АКПА 02013509, УНП 500059690

09.08.2024 №01-29/ б/н
на №_____ ад _____

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
ул. Ожешко, 11, 230023, г. Гродно
тел. (0152) 74 43 92, факс 62 61 19
эл.почта: pharmacia@mail.grodno.by
р/с BY81BLBB30120500059690001001 в Дирекции ОАО
«Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК BLBBBY2X
ОКПО 02013509, УНП 500059690

Инструкция
по применению вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную АУ-ГР
ТУ BY 500059690.001-2008 изм. «5»
(В соответствии с Приложением №2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.11.2023 №178)

1. Бинт медицинский стерильный размер 5 м х 10 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

2. Бинт медицинский стерильный размер 7 м х 14 см - Перевязочное средство применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

3. Глицерил тринитрат таблетки подъязычные 0,5 мг или спрей подъязычный дозированный 0,4 мг/доза в баллонах 10г. – сосудорасширяющее средство с преимущественным влиянием на венозные сосуды; применяется для купирования приступов стенокардии. Применяют по ½ - 1 таблетке помещают под язык и не проглатывают до полного рассасывания. Спрей распыляют подъязычно, одно распыление составляет 1 дозу (0,4 мг). (*вложенное подчеркнуть)*

4. Дротаверин таблетки 40мг – применяют при спазмах желудка и кишечника, спастических запорах, приступах желчно- и мочекаменной болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (лучше в сочетании с холинолитиками), иногда при спазмах периферических сосудов (эндартериит и др.). Принимают внутрь по 0,04 – 0,08 г (1 – 2 таблетки) 2 – 3 раза в день.

5. Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха – применяют для временной остановки кровотечения путем сжатия сосудов. Накладывают выше места ранения на одежду или предварительно подложенную ткань, под жгут помещается записка с указанием времени наложения жгута.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Каптоприл таблетки 25 мг — применяется для снижения артериальное давления, по 1 таблетке внутрь до еды. Если каптоприл принимается под язык, то его абсорбция происходит быстрее, чем при приеме внутрь.

7. Кеторолак таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг - обладает выраженным обезболивающим, а также жаропонижающим и противовоспалительным действием. Применяется при болевом синдроме умеренной и сильной выраженности: послеоперационные боли, боли в суставах при травмах с разрывом связок, вывихи, растяжения; боли в спине и мышцах. Принимают внутрь - по 10 мг каждые 4-6 ч.

8. Лейкопластырь бактерицидный размер не менее 4 см х 10 см – применяют для лечения ссадин, порезов, небольших ран после ожогов. Снять защитную пленку, на рану положить марлевый тампон и приклеить.

9. Лоратадин таблетки 10мг или Дезлоратадин таблетки 5 мг – применяется как антигистаминное, противоаллергическое, антиэкссудативное, противозудное средство при аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите, зудящих дерматозах, бронхиальной астме, аллергических реакциях на укусы насекомых. Принимают внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки до еды. (*вложенное подчеркнуть)*

10. Маска медицинская нестерильная одноразовая — это средство профилактики распространения инфекции, передающейся воздушно-капельным путём. Продолжительность ношения маски составляет не более 2 часов, а при невозможности замены не более 4-х часов.

11. Ножницы атравматические для резки бинта и одежды - разрезать одежду над раной для полного осмотра поврежденной области в целом.

12. Пакет гипотермический (охлаждающий) – применяется в качестве холодного компресса при травмах (переломы, ушибы, гематомы, тепловые удары).

13. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный - для наложения повязок (давящей, асептической), для тугой тампонады ран, для закрытия выпавших внутренних органов, для фиксации шин.

14. Парацетамол таблетки 500 мг – применяют в качестве болеутоляющего средства при головной боли, невралгиях, миалгиях, в качестве жаропонижающего средства по 1 – 2 таблетки 2 – 3 раза в день.

15. Перекись водорода 3% - 100 мл – применяют в качестве дезинфицирующего и дезодорирующего средства для промывания ран.

16. Перчатки медицинские нестерильные - средство защиты кожи от биологических жидкостей. Надеть перед проведением осмотра пострадавшего и оказанием ему первой помощи.

17. Салфетка антисептическая с этанолом - антисептическое средство для наружного применения.

18. Салфетка стерильная размером не менее 10 см х 10 см – применяются для изолирования раневых поверхностей от воздействия окружающей среды. Наложить салфетку, предварительно смоченную водой

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

для улучшения контакта, на поврежденное место и зафиксировать лейкопластырем или бинтом.

19. Салфетка медицинская для стимуляции дыхания (с пропиткой) или аммиак раствор для наружного применения 100мг/мл в ампулах 1мл - салфетку или кусочек марли смоченный раствором подносят к носу на 0,5 – 1 секунды при обмороке (предобморочном состоянии). (*вложенное подчеркнуть)*

20. Уголь активированный таблетки 250 мг – применяют внутрь как адсорбирующее средство при пищевых интоксикациях, метеоризме, отравлениях солями тяжелых металлов, алкалоидами, гликозидами, лекарственными средствами и др. Принимают внутрь по 1-2-3 таблетке 3-4 раза в сутки. Для ускорения действия рекомендуется таблетки измельчить.

21. Фенотерол раствор для ингаляций 1мг/мл во флаконах 20мл /Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 100мкг/доза в ингаляторе 200доз (400 доз) - профилактика и купирование бронхообструктивного синдрома: при бронхиальной астме, хроническом бронхите, бронхолегочных заболеваниях по 1-2 ингаляций, но не более 8 ингаляций в сутки. (*вложенное подчеркнуть)*

Генеральный директор В.Г. Боровик

Удот +375336556706

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru