

Инструкция (октябрь 2020 г, Версия 1.1) - Русский
Эксплуатационная документация на изделие
«Винт костный»

производства «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.)

Уведомление для пользователя винта костного

Данное уведомление относится к тому, как пользоваться костным винтом Osstem, изготовленным компанией OSSTEM Implant Co., Ltd., и к мерам предосторожности при его использовании. Мы исходим из того, что мы не принимаем на себя ответственности за проблему, возникшую в результате игнорирования уведомления, и персонал, осуществляющий хирургическое лечение, должен пользоваться данным изделием после обучения хирургическому лечению, требуемого для замены костного винта.

Производитель: «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae -gu, Busan, Korea

Место производства: Osstem Implant Co., Ltd., 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea

1. Назначение / Показания

Изделие предназначено для реконструирования или повторного соединения альвеолярной кости при хирургической операции.

Область применения медицинского изделия: Стоматология

Только для профессионального использования квалифицированными стоматологами, хирургами. Строго для специализированных и обученных пользователей.

2. Описание

Данный винт костный Bone Screw функционирует как крепежный материал для фиксации костной пластины, мембраны, которая охватывает костный материал или костный блок, при проведении хирургической операции по пересадке кости. Винт диаметром 1,2 предназначен для фиксации нерассасывающейся мембраны или OB2 и OB3. И винт диаметром 1,4 предназначен для фиксации мембраны или костной пластины. Винт диаметром

2,0 предназначен для фиксации костного блока. Винт костный Bone Task – это стабилизатор, который может устойчиво зафиксировать мембрану, стимулятор регенерации надкостницы зуба при направленной костной регенерации.

3. Использование методов и процедур

- 1) Факторы, которые необходимо учитывать перед имплантацией.
 - Выбирайте желательное местоположение для имплантации с учетом анатомических условий челюсти пациента.
 - Стерилизуйте участок имплантации и применяйте местную анестезию.
 - Костный винт можно имплантировать напрямую без дополнительного лечения, поскольку он упакован со стерилизацией. Костный винт предназначен только для однократного использования.

2) Процедуры имплантации.

Винт костный Bone Screw

- Выбирайте достаточные костные винты с учетом анатомических условий челюсти.
- Если толщина кортикальной кости составляет свыше 2 mm или качество кости очень плохое, то на окружающем имплантат участке рекомендуется выполнить первоначальное сверление для достижения кортикального слоя. Для сведения к минимуму выработки тепла во время выполнения операции сверления рекомендуется подача достаточного объема соляного раствора. При фиксации костного блока продельвайте отверстие доступа в костном блоке при помощи сверла перед вставкой костного винта. Рекомендуемая скорость сверления составляет 800 грм(об/мин). (OB2 и OB3 не применяйте предварительное сверление)
- Выберите отвертку и вставьте ее в крестовину винта в стерилизованной упаковке.
- Начинайте имплантацию костного винта для фиксации мембраны, костной пластины или костного блока.
- Поворачивайте костный винт по часовой стрелке до тех пор, пока костная пластина или костный блок не будут надежно закреплены.
- Во избежание поломки костного винта, скорость имплантации костного винта должна быть очень медленной около 20 грм(об/мин), и сохраняйте путь прямым в направлении первой вставки.
- При возникновении неполадки костного винта

(перелома, сгибания и т. д.) выньте винт прямо и выполните операцию повторно.

Винт костный Bone Task

- При креплении

1. Наденьте держатель на верхнюю головку винта костного Bone Task.
2. Переместите винт костный Bone Task в то место, где нужно его зафиксировать, поставьте его вертикально на барьерной мембране, а затем нанесите удар молоточком по верхней части держателя.
3. Когда винт костный Bone Task зафиксирован, медленно снимите с винтом костным Bone Task держатель, мягко покачивая его влево и вправо.
4. После закрепления наложите шов на мягкую ткань, а затем следуйте обычной процедуре имплантации.

3) Лечение после имплантации.

- После имплантации костного винта зашейте рану, выполнив общую процедуру.
- Проверьте результат операции методом рентгеноскопии или компьютерной томографии, зарегистрируйте положение и количество костных винтов на графике.
- После завершения повторного моделирования кости или повторного соединения кости костные винты должны быть извлечены.
- При извлечении винтов костных Bone Screw требуется использовать крестовую отвертку. Вставьте крестовую отвертку в паз на головке винта и медленно поворачивайте ее против часовой стрелки.
- Для удаления винта костного Bone Task после надреза мягкой ткани плотно наденьте шестигранный вороток на Bone Task и поворачивайте его против часовой стрелки. Заведите под головку Bone Task съёмник и медленно наклоните его в направлении извлечения. * Принцип рычага.
- Медленно поднимите винт Bone Task так, чтобы он не входил в полость рта.
- Повторное использование использованной винта никогда не разрешается, поскольку есть вероятность снижения его эффективности и занесения инфекции.

4. Примечание

- Пожалуйста, полностью выясните, как пользоваться данным изделием перед проведением хирургического

лечения.

- Данное изделие предназначено только для однократного применения. Не используйте повторно.
- После завершения повторного моделирования кости или повторного соединения кости костные винты должны быть извлечены.
- Все инструменты для хирургического лечения следует автоклавировать перед хирургическим лечением для обеспечения чистоты.
- В случае твердой кости рекомендуется применение первоначального сверления, поскольку ненормально высокий крутящий момент имплантации (35 Ncm (Нсм) и выше) может привести к поломке винта в результате нажатия на альвеолярную кость.
- Пожалуйста, имейте в виду, что хирургическое лечение может оказаться неудачным в случае неподходящего хирургического лечения, плана лечения и исследования перед хирургическим лечением и/или состояния пациента, вне зависимости от состояния винта.
- Операции по имплантированию требуют высокой точности и особого внимания, и мы должны стараться минимизировать опасность для клеточной ткани, и очень внимательно следить за температурой, операционными травмами и/или устранением источников загрязнения и инфицирования.
- Винт костный Bone Task должен использоваться только профессиональным медицинским персоналом, и его не следует применять не по назначению. Если Винт костный Bone Task не получил достаточного усилия фиксации в мягкой кости, он может выскочить во время крепления к держателю.
- Если такое случилось, поместите массу в гнездо наконечника держателя и медленно отделяйте его в ходе крепления Винта костного Bone Task.
- Когда имеется очевидный дефект, либо если устройство упало на пол или подверглось сильному удару, необходимо тщательно осмотреть его. Если имеется повреждение, следует заменить его на новое.
- Предупреждения для пациентов. Поддерживайте полную чистоту в полости рта. Не прилагается чрезмерных нагрузок к зубам, пока не будут установлены последние протезы.

- Внимание!

- Выбор неприемлемых пациентов и хирургических методов может привести к неприживлению имплантата либо к утрате кости, поддерживающей имплантат.
- Имплантаты Osstem не должны использоваться в иных целях помимо рекомендованного применения, и их нельзя переделывать. При несоблюдении этих требований в хирургических операциях может начаться качание имплантата, разрушение кости и хроническая инфекция.
- Данный продукт может использоваться лишь однократно. Не применяйте его повторно.

5. Обращение и стерилизация

- Изделие стерильное (стерилизовано гамма радиацией), одноразовое
- Мы гарантируем стерилизованное состояние только при невскрытой и неповрежденной упаковке. Используйте только после автоклавирования, когда есть вероятности загрязнения перед проведением хирургического лечения.

6. Побочный эффект

После операции могут возникнуть некоторые проблемы (местный фурункул, отрыв, временная боль, отек, гематома и кровоизлияние). Причинами подобных проблем могут быть: несоответствующее качество и объем остаточной костной ткани, аллергическая реакция, неполноценная гигиена ротовой полости или несоблюдение пациентом установленных требований, подвижность имплантата, частичное ухудшение состояния тканей или некорректное позиционирование имплантата.

7. Противопоказания

- 1) Пациент с нарушением свертывания крови или проблемой при лечении кости или травм
- 2) Пациент с неконтролируемым диабетом
- 3) Пациент с недостаточной иммунной функцией в результате химиотерапии и радиационной терапии
- 4) Пациент с инфекцией или воспалением в ротовой полости
- 5) Пациент с неподдающимися лечению неправильной окклюзией/заболеваниями суставов и пациент с недостаточным межчелюстным расстоянием
- 6) Пациент, который не подходит для хирургической операции

8. Условия транспортирования, условия хранения; условия применения/эксплуатации
Условия эксплуатации
Температура: 1~42°C Влажность: 0~100%
Пригодны для эксплуатации внутри тела человека.

Условия хранения.
Температура: 1~30 °C
Влажность: 0~90%

Условия транспортировки
Температура: -50~50°C
Влажность: 0~90%

9. Утилизация
В случае обнаружения дефектов упаковки перед применением изделия необходимо утилизировать изделия вместе с упаковкой вместе с бытовыми отходами.
После применения изделия, его необходимо утилизировать должным образом. При выборе способа утилизации, необходимо учитывать возможность отнесения изделия к эпидемиологически опасным отходам и необходимость применения соответствующих особых мер.
Класс опасности отходов в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 – класс Б.

10. Срок службы и гарантийный срок
Срок службы – 8 лет
Гарантийный срок – 1 год

Информация
- Название продукта, дата изготовления, партия продукта, и т.п. указывается на ярлыке упаковки.

* Дополнительную информацию см. в каталоге и руководстве по эксплуатации, предоставляемых торговым представителем. Общие сведения об имплантатах см. в каталоге и руководствах по протезированию.

Расшифровка символов	
Символ	Расшифровка
	Логотип производителя
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до...
	Код партии
	Номер по каталогу
	Радиационная стерилизация
	Не использовать повторно
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Знак соответствия

[illegible]

Расшифровка символов	
Символ	Расшифровка
	Радиационная стерилизация
	Запрет на открытое пламя
	Осторожно! Обращаться с инструментами осторожно
	Номер по каталогу
	Код партии
	Использовать до...
	Дата изготовления
	Не стерилизовать повторно
	Исоломитель
	Не допускать воздействия солнечного света
	Бережно от влаги

ОКСИТУТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на медицинское изделие (Апр., 2020 г. Версия 1.0)

Наименование медицинского изделия	
Имплант SS	
Наименование и адрес производителя	Osstem Implant Co., Ltd. (Osstem Implant Co., Ltd.) 66-16, Balseong-ro 513beon-gil, Namdeae-gu, Busan, Korea
Наименование и адрес разработчика	Osstem Implant Co., Ltd. (Osstem Implant Co., Ltd.) 66-16, Balseong-ro 513beon-gil, Namdeae-gu, Busan, Korea
Производственный филиал	Osstem Implant Co., Ltd. Namdae plant, 66-16, Balseong-ro 513beon-gil, Namdeae-gu, Busan, Korea

Уполномоченный представитель в России (адрес для обращения потребителей на территории РФ)
ООО «ОСТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Ашпротова, д.18, кор.7, эт.8, оф.1
Тел : +7-495-739-99-25
Эл. почта : info@osstem.ru

Область применения медицинского изделия
- Стоматология
- Только для профессионального использования квалифицированным персоналом

Назначение
Применяется в хирургической имплантологии. Аблатмент устанавливается в верхне- или нижнечелюстной альвеолярный отросток и предназначен для обеспечения постоянного промежуточного уровня между детальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией.

Описание имплантата Osstem
Osstem Implant — это бренд материалов стоматологических имплантатов. Аблатменты для имплантатов изготавливаются из титана, сплавов золота, полимеров, нержавеющей стали, сплавов кобальта и хрома и керамических материалов. Материалы для изготовления протезов и стоматологические лабораторные материалы включают полимеры, титан и нержавеющей сталь. Аблатменты для имплантатов Osstem и ортопедических компонентов совместимы только с имплантатами OSSTEM. Использование данного изделия совместно с изделиями других производителей может привести к возникновению различных проблем, включая ослабление соединения и перелом из-за неполной фиксации и недостаточной совместимости. Подробную информацию можно найти в руководстве компании Osstem, каталоге продукции или на нашем веб-сайте (www.osstem.com). Код, продукта, спецификация, дата изготовления и дата истечения срока годности приводятся на этикетке изделия.

Показания к применению
Аблатменты SS были разработаны для нужд хирургической имплантологии; в ходе проведения операции система устанавливается в верхне- или нижнечелюстной альвеолярный отросток для замены

корня зуба.
Устанавливаемый аблатмент заменяет утраченный зуб, соединяя штифт аблатмента с альвеолярным отростком после завершения остеointegrации. Система имплантатов Osstem, в том числе аблатмент, показана для использования при частичной или полной нижнечелюстной и верхнечелюстной адентии в качестве опоры для одиночных или многозубных реставрационных конструкций, включая протезы с цементной или винтовой фиксации, съемные протезы, а также в качестве окончательной или временной опоры для аблатмента под несъемный мостовидный протез. Она предназначена для отсроченной нагрузки. Она предназначена для использования со зубным имплантатом в качестве опоры для реставрационных конструкций, например, коронок, мостовидных или съемных зубных протезов.

- Противопоказания**
- пациент с гемофилией или пациент испытывающие затруднения касательно заживления костей и раны
 - пациент с неконтролируемым диабетом, тяжелой никотиновой или алкоголизмом
 - пациент, иммунная система которого неактивна из-за проведения химической терапии и радиационной терапии
 - пациент с инфекцией или воспалением в ротовой полости (независающая гитена полости рта, бруксизм)
 - пациент с неизлечимой окклюзией/абразиванием суставов, недостаточным пространством зубной дуги

Предупреждение
Неправильная выборка пациентом и хирургических методик может привести к отказу имплантата или потере объема костной ткани, поддерживающей имплантат. Имплантаты Osstem не подлежат ремондированию и использованию в целях, отличных от указанных производителем. Подвижность имплантата, потеря объема костной ткани и хронические инфекции могут стать причиной неудачной остеointegrации имплантата.

Возможные побочные действия
Могут возникнуть некоторые проблемы после операции (утрата устойчивости имплантата, повреждение протеза). Причинами подобных проблем могут быть: несоответствующее качество и объем остатков костной ткани, аллергическая реакция, исполнение гигиены ротовой полости или несоблюдение пациентом установленных требований, подвижность имплантата, частичное ухудшение состояния тканей или неконтрольное позиционирование имплантата.

Меры предосторожности
Хирургическая методика имплантации представляет собой сложную, требующую наличия специальных навыков процедуру. К проведению операции по имплантации допускаются только соответствующие лица, получившие профильное образование. Изучите анатомию оперируемого участка и соответствие доступного объема костной ткани цели имплантации. Подготовьте

имплантат, соблюдая предусмотренные меры предосторожности. Для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, пародонтального статуса и диаметров объема костной ткани выполняется визуальный осмотр и проводится панорамное и периапикальное рентгенографическое исследование.

Происудные меры предосторожности (хирургия)
При выполнении операции по имплантации требуется высокая точность и осторожность; необходимо минимизировать повреждение клеточных тканей, а также не допускать превышения температуры, нанесения значительных хирургических травм и/или наличия источника загрязнения и заражения.

Происудные меры предосторожности (протезирование)
Все хирургические инструменты должны находиться в надлежащем состоянии. Поскольку имплантаты, аблатменты, протезы и инструменты имеют небольшие размеры, следует проявлять осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути и удушья пациента. Системная информация (TS, SS, US) и информация о совместимости (Mini, Regular, Wide) аблатмента и имплантата должна быть подтверждена до использования во избежание ослабления соединения или перелома в результате неправильной фиксации. После фиксации аблатмента на имплантате необходимо выполнить проверку на соответствие соединения требованиям методом рентгенографического исследования. Винт следует затянуть, используя значение момента, указанное на упаковке Тайвек. Для предотвращения ослабления соединения винт рекомендуется подтянуть 2-3 раза. Чрезмерный момент затяжки может привести к разрыву винта. Условий аблатмент может сломаться ввиду ограниченной жесткости имплантата. Поэтому его не рекомендуется использовать в задней области ротовой полости. При изготовлении протеза важно добиться правильного распределения нагрузки. В случае мостовидного зубного протеза необходимо подтвердить совместимость протеза и аблатмента и выполнить корректировку прикуса. Чрезмерный выступ протеза может привести к перелому системы имплантатов. Изготовление протеза с использованием керамического аблатмента требует наличия специальных навыков, и зубной техник должен пройти соответствующий курс обучения.

Меры предосторожности для пациентов
Выполняйте тщательную очистку ротовой полости. Не повреждайте зубы избыточной нагрузке до момента установки окончательного протеза.

Сведения о стерильности и кратности применения
- Аблатменты SS предоставляются в стерильном состоянии. Тем не менее, перед использованием стерильные изделия должны быть стерилизованы в автоклаве при температуре 132°C в течение 15 минут. После стерилизации паром и перед использованием аблатмента следует просушить в течение 15 минут.

Расшифровка символов на маркировке	
Обозначение	Обозначение
	Производитель
	Дата производства
	Использовать до
	Код серии
	Каталожный номер
	Внимание, обращайтесь к сопроводительным документам
	Одноразовый
	Метка Сертификата качества
На транспортной упаковке	
	«Обращаться с осторожностью. Предостережение!»
	Хранить вдали от прямых солнечных лучей.
	Хранить в сухом месте.

Срок годности	
Аблатменты SS предоставляются в стерильном состоянии. Срок службы – не ограничен. Гарантия – 1 год.	
Условия транспортирования, хранения, условия применения	
Температура	Влажность
1-42°C	0-100%
-50-50°C	0-80%
1-30°C	0-90%
В сухом месте при комнатной температуре	
Требования к охране окружающей среды, сведения по утилизации или утилизации	
В соответствии с 2.1.7.2790-10 СанПиН «Санитарные требования к работе с медицинскими отходами», предлагаемые в них изделия соответствуют классу Б.	

Расшифровка символов	
Обозначение	Описание
	Производитель
	Дата производства
	Использовать до
	Номер серии
	Номер по каталогу
	Внимание, обращайтесь к сопроводительным документам
	Не использовать повторно.
	Метка Сертификата качества

Обращение и стерилизация	Компоненты абатмента SS предоставляются в стерильном состоянии. Тем не менее, перед использованием стерильные изделия должны быть стерилизованы в автоклаве при температуре 132°С в течение 15 минут (в соответствии с требованиями ISO 17665). После стерилизации паром и перед использованием компоненты следует просушить в течение 15 минут.
Условия транспортирования, условия хранения; условия применения/эксплуатации	Условия хранения Температура: 1–42°С Влажность: 0–100% Приток для эксплуатации внутри тела человека.
Условия эксплуатации	Условия хранения Температура: 1–30 °С Влажность: 0–90%
Условия транспортировки	Условия хранения Температура: -50–50°С Влажность: 0–80%
Утилизация	После применения изделия, его необходимо утилизировать должным образом. При выборе способа утилизации, необходимо учитывать возможность отнесения изделия к эпидемиологически опасным отходам и необходимости применения соответствующих особых мер. В соответствии с 2.1.7.2790-10 СанПин «Санитарные требования к работе с медицинскими отходами», предлагаемые в них изделия соответствуют классу Б.
Срок службы и гарантийный срок	Компоненты абатмента SS предоставляются в стерильном состоянии. Поэтому, у них нет срока годности при хранении. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. Гарантийный срок хранения – не ограничен (при сохранении целостности упаковки и соблюдении условий транспортировки и хранения)

панорамное и периапикальное рентгенографическое исследование. Также могут быть целесообразны лабораторные периапикальные рентгенограммы, снимки компьютерной томографии и томограммы. В частности, можно собрать точное крепление имплантата, чтобы подготовить абатмент и ортопедические компоненты.	- Проксимальные меры предосторожности (хирургии) При выполнении операции по имплантации требуется высокая точность и осторожность, необходимо минимизировать повреждение клеточных тканей, а также не допускать превышения температуры, нанесения значительных хирургических травм и/или наличия источника заражения и заражения.
Противопоказания (при применении совместно с имплантатами/абатментами) Имплантация противопоказана, в частности, следующим лицам: • пациентом, страдающим от гемофилии или проблем, связанных со сложностью контроля травм предплечий или мягких тканей; • пациентам с неконтролируемым диабетом, тяжелой никотиновой или алкогольной зависимостью; • пациентам с ослабленной после химиотерапии или лучевой терапии иммунной системой; • пациентам с внутритривовой инфекцией или воспалением (незакладывая типичную полость рта, бруксизм); • пациентам с неустранимой окклюзией нарушенным функциям суставов, недостаточной длиной зубной дуги; • пациентам с недостаточной высотой или шириной кости	- Проксимальные меры предосторожности (протезирование) Все хирургические инструменты должны быть в надлежащем состоянии. Поскольку имплантаты, протезы и инструменты имеют небольшие размеры, следует проявлять осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути и ухудшения пациента. Системная информация (TS, SS, US) и информация о совместимости (Mini, Regular, Wide) абатмента и имплантата должна быть подтверждена до использования во избежание ослабления соединения или перелома в результате неправильной фиксации. После фиксации абатмента на имплантате необходимо выполнить проверку на соответствие соединения требованиям методом рентгенографического исследования. Винт следует затянуть, используя значение момента, указанное на упаковке Tyvek. Для предотвращения ослабления соединения винт рекомендуется подтянуть 2–3 раза. Чрезмерный момент затяжки может привести к разрыву винта. Угловой абатмент может сломаться ввиду ограниченной жесткости имплантата. Поэтому его не рекомендуется использовать в задней области ротовой полости. При изготовлении протеза важно добиться правильного распределения нагрузки. В случае мостовидного зубного протеза необходимо подтвердить совместимость протеза и абатмента и выполнить коррекцию прикуса. Чрезмерный выступ протеза может привести к перелому системы имплантатов. Изготовление протеза с использованием керамического абатмента требует наличия специальных навыков, и зубной техник должен пройти соответствующий курс обучения.
Побочные эффекты (при применении совместно с имплантатами/абатментами) После проведения операции может возникнуть ряд проблем (потеря стабильности имплантата, повреждение протеза). Причинами подобных проблем могут быть: несоответствующее качество и объем остаточной костной ткани, аллергическая реакция, неполноценная типичная ротовой полости или несоблюдение пациентом установленных требований, подвижность имплантата, частичное ухудшение состояния тканей или некорректное позиционирование имплантата.	- Меры предосторожности для Пациентов Выполняйте тщательную очистку ротовой полости. Не подвигайте зубы избыточной нагрузке до момента установки окончательного протеза.
Преуведомления и меры предосторожности (при применении совместно с имплантатами/абатментами) Хирургическая методика имплантации представляет собой сложную, требующую наличия специальных навыков, процедуру. К проведению операции по имплантации допускаются только соответствующие лица, получившие формальное образование.	- Меры предосторожности для Пациентов Выполняйте тщательную очистку ротовой полости. Не подвигайте зубы избыточной нагрузке до момента установки окончательного протеза.
Общие меры предосторожности Хирургическая методика имплантации представляет собой сложную, требующую наличия специальных навыков, процедуру. К проведению операции по имплантации допускаются только соответствующие лица, получившие формальное образование.	- Предуведомление Неправильная выборка пациентом и хирургических методик может привести к отказу имплантата или потере объема костной ткани, поддерживающей имплантат. Имплантаты Osstem (в том числе и компоненты абатментов SS) не подлежат ремоделированию и используются в целях, отличных от указанных производителем. Подкладка имплантата, потеря объема костной ткани и хронические инфекции могут стать причиной неудачной остеointegrации имплантата.

Эксплуатационная документация на медицинское изделие (Апр., 2020 г. Версия 1.0)	Osstem, включая компоненты абатмента SS, показана для использования при частичной или полной нижнечелюстной и верхнечелюстной адентии в качестве опоры для одиночных или мостовидных реставрационных конструкций, включая протезы с цементной или винтовой фиксацией, съемные протезы, а также в качестве окончательной или временной опоры для абатмента под несъемный мостовидный протез. Она предназначена для отсроченной нагрузки. Она предназначена для использования по абатменту имплантам в качестве опоры для реставрационных конструкций, например, коронок, мостовидных или съемных зубных протезов.
Имя производителя	Osstem Implant Co., Ltd. (Osstem Implant Co., Ltd.) 66-16, Bongsong-ro 513beon-gil, Haengdae-gu, Busan, Korea
Адрес производителя	Osstem Implant Co., Ltd. (Osstem Implant Co., Ltd.) 66-16, Bongsong-ro 513beon-gil, Haengdae-gu, Busan, Korea
Уполномоченный представитель в России	ООО «OSSTEM» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д.18, кор.7, эт.8, оф.1 Тел : +7-495-739-99-25 Эл. почта : info@osstem.ru
Назначение	Компоненты абатментов SS предназначены для использования при частичном отсутствии зубов или при полной адентии нижней и верхней челюсти, в качестве опоры для одиночных или мостовидных реставрационных конструкций, включая протезы с цементной или винтовой фиксацией, съемные протезы, а также в качестве окончательной или временной опоры для абатмента под несъемный мостовидный протез.
Область применения медицинского изделия	- Стоматология - Только для профессионального использования квалифицированным персоналом
Описание	Osstem Implant — это бренд материалов стоматологических имплантатов. Материалы изготовления протезов и стоматологические лабораторные материалы включают полимеры, титан и нержавеющей сталь. Абатменты для имплантатов Osstem и компонентов совместимы только с имплантатами OSSTEM. Использование данного изделия совместно с изделиями других производителей может привести к возникновению различных проблем, включая ослабление соединения и перелом из-за неполной фиксации и недостаточной совместимости. Подробную информацию можно найти в руководстве Osstem, каталоге или на нашем веб-сайте (www.osstem.com). Код продукта, спецификация, дата изготовления и истечения срока годности приводятся на этикетке изделия.
Пояснения	Компоненты вместе с абатментами SS были разработаны для нужд хирургической имплантологии; в ходе проведения операции они устанавливаются в верхние- или нижнечелюстной альвеолярный отросток для замены корня зуба. Установленный имплантат заменяет утраченный зуб, соединяя штифт абатмента с альвеолярным отростком после завершения остеointegrации. Система имплантатов

Эксплуатационная документация на изделие <div>(Авг. 2024 г. Версия 1.1)</div>	
Название медицинского изделия	
Имплантаты стоматологические SS SA	
Информация о производителе медицинского устройства	
- Название	
Osstem Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.)	
- Адрес разработчика и производителя	
Osstem Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.)	
66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea	
- Адрес производственных площадок	
Osstem Implant Co., Ltd., Haeundae plant,	
66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea	
- Авторизованный представитель производителя	
ООО «ОСТЕМ» 115432 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, д. 18, кор. 7, помещение 1Е/13.	
Показания	
Изделие представляет собой искусственный зубной корень, который предназначен для использования при имплантационном лечении зубов с целью восстановления утраченных зубов.	
Показания, противопоказания и нежелательные явления	
- Показания	
Имплантаты стоматологические SS SA представляют собой искусственный зубной корень, который спроектирован для использования при имплантационном лечении зубов с целью восстановления утраченных зубов. Медицинское изделие имплантируется посредством хирургического метода в верхнечелюстную или нижнечелюстную кость для замены натурального зубного корня. Имплантаты стоматологические SS SA показаны для использования в частично или полностью беззубых нижней и верхней челюстях при поддержке одиночной или многоединичной реставрации, в том числе, реставрации с креплением на цементе, с креплением на винтах или условно-съемные протезы, а также при окончательной или временной поддержке абатмента для несъемного мостовидного протеза. Она предназначена для отсроченной загрузки. Изделия диаметром 3,25 мм или менее должны использоваться исключительно для нижнечелюстных передних зубов с целью предотвращения перелома в связи с избыточной окклюзионной нагрузкой. Имплантаты стоматологические SS SA показаны для использования в частично или полностью беззубых нижней и верхней челюстях при поддержке одиночной или многоединичной реставрации, в том числе, реставрации с креплением на цементе, с креплением на винтах или условно-съемные протезов, а также при окончательной или временной поддержке абатмента для несъемного мостовидного протеза.	
- Противопоказания	
К противопоказаниям относится следующее:	
• Пациенты с гемифилией или затруднениями, связанными с лечением кости или раны	
• Пациенты с неконтролируемым диабетом, задытые курильщики или алкоголики	
• Пациенты, чья иммунная система находится в неактивном состоянии в связи с химической или лучевой терапией	
• Пациенты с инфекцией или воспалением в полости рта (неадекватная гигиена полости рта, бруксизм)	
• Пациенты с неизлечимым нарушением окклюзии/суставов, недостаточной зубной дугой	
• Любой пациент, который не пригоден для хирургического вмешательства	
- Побочные эффекты	
После операции могут возникнуть некоторые проблемы (утрата устойчивости имплантата, повреждение протеза). К вышеупомянутым проблемам могут привести недостаточное качество и количество оставшейся кости, инфекция, аллергическая реакция, недостаточная гигиена полости рта или неконтактность пациента, подвижность имплантата, частичное ухудшение тканей и ненадлежащее положение или расстановка имплантатов.	
Информация о возможном влиянии медицинского устройства на способность управления транспортными средствами, механизмами	
Медицинскоеизделий не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.	
Принцип работы и процедурные меры предосторожности	
Имплантаты стоматологические SS SA предназначеныдляодно- и двухэтапных хирургических процедур. Насколько это возможно, попытайтесь свести к минимуму повреждение клеток и хирургические травмы, уделяйте особое внимание поддержанию температуры на месте установки имплантата и удалению источников загрязнения и инфекции. Отклонение от рекомендуемых методов проведения операций повышает риск неудачнойоссеоинтеграции. Все сверла и метчики должны в достаточной мере и непрерывно орошаться в ходе использования для охлаждения. Установку имплантата следует выполнять при очень низкой скорости (25-30 об/мин) или вручную. Использование избыточного крутящего момента (превышающего 55 Нсм) при установке крепления может иметь неблагоприятные последствия, например, частичный перелом или некроз кости. Установка имплантата при наклоне под углом 30° или выше не рекомендуется в связи с возможным переломом имплантата. Следует избегать немедленную нагрузку на крепление сразу же	
после хирургического вмешательства. Важными элементами при определении подходящего времени нагрузки являются качество кости и первоначальная устойчивость после установки крепления. Имплантаты минимального диаметра с условиямиабатментами не рекомендуется использовать для установки в области задней зубной дуги рта из-за ограниченной прочности имплантата. Ультра-широкие крепления предназначены для использования только в целях замены больших коренных зубов, и эти угловые абатменты не предназначены для использования с ультра-широкими креплениями. Оцените качество кости и радиографические изображения, чтобы определить любые потенциальные анатомические противопоказания к использованию ультра-широкого крепления.	
Для установки короткого имплантата (диаметр составляет 5 мм или выше, а длина составляет короче 7 мм), который используется только в области больших коренных зубов, врач-клиницисты должны тщательно осмотреть пациентов для выявления любого из нижеследующих состояний: 1) потеря околоимплантатной кости 2) изменение реакции имплантата на перкуссию 3) радиографические изменения в контакте кость-имплантат по длине имплантата. Если коротки имплантат демонстрирует подвижность или потерю кости более, чем на 50%, тогда имплантат следует рассматривать в качестве претендента на возможное удаление. И врачи-клиницисты должны рассмотреть возможность использования двухэтапного хирургического подхода со шплинтованием короткого имплантата к дополнительному имплантату, а также установку самого широкого крепления, которое только возможно. Обеспечьте более длительные периоды заживления для оссеоинтеграции перед изготовлением протеза и избегайте немедленного нагружения. Изделия диаметром менее 3,25 мм следует использовать исключительно для передней области нижней челюсти. Рекомендуется избегать применения в твердой кости крепления с гидроксиапатитным покрытием, и крутящий момент вставки имплантата должен составлять менее 35 Нсм, поскольку в слое покрытия могут образоваться трещины или повреждения при установке имплантата. Поверхности СА и SOI имеют точно такую же физическую форму, что и поверхность SA, изготовленная посредством струйной обработки и обработки травлением. После обработки поверхности SA для предотвращения подвергения изделия \ воздействию атмосферы СА хранится в растворе, тогда как SOI хранится в форме покрытия водянй пленкой; она предназначена для поддержания химически активированного состояния поверхности SA. Таким образом, изделия СА или SOI следует имплантировать в целевую область, по крайней мере, в течение 15 минут после их извлечения из контейнера.	
Основные технические характеристики медицинского устройства, фотографические и схематические изображения	
Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим официальным представителем производителя или посетите веб-сайт www.osstem.ru.	
Перечень и описание материалов медицинского устройства, имеющих прямой или косвенный контакт с телом пациента (человеческое тело)	
Наименование продукта	Материал
Имплантат SS II SA	Титановый сплав Ti
Имплантат SS III SA	
Установочный адаптер	Сплав титана Ti-6Al-4V окрашен анодированием
Винт-заглушка	Титан Grade 4
Информация в соответствии с данными из государственного реестра лекарственных препаратов медицинского назначения, содержащихся в медицинском устройстве	
Не применимо	
Совместимость устройства	
Абатмент, протетические компоненты и инструменты для системы имплантации Osstem являются совместимыми только с креплением Osstem Implant. При использовании данного изделия совместно с изделиями других производителей могут возникать различные проблемы, в том числе расшатывание и перелом из-за неполной блокировки и проблем совместимости.	
Комплект поставки	
Имплантат SS SA поставляется вместе с установочным адаптером и винтом-заглушкой (смотрите информацию о составе комплектов в представленной ниже таблице) или отдельно. Адаптер поставляется только с имплантатами. Винт-заглушка может поставляться отдельно.	
Код	Компонент комплектного изделия
	Крепление SS II SA
ASS2R4007518	SS2R4007518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4008518	SS2R4008518 + SSHRG + SSCS480

ASS2R4010518	SS2R4010518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4011518	SS2R4011518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4013518	SS2R4013518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4008528	SS2R4008528 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4010528	SS2R4010528 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4011528	SS2R4011528 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4013528	SS2R4013528 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4507518	SS2R4507518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4508518	SS2R4508518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4510518	SS2R4510518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4511518	SS2R4511518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4513518	SS2R4513518 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4508528	SS2R4508528 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4510528	SS2R4510528 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4511528	SS2R4511528 + SSHRG + SSCS480
ASS2R4513528	SS2R4513528 + SSHRG + SSCS480
ASS2W4507520	SS2W4507520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W4508520	SS2W4508520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W4510520	SS2W4510520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W4511520	SS2W4511520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W4513520	SS2W4513520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W5006520	SS2W5006520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W5007520	SS2W5007520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W5008520	SS2W5008520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W5010520	SS2W5010520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W5011520	SS2W5011520 + SSHWB + SSCS600
ASS2W5013520	SS2W5013520 + SSHWB + SSCS600
Крепление SS III SA	
ASS3R3508518	SS3R3508518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R3510518	SS3R3510518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R3511518	SS3R3511518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R3513518	SS3R3513518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R3508528	SS3R3508528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R3510528	SS3R3510528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R3511528	SS3R3511528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R3513528	SS3R3513528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4007518	SS3R4007518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4008518	SS3R4008518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4010518	SS3R4010518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4011518	SS3R4011518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4013518	SS3R4013518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4008528	SS3R4008528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4010528	SS3R4010528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4011528	SS3R4011528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4013528	SS3R4013528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4507518	SS3R4507518 + SSHRG + SSCS480

ASS3R4508518	SS3R4508518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4510518	SS3R4510518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4511518	SS3R4511518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4513518	SS3R4513518 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4508528	SS3R4508528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4510528	SS3R4510528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4511528	SS3R4511528 + SSHRG + SSCS480
ASS3R4513528	SS3R4513528 + SSHRG + SSCS480
ASS3W4507520	SS3W4507520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W4508520	SS3W4508520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W4510520	SS3W4510520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W4511520	SS3W4511520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W4513520	SS3W4513520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W5006520	SS3W5006520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W5007520	SS3W5007520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W5008520	SS3W5008520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W5010520	SS3W5010520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W5011520	SS3W5011520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W5013520	SS3W5013520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W6006520	SS3W6006520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W6007520	SS3W6007520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W6008520	SS3W6008520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W6010520	SS3W6010520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W6011520	SS3W6011520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W6013520	SS3W6013520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W7006520	SS3W7006520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W7007520	SS3W7007520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W7008520	SS3W7008520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W7010520	SS3W7010520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W7011520	SS3W7011520 + SSHWB + SSCS600
ASS3W7013520	SS3W7013520 + SSHWB + SSCS600

Риска класса в зависимости от потенциального риска медицинского изделия в соответствии с номенклатурой	
- Классификация медицинского изделия: 2b в соответствии с Директивой 93/42/CEE и с правилом 8 ПРИЛОЖЕНИЯ IX КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ MDD 2007/47 / ЕС	
- Характер контакт с телом: имплантируемое устройство.	
- Длительность контакта: перманентный (более 30 дней).	
- Устройство стерильно.	
- Инвазивность: Инвазивное изделие	
Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия	
Не применимо	

Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения, в том числе информация об их биологической совместимости и безопасности, о выборе источников (доноров), отборе проб, обработке, хранении этих материалов и работе с ними	
Не применимо	
Процедура и условия для утилизации или уничтожения медицинского устройства	
- Требования к охране окружающей среды	
• Медицинское устройство при использовании, транспортировке и хранении не оказывает отрицательных влияний на людей и окружающую среду.	
- Переработка или утилизация медицинского устройства	
• Устройство должно утилизироваться в соответствии с местными законодательством и больничной практикой.	
• Устройство не должно содержать каких-либо опасных материалов.	
• Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности относятся к медицинским отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.	
• После контакта с телом человека изделие следует считать медицинскими отходами класса В и утилизировать в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.	
Предупреждения и меры предосторожности	
- Общие меры предосторожности	
• Хирургическая технология зубного имплантата предусматривает экспертную, комплексную процедуру. Для выполнения хирургического вмешательства по установке имплантата требуется формальное обучение.	
- Меры предосторожности	
• Определите местную анатомию и пригодность имеющейся кости для установки имплантата. Подготовьте имплантат с учетом ожидаемых ситуаций и мер предосторожности. Для определения анатомических ориентиров, окклюзионных условий, периодонтального статуса и достаточности кости важность представляют визуальный контроль, а также панорамные и периапикальные снимки. Перед хирургическим вмешательством для установки имплантата необходимы достаточные снимки, прямая пальпация и визуальный контроль места установки имплантата.	
Совместимость с МРТ	
Имплантаты Osstem не были оценена на предмет безопасности и совместимости в среде МР. Имплантаты Osstem не была протестирована на нагрев или миграцию в среде МР.	

Методы и аппаратура для дезинфекции и стерилизующей очистки				
Имплантаты стоматологические SS SA стерилизованы гамма-излучением. Процесс стерилизации выполняется на условиях консигнации компанией Greenpia Technology Inc., которая обладает профессиональной компетенцией в области стерилизации гамма-излучением. SAL (Гарантированный уровень стерилизации) должен относиться к классу 3(10-6), который является наивысшим уровнем в соответствии с EN 556.				
Срок годности				
8 лет				
Длительность контакта в теле человека				
Постоянный				
Условия эксплуатации, транспортировка и хранение				
- Условия Хранения				
Храните изделие в сухом месте при комнатной температуре. Беречь от прямого воздействия солнечного света.				
	Условия эксплуатации	Условия комнатной температуры	Условия транспор-тировки	Условия хранения
Температура °C	от +32°C до +42°C	от +21°C до +25°C	от +1°C до +30°C	от +1°C до +30°C
Атмосферное давление	от 520 гПа до 1060 гПа	от 520 гПа до 1060 гПа	от 500 гПа до 1050 гПа	от 500 гПа до 1050 гПа
Степень влажности	100%	40-60 %	Не более 60 %	Не более 60 %
требования к установке/монтажу				
Не применимо				
Гарантии				
1 год				
Маркировка и упаковка медицинского устройства				
• Упаковка				
• Упаковка одинаковая как для отдельного имплантата SS SA, так и для комплектов.				
В картонной коробке находятся изделие в стерильной ампуле в блистере, инструкции по применению и этикетки для истории болезни пациента.				
• Упаковка для винта-заглушки				
В картонной коробке находятся изделие в блистере и инструкция по применению.				
- Пояснение используемых символов				
• Следующий перечень символов распространяется на различные изделия.				
Чтобы увидеть, какие символы применяются в отношении				

данного изделия, обратитесь к этикеткам на упаковке изделия.	
Обозначение	Описание
	Стерилизовано излучением
	Не использовать повторно.
	Внимание, обращайтесь к сопроводительным документам
	Каталожный номер
	Дата производства
	Производитель
	Код серии
	Использовать до
	«Обращаться с осторожностью. Предостережение!»
	Хранить вдали от прямых солнечных лучей
	Хранить в сухом месте

Эксплуатационная документация на мешинское изделие (Июл., 2020 г. Версия 1.7)

наименование : Формирователь десны (Healing Abutment) (далее тексту – Формирователь десны).

производитель : «Ostem Имплант Ко., Лтд.» (Ostem Implant Co., 66-16, Balseong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea) (далее – Ostem Implant Co., Ltd., Haeundae plant, 66-16, Balseong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea)

наименование

Формирователи десны для имплантатов изготавливаются из титана, нержавеющей стали, полимера, и сплавов. Материалы изготовления протезов и стоматологические лабораторные материалы включают полимеры и титан. Формирователи десны для имплантатов Ostem Implant и Ostem Implant – TS Implant System, SS Implant System. Использование данного изделия совместно с изделиями других производителей может привести к возникновению различных проблем, включая ослабление соединения и перелом из-за неполной фиксации и недостаточной совместимости. Подробную информацию можно найти в руководстве Ostem, каталоге или на нашем веб-сайте (www.ostem.com). Код продукта, спецификация, дата изготовления и истечения срока годности приводятся на этикетке изделия.

Использование данного изделия совместно с изделиями других производителей может привести к возникновению различных проблем, включая ослабление соединения и перелом из-за неполной фиксации и недостаточной совместимости. Подробную информацию можно найти в руководстве Ostem, каталоге или на нашем веб-сайте (www.ostem.com). Код продукта, спецификация, дата изготовления и истечения срока годности приводятся на этикетке изделия.

Назначение

Изделие предназначено для использования при частичном отсутствии зубов или при полной адентии нижней и верхней челюсти, в качестве опоры для одиночных или многоэлементных реставрационных конструкций, включая протезы с цементной или винтовой фиксации, съемные протезы, а также в качестве окончательной или временной опоры для абатмента под несъемный мостовидный протез.

Область применения

Стоматология
Только для профессионального использования квалифицированными стоматологами, хирургами. Строго для специализированных и обученных пользователей.

Показания к применению

Система имплантатов Ostem Implant (в том числе формирователь десны) была разработана для нужд хирургической имплантологии; в ходе проведения операции система устанавливается в верхне- или нижнечелюстной альвеолярный отросток для замены верха зуба. Установленный имплантат заменяет утраченный зуб, создавая формирователь десны с альвеолярным отростком после завершения ортопедической операции. Система имплантатов Ostem Implant используется при частичном отсутствии зубов или при полной адентии нижней и верхней челюсти, в качестве опоры для одиночных или многоэлементных реставрационных конструкций, включая протезы с цементной или винтовой фиксации, съемные протезы, а также в качестве окончательной или временной опоры для формирователя десны под несъемный мостовидный протез. Система формирователя десны предназначена для использования

со стоматологическими имплантатами в качестве опоры для реставрационных конструкций, например коронок, мостовидных или съемных зубных протезов.

Побочный эффект

После проведения операции может возникнуть ряд проблем (потеря стабильности имплантата, повреждение протез). Причинами подобных проблем могут быть: несоответствующее качество и объем остаточной костной ткани, аллергическая реакция, неполноценная гигиена ротовой полости или несоблюдение пациентом установленных требований, подвижность имплантата, частичное ухудшение состояния тканей или некорректное позиционирование имплантата.

Противопоказания

Имплантация противопоказана, в частности, следующим лицам:
• пациентам, страдающим от гемофилии или проблем, связанных со сложностью контроля травм твердых или мягких тканей;
• пациентам с неконтролируемым диабетом, тяжелой никотиновой или алкогольной зависимостью;
• пациентам с ослабленной после химиотерапии или лучевой терапии иммунной системой;
• пациентам с внутритротовой инфекцией или воспалением (неналеченная гингива полости рта, бруксизм);
• пациентам с неустраненной окклюзией/нарушением функции суставов, недостаточной длиной зубной дуги;
• пациентам, не подлежащим хирургическому вмешательству по любым иным причинам.

Общие меры предосторожности

Хирургическая методика имплантации представляет собой сложную, требующую наличия специальных навыков, процедуру. К проведению операции по имплантации допускаются только соответствующие лица, получившие формальное образование.

Меры предосторожности

Изучите анатомию оперируемого участка и соответствие доступного объема костной ткани цели имплантации. Подготовьте формирователь десны, соблюдая предусмотренные меры предосторожности. Для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, пародонтального статуса и адекватности объема костной ткани выполняется визуальный осмотр и проводится панорамное и перинаральное рентгенографическое исследование.

Противопоказания к применению

При выполнении операции по имплантации требуется высокая точность и осторожность, необходимо минимизировать повреждение клеточных тканей, а также не допускать превышения температуры, нанесения значительных хирургических травм и/или наличия источника заражения и заражения.

Противопоказания к применению

Все хирургические инструменты должны быть в надлежащем

состоянии. Поскольку имплантаты, протезы и инструменты имеют небольшие размеры, следует проявлять осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути и улучшения пациента. Системная информация (TS, SS, US) и информация о совместимости (Mini, Regular, Wide) формирователя десны и имплантата должна быть подтверждена до использования во избежание ослабления соединения или перелома в результате неправильной фиксации. После фиксации формирователя десны на имплантате необходимо выполнить проверку на соответствие соединения требованиям методом рентгенографического исследования. Для предотвращения ослабления соединения винт рекомендуется подтянуть 2–3 раза. Чрезмерный момент затяжки может привести к разрыву винта. При изготовлении протеза важно добиться правильного распределения нагрузки. В случае мостовидного зубного протеза необходимо подтвердить совместимость протеза и формирователя десны и выполнить корректировку прикуса. Чрезмерный выступ протеза может привести к перелому системы имплантатов. Изготовление протеза с использованием керамического формирователя десны требует

Меры предосторожности для пациентов

Выполняйте тщательную очистку ротовой полости. Не подтирайте зубы избыточной нагрузке до момента установки окончательного протеза.

Предупреждение

Неправильная выборка пациентов и хирургических методик может привести к отказу имплантата и формирователя десны или потере объема костной ткани, поддерживающей имплантат. Имплантаты Ostem Implant и формирователи десны не подлежат ремоделированию и использованию в десках, отлеченных от указанных производителей. Подвижность имплантата, потеря объема костной ткани и хронические инфекции могут стать причиной неудачной остеоинтеграции имплантата.

Сведения о стерильности

Изделие стерильное, однократное
Формирователи десны описываются и стерилизуются гамма-радиацией. Во избежание заражения или заражения изделия или оперируемого участка изделие следует имплантировать с помощью стерильного инструмента в стерильной среде. Поврежденные изделия, изделия с открытой упаковкой или изделия с истекшим сроком годности подлежат отбраковке из-за потенциального риска заражения, заражения или неудачной остеоинтеграции. Повторная стерилизация или использование изделия может привести к возникновению инфекции, неудачной остеоинтеграции или повреждению имплантата вследствие снижения точности.

Условия хранения

Хранить изделие в сухом помещении при комнатной температуре. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
- Температура : 1–30 °C
- Влажность : 0–90%

Условия транспортировки
- Температура : -50–50 °C
- Влажность : 0–90%

Условия эксплуатации

- Температура : 1–40 °C
- Влажность : 0–100%

Срок службы

Срок службы изделия составляет 8 лет.

Требования к охране окружающей среды, сведения по утилизации или уничтожению.

В случае обнаружения дефектов упаковки перед применением изделия необходимо утилизировать изделие вместе с упаковкой вместе с бытовыми отходами.

После применения изделия его необходимо утилизировать должным образом. При выборе способа утилизации, необходимо учитывать возможность отнесения изделия к эпидемиологически опасным отходам и необходимость применения соответствующих особых мер.

Класс опасности отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 – класс Б.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 1 год

Адрес для обращения пользователей на территории РФ:

ООО «OSTEM»
115432, г. Москва, пр. Андропова, д.18, кор.7, эт.8, оф.1

Расшифровка символов	
Символ	Расшифровка
	Логотип производителя
	CE с номером проверяющего учреждения – подтверждает соответствие с нормами ЕС
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до...
	Код партии
	Номер по каталогу
	Радиационная стерилизация
	Не использовать повторно
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (Ипол., 2023 г. Версия 1.1)		2) Пациент с декомпенсированным диабетом;		Имплантаты стоматологические TS III		РЭН 2020/11672		СИМВОЛЫ НА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ		осмотр, а также панорамные и периапикальные рентгенограммы необходимы для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, состояния пародонта и соответствия кости.	
Компоненты абатментов в вариантах исполнения		3) Пациент со сниженной функцией иммунитета из-за химиотерапии и лучевой терапии;		Система стоматологических имплантатов TS SA		РЭН 2017/5388				Хрупкое, обращаться осторожно	
Название медицинского изделия		4) Пациент с инфекцией или воспалением ротовой полости;		Системы стоматологических имплантатов GS, SS, US с наборами хирургических инструментов		РЭН 2015/3345				Не допускать воздействия солнечного света	
Данные по тексту могут упоминаться следующие наименования компонентов абатментов, изделия.		5) Пациент с неизлечимыми нарушениями прикуса/сустава и пациент с недостаточным межчелюстным расстоянием;		Система стоматологических имплантатов GS с принадлежностями		ФСЗ 2009/04328				Беречь от влаги	
Информация о производителе медицинского изделия и обслуживание клиентов		6) Пациент, который не подходит для операции.		Инструменты и приспособления для установки стоматологических имплантатов, в наборах и отдельных упаковках		ФСЗ 2011/10397		Порядок утилизации/ликвидации МИ		Процедурные меры предосторожности (хирургия)	
Для получения дополнительной информации обратитесь к официальному представителю ООО «ОССТЕМ» или с сайта: ostem-implant.co., Ltd. (Остеа Имплант Ко., Лтд.) .		- Возможные побочные эффекты при использовании медицинского изделия		Объяснение символов		Класс риска		При утилизации необходимо соблюдать меры предосторожности. Системная информация (TS, SS, US) и информация о совместимости (минимальная, обычная, широкая) абатмента и имплантата должны быть подтверждены перед использованием, чтобы предотвратить ослабление или разрушение, вызванное ошибочной фиксацией. После фиксации абатмента на имплантате убедитесь в правильности фиксации с помощью рентгенографического изображения. Рекомендуется зафиксировать винт с помощью крутящего момента, указанного на тейпковой упаковке. Для предотвращения ослабления рекомендуется многократное затягивание 2-3 раза. Чрезмерный момент затяжки может привести к поломке винта. Упловый абатмент может быть сломан из-за ограниченной жесткости имплантата. Не рекомендуется для использования в боковом отделе. При изготовлении протеза важно правильно распределить нагрузку. В случае установки мостов, необходимо проверить совместимость между протезом и абатментом, а также необходимо провести окклюзионную коррекцию. Чрезмерная свободная опора может вызвать перелом системы имплантата. Изготовление протеза с использованием керамического абатмента требует специальной техники, а техник должен пройти соответствующую подготовку.		Классификация медицинского изделия	
Официальный производитель		После операции может возникнуть несколько проблем (потери стабильности имплантата, повреждение протеза и т.д.). Недостаточное качество и количество оставшейся кости, инфекция, аллергическая реакция, плохая гигиена полости рта или отказ пациента от взаимодействия, подвижность имплантата, хроническое разрушение ткани и неправильное положение или расположение имплантатов могут вызвать вышеупомянутые проблемы. При использовании изделия, которое нельзя использовать вместе, происходит повреждение абатмента, соединенного с изделием. Такое повреждение может привести к повреждению имплантата и протеза, а также может неблагоприятно повлиять на кость пациента.		Следующий список символов относится к различным изделиям. См. этикетку на упаковке изделия, чтобы увидеть, какие символы применяются к данному изделию.		2a		Постоянный (более 30 суток)		Меры предосторожности для пациентов	
Ostem Implant Co., Ltd. (Остеа Имплант Ко., Лтд.), Республика Корея, Bongsong-ro 513beon-gil, Haendae-gu, Busan, 48002, Republic of Korea.		Совместимость медицинского изделия		Символ		Описание		Инвазивность		Предупреждения	
Место производства		Компоненты абатментов в вариантах исполнения совместимы только с имплантатами OSTEM. Использование другого изделия в сочетании с изделиями других производителей может вызвать различные проблемы, в том числе ослабление и разрушение. Такое повреждение может привести к повреждению имплантата и протеза, а также может неблагоприятно повлиять на кость пациента.				Код партии		Стерильность		Подбор неподходящих пациентов и хирургических методов может вызвать отказ имплантата или потерю кости, поддерживающей имплантат. Имплантаты производства «Остеа» не должны использоваться в целях, отличных от рекомендуемых, и не должны быть реконструированы. При использовании изделия, которое нельзя использовать вместе, происходит повреждение абатмента, соединенного с	
Ostem Implant Co., Ltd., 66-16, Bongsong-ro 513beon-gil, Haendae-gu, Busan, 48002, Republic of Korea.		Наименование медицинского изделия				Номер по каталогу		Кратность применения		Меры предосторожности	
- Российский уполномоченный представитель		Регистрационное удостоверение				Дата изготовления		Характер контакта с телом		Определите местную анатомию и пригодность доступной кости для установки имплантата. Подготовьте имплант с учетом ожидаемых ситуаций и предостережений. Визуальный	
ООО «ОССТЕМ» 115432, город Москва, Проспект Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 8 офис 1. Тел.: +7-495-739-99-25 Эл. почта: info@ostem.ru		Инструменты для установки стоматологических имплантатов в отдельных упаковках				Изготовитель		Предупреждения и меры предосторожности		Общие меры предосторожности	
Назначение медицинского изделия		Инструменты для хирургической установки дентальных имплантатов				Запрет на повторное применение		Хирургическая технология стоматологического имплантата включает в себя экспертную, сложную процедуру. Формальная подготовка необходима для выполнения операции по имплантации.		Меры предосторожности	
Изделия предназначены для использования со стоматологическими имплантатами для обеспечения поддержки реставрационных конструкций, таких как коронки, мосты или съемные стоматологические протезы, а также для использования при протезировании.		Компоненты для установки стоматологических имплантатов TS				Осторожно!		Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
Показание, противопоказание и возможные побочные эффекты		Абатменты TS Abutment System				Знак соответствия PC		Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
- Показания к применению		Имплантаты стоматологические TS SA						Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
- Противопоказания		Система стоматологических имплантатов TS						Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
- Препараты								Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
Компоненты абатментов в вариантах исполнения в вариантах исполнения предназначены для обеспечения поддержки реставрационных конструкций, таких как коронки, мосты или съемные стоматологические протезы.								Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
- Противопоказания								Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
Противопоказания включают, но не ограничиваются:								Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	
1) Пациент с нарушением свертываемости крови или проблемой при лечении костей или ран;								Меры предосторожности		Оформитель десны (Healing Abutment)	

изделием. Такое повреждение может привести к повреждению имплантата и протеза, а также может неблагоприятно повлиять на кость пациента. Подвижность имплантата, потеря костной массы и хроническая инфекция могут привести к неудаче операции по имплантации.				замене изделия на новое в течение 1 года с момента покупки товара при условии предоставления покупателем дефектного изделия и соответствующих документов. Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у официального представителя производителя – ООО «ОССТЕМ» (Россия). Медицинские изделия с естественным износом обмену и возврату не подлежат. ООО «ОССТЕМ» не несет ответственности в случае повреждения или отказа в работе изделия, а также нанесенного им ущерба в случае, если это явилось следствием нарушения пользователем правил применения изделия, самостоятельной модификации, а также использования изделия не по прямому назначению.			
Методы и средства дезинфекции и стерилизации							
1) Лабораторный аналог							
- Лабораторный аналог используется в лаборатории для изготовления протезов. Поскольку он не касается непосредственно ротовой полости, стерилизация не требуется.							
2) Прочие							
- Компоненты абатментов в вариантах исполнения поставляются в стерильном состоянии. Однако нестерильные изделия должны быть стерилизованы в автоклаве при 132 °C в течение 15 минут перед использованием в соответствии с ISO 17665-1 и 2. После стерилизации паром изделия должны быть высушены в течение 15 минут перед использованием.							
Срок годности							
Изделие поставляется стерильным и является изделием однократного применения. Срок годности – не ограничен.							
Условия эксплуатации, транспортировка и хранение							
Не размещайте компоненты абатментов в вариантах исполнения в местах, где возможно заражение любой инфекцией. Храните изделие в сухом месте при комнатной температуре. Храните вдали от прямых солнечных лучей. Перевозка груза должна осуществляться в транспортной упаковке на крытом транспорте с соблюдением мер и правил перевозки, действующих на выбранном виде транспорта.							
	Условия эксплуатации	Условия транспортировка	Условия хранения				
Температура	От +1°C до +30°C	От -50°C до +50°C	От +1°C до +30°C				
Влажность	От 0% до 100%	От 0% до 90%	От 0% до 90%				
Гарантия							
Гарантия на медицинское изделие составляет 1 год со дня покупки конечным потребителем. Производителем гарантируется, что изделие соответствует заявленным свойствам и характеристикам, подтвержденным регистрационным удостоверением. При выявлении в изделии дефектов, возникших по вине производителя, компания ООО «ОССТЕМ» принимает на себя обязательства по							

● Инструкция по применению Имплантаты стоматологические TS SA (Сев., 2024 г. Версия 1.9)

1. Название медицинского изделия

Имплантаты стоматологические TS SA

2. Информация о производителе медицинского изделия (название, адрес местоположения, почтовый адрес, номер телефона, адрес производственных площадок)

2.1. Наименование

Osstem Implant Co., Ltd. (Осстем Имплант Ко., Лтд.)

2.2. Адрес

66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 48002, Republic of Korea (66-16, Бансонг-ро 513беон-гил, Хеунде-гу, Пусан, 48002, Республика Корея)

Tel.: 82-51-850-2500 Факс: 82-51-861-4693

2.3. Адрес производственных площадок

Osstem Implant Co., Ltd., 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 48002, Republic of Korea (Осстем Имплант Ко., Лтд., 66-16, Бансонг-ро 513беон-гил, Хеунде-гу, Пусан, 48002, Республика Корея)

2.4. Уполномоченный представитель производителя

ООО «ОССТЕМ» 115432 г. Москва, вят.г.т. муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, д. 18, кор. 7, помещение 1Е/13. Tel.: 8 (495) 739-99-25 E-mail: info@osstem.ru

3. Назначение медицинского изделия

Имплантаты это искусственные зубные корни, разработанные для использования в дентальной имплантации с целью восстановления утраченного зуба. Имплантаты устанавливаются хирургическим способом в верхнечелюстную или нижнечелюстную костную ткань, чтобы заменить натуральный зубной корень. Имплантаты предназначены для использования при частичной или полной адентии нижней и верхней челюсти с целью реставрации одного или нескольких зубов, включая: цементную фиксацию, винтовую фиксацию или съёмное протезирование, а также финальное или временное восстановление опорного зуба при несъёмном мостовидном протезировании, предназначены для отложенной нагрузки. Изделия с максимальным диаметром 3,25 мм должны использоваться исключительно для передних зубов нижней челюсти, чтобы не допустить повреждения в результате чрезмерной окклюзионной нагрузки.

4. Показания, противопоказания и побочные эффекты:

Показания

Имплантаты это искусственные зубные корни, разработанные для использования в дентальной имплантации с целью восстановления утраченного зуба. Имплантаты устанавливаются хирургическим способом в верхнечелюстную или нижнечелюстную костную ткань, чтобы заменить натуральный зубной корень. Имплантаты предназначены для использования при частичной или полной адентии нижней и верхней челюсти с целью реставрации одного или нескольких зубов, включая: цементную фиксацию, винтовую фиксацию или съёмное протезирование, а также финальное или временное восстановление опорного зуба при несъёмном мостовидном протезировании, предназначены для отложенной нагрузки. Изделия с максимальным диаметром 3,25 мм должны использоваться исключительно для передних зубов нижней челюсти, чтобы не допустить повреждения в результате чрезмерной окклюзионной нагрузки.

Противопоказания

Противопоказания включают, но не ограничиваются следующим:

- пациенты с гемофилией или осложнениями, связанными с лечением костей и ран;
- пациенты с неконтролируемым диабетом, сильной никотиновой или алкогольной зависимостью;
- пациенты с ослабленной иммунной системой из-за применения химиотерапии или лучевой терапии;
- пациенты с оральной инфекцией или воспалением (неадекватная гигиены полости рта, бруксизмом);
- пациенты с неизлечимой окклюзией зубов/ нарушением функции суставов, недостаточным зубным рядом;
- все прочие пациенты, у которых есть противопоказания к операции.

Побочные эффекты

После операции может возникнуть ряд осложнений (потеря стабильности имплантата, повреждение протеза и т.д.). Несоответствующее качество и недостаточный размер остаточной кости, инфекция, аллергическая реакция, ненадлежащая гигиена полости рта или несоблюдение врачебных рекомендаций пациентом, подвижность имплантата, частичное разрушение ткани и неправильное положение или установка имплантатов может стать причиной вышеуказанных осложнений.

5. Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Данное медицинское изделие предназначено для использования в клинической практике квалифицированными врачами и специалистами в области медицины.

6. Описание принципов, лежащих в основе работы медицинского изделия и их особенности

Имплантаты предназначены для одно- и двухэтапных хирургических процедур. Рекомендуется максимально эффективно сократить повреждения клеточной ткани и хирургическую травму, уделять особое внимание поддержанию температуры в области имплантации и удалению источника загрязнения и инфекции. Несоблюдение рекомендуемых операционных методов повышает риск недостаточной остеоинтеграции. Все сверла и винтовые метчики необходимо непрерывно орошать в достаточном объеме с целью их охлаждения в процессе использования. Установку имплантата следует выполнять с довольно низкой скоростью (25-30 об/мин) или в ручном режиме. Чрезмерный крутящий момент (более 55 Нсм) при установке имплантата может иметь такие неблагоприятные последствия, как частичный перелом или некроз кости. Не рекомендуется устанавливать имплантат под углом наклона более 30° из-за возможного повреждения имплантата. Следует избегать непосредственной нагрузки на изделие сразу после операции. Качественный параметр кости и первичная устойчивость после установки имплантата являются важными факторами при определении соответствующего времени нагрузки.

Не рекомендуется устанавливать имплантаты минимального диаметра с угловыми абатментами в задней части полости рта из-за ограниченной прочности имплантата. Ультратонкие имплантаты предназначены для использования только для замены моляров, причем угловые абатменты не используются в этом случае. Количественно оцените костную ткань и изучите рентгенограмму, чтобы определить любые возможные анатомические противопоказания к использованию ультратонкого имплантата. Для установки короткого имплантата (с минимальным диаметром 5 мм, и максимальной длиной 7 мм), который применяется исключительно в области моляров, врач должен внимательно исследовать наличие таких состояний у пациента, как:

- 1) потеря околоимплантантной костной ткани;
- 2) изменения реакции имплантата на перкуссию;
- 3) рентгенологические изменения в области контакта кости и имплантата по всей длине имплантата.

Если короткому имплантату присуща подвижность или потеря костной ткани более чем на 50%, следует рассмотреть вариант возможного удаления имплантата. В данном случае лечащему врачу рекомендуется использовать двухэтапный хирургический подход, который заключается в шинировании короткого имплантата до уровня дополнительного имплантата и в установке

как можно более широкого имплантата. Перед изготовлением протеза следует предусмотреть более длительный период заживления для остеоинтеграции и избежать немедленной нагрузки.

Изделие с максимальным диаметром 3,25 мм необходимо применять исключительно для передних зубов нижней челюсти. Рекомендуется избегать применения имплантата с НА-покрытием для укрепления кости, а крутящий момент при установке имплантата должен быть не более 35 Нсм, поскольку в слюе, на которое наносится покрытие, при установке имплантата могут появиться трещины или повреждения. Поверхности СА и SOI имеют такую же физическую форму, что и поверхность SA, которая образуется методом пескоструйной обработки и травления. После обработки SA для предотвращения воздействия продуктов на атмосферу, СА сохраняется в форме раствора, тогда как SOI - в виде водной пленки; это необходимо для поддержания химически активированного состояния поверхности SA. Таким образом, изделия СА или SOI должны быть имплантированы в целевую область в течение 15 минут после извлечения их из контейнера.

7. Основные технические характеристики медицинского изделия, фотографические и схематические изображения

Свяжитесь с уполномоченным представителем производителя или обратитесь на сайт www.osstem.ru для получения информации* * - информацию см. Приложение I

8. Перечень и описание материалов медицинского изделия, которые косвенно или непосредственно контактируют с телом пациента (организмом человека)

Название изделия	Материал
Имплантат TS II SA	Титановый сплав Ti CP – Grade 4, кроме TS3M30**S, Ti-6Al-4V (для TS3M30**S)
Имплантат TS III SA	
Имплантат TS IV SA	
Установочный адаптер Simple Mount	Сплав Ti-6Al-4V
Винт-заглушка Cover Screw	Титановый сплав Ti CP – Grade 4

9. Информация в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения в отношении лекарственных средств, содержащихся в медицинском изделии

Не применимо

10. Совместимость устройства

Абатменты, протезные компоненты и инструменты для системы имплантатов совместимы только с имплантатами торговой марки «Осстем». Использование этого изделия в сочетании с изделиями других производителей может привести к различному роду проблем, включая ослабление и разрушение в результате неполной фиксации и несовместимости.

11. Комплектность поставки

В комплект поставки имплантата TS SA входит Установочный адаптер Simple Mount и Винт-заглушка Cover Screw (См. Информацию о комплектации в таблице ниже), также возможна отдельная поставка имплантатов. Установочный адаптер Simple Mount поставляется исключительно с имплантатами. Винт-заглушка Cover Screw может поставляться отдельно.

12. Упаковка и маркировка медицинского изделия

Упаковка

Упаковка одинаковая, как для отдельных имплантатов TS SA, так и для комплектов. Картонная коробка содержит изделие в стерильной ампуле в блистере, инструкцию по применению и наклейки для медицинской карты пациента. Упаковка для винта-заглушки Cover Screw. Картонная коробка содержит изделие в стерильной ампуле в блистере, инструкцию по применению.

Разъяснение к графическим символам

Следующий перечень графических символов применяется к разным изделиям. См. этикетки на упаковке товара, чтобы определить, какие символы применяются к данному изделию.

Графический символ	Разъяснение
	Простерилизовано радиацией
	Повторно использовать запрещено
	Предостережение! Ознакомьтесь с сопроводительными документами
	Номер по каталогу
	Дата изготовления
	Производитель
	Код партии
	Использовать до
	Знак соответствия ГОСТ*

*символ может быть добавлен при необходимости

13. Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения с указанием информации об их биосовместимости и безопасности, по выбору источников (доноров), отбору проб, обработке, хранению и обращению с материалами

14. Требования к обслуживанию и ремонту медицинского изделия

15. Процедура и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия

Требования к защите окружающей среды:

Медицинское изделие в процессе использования, транспортировки и хранения не оказывает негативного влияния на людей и окружающую среду.

Переработка или утилизация медицинское изделие

Изделие необходимо утилизировать в соответствии с местными законами и врачебными практиками.

Изделие не содержит опасных материалов. Непользованные изделия, у которых закончился срок хранения, относятся к медицинским отходам класса А и должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

После контакта с телом пациента изделие следует считать медицинскими отходами класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

16. Класс риска в зависимости от потенциального опасного воздействия лекарственного средства в соответствии с номенклатурой

Классификация медицинского изделия: Пб
Характер контакта с телом: имплантируемое изделие.
Продолжительность контакта: постоянная (более 30 дней).
Изделие стерильное.
Инвазивность: Инвазивный

17. Предупреждение и меры безопасности

Общие меры безопасности

Хирургическая технология дентальной имплантации включает экспертизу, комплексную процедуру. Для проведения хирургического вмешательства для установки имплантата необходимо пройти плановое обучение.

Меры безопасности

Определите местную анатомию и соответствие доступной костной ткани для установки имплантата. Подготовьте имплантат, учитывая ожидаемые ситуации и меры предосторожности. Для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, состояния пародонта и соответствия костной ткани необходимо провести визуальный осмотр, а также сделать панорамные и периапикальные рентгенограммы. Перед операцией установки имплантата необходимо сделать соответствующие рентгенограммы, непосредственную пальпацию и визуальный осмотр участка имплантации

18. Совместимость с МРТ

Не применимо

19. Методы и аппараты для дезинфекции и стерилизационной очистки

К имплантату TS SA должна применяться стерилизация гамма-излучением.

20. Срок хранения

8 лет

21. Срок сохранения в организме человека

Постоянно

22. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Условия хранения

Хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

	Условия эксплуатации	Условия транспортировки	Условия хранения
Температура °C	От +32°C до +42°C	От +1°C до +30°C	От +1°C до +30°C
Атмосферное давление	От 520 гПа до 1060 гПа	От 500 гПа до 1050 гПа	От 500 гПа до 1050 гПа
Относительная влажность	100%	Не более 60%	Не более 60%

23. Требования к установке

Не применимо.

24. Гарантия

Гарантийный срок хранения медицинского изделия равен сроку годности изделия.

Производитель гарантирует, что изделие соответствует заявленным свойствам и характеристикам, подтвержденным регистрационным удостоверением. При выявлении в изделиях дефектов, возникших по вине производителя, компания ООО «ОССТЕМ» принимает на себя обязательства по замене изделия на новое в течение 1 года с момента покупки товара, при условии предоставления покупателем дефектного изделия и соответствующих документов. Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у официального представителя производителя — ООО «ОССТЕМ» (Россия). Медицинские изделия с естественным износом обмену и возврату не подлежат. ООО «ОССТЕМ» не несёт ответственности в случае повреждения или отказа в работе изделия, а также нанесенного им ущерба в случае, если это явилось следствием нарушения пользователем правил применения изделия, самостоятельной модификации, а также использования изделия не по прямому назначению.

25. Служба поддержки клиентов

Для получения более детальной информации обратитесь к уполномоченному представителю производителя или свяжитесь с «Осстем Имплант Ко.,Лтд» (Osstem Implant Co., Ltd.)

Инструкция по применению - Английский

Об Osstem Implant

Osstem Implant — это бренд стоматологических имплантатов. Материалы абатментов Osstem включают титан, сплавы золота, нержавеющей сталь, сплавы кобальта и хрома, керамические материалы. Материалы для протезирования и зуботехнических лабораторий включают полимеры, титан и нержавеющая сталь. Абатменты имплантатов Osstem и компоненты для протезирования совместимы только с имплантатами OSSTEM. Использование изделий в сочетании с продукцией других производителей может вызвать различные проблемы, в том числе ослабление фиксации и поломку изделий из-за недостаточной степени закрепления и проблем с совместимостью изделий. Обратитесь к инструкциям, каталогу Osstem или нашему веб-сайту (www.osstem.com) для получения более подробной информации. Коды продуктов, технические характеристики, даты изготовления и сроки годности – см. на этикетке продуктов.

Стерильность

Винты-заглушки и заживляющие абатменты стерилизуются гамма-излучением. Чтобы предотвратить загрязнение и инфицирование продукта или участка ткани оперируемого пациента, продукт должен использоваться с использованием стерильных инструментов в стерильной среде. Поврежденные продукты, продукты с вскрытой упаковкой или продукты с истекшим сроком годности должны быть утилизированы по причине их потенциального заражения, инфицирования или вероятного негативного влияния на процессы интеграции кости. Повторная стерилизация или повторное использование продукта может привести к инфицированию, нарушению интеграции кости или повреждению имплантата из-за снижения точности фиксации. Нестерильные протезные компоненты должны быть стерилизованы в автоклаве при температуре 132°C в течение 15 минут перед использованием. После паровой стерилизации, абатменты следует просушить в течение 15 минут перед использованием.

Условия хранения

Храните изделия в сухом месте при комнатной температуре. Берегите от воздействия прямых солнечных лучей.

Общие меры предосторожности

Хирургическая технология дентальной имплантации может осуществляться исключительно специалистами, т.к. представляет крайне сложную процедуру. Сертифицированное обучение – обязательное условие для проведения имплантационной хирургии.

Меры предосторожности

Определите особенности местной анатомии и пригодность имеющейся кости для установки имплантата, подготовьте имплантат с учетом возможных сопутствующих процессов и необходимых мер предосторожности. Визуальный осмотр, а также панорамные и периапикальные рентгенограммы необходимы для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, состояния пародонта и пригодности кости к осуществлению процедуры.

Меры предосторожности при проведении процедур (хирургия)

Операция по имплантации требует высокой точности и пристального внимания специалиста. Необходимо минимизировать повреждение клеточной ткани и уделять особое внимание температуре, избежанию хирургических травм, соблюдению мер по удалению источников загрязнения и инфекции.

Меры предосторожности при проведении процедур (протезирование)

Все рабочие инструменты должны содержаться в безупречном состоянии. Имплантационные конструкции, протезные конструкции и инструменты имеют небольшие размеры, в связи с чем необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить проглатывание и избежать риска асфиксии у пациента. Информация о системах имплантатов (TS, SS, US, KS) и информация о совместимости (Mini, Regular, Wide) абатмента и имплантата должна быть внимательно изучена перед использованием, чтобы предотвратить ослабление фиксации или повреждения, вызванные неверным закреплением. После фиксации абатмента на имплантате убедитесь в правильности фиксации с помощью рентгенографического изображения. Необходимо осуществить фиксацию с приложением крутящего момента значением, указанным на Tyvek-упаковке изделия.

Рекомендуется повторное затягивание фиксации (2-3 раза), чтобы предотвратить ослабление соединения. Чрезмерный крутящий момент при затягивании может привести к поломке винта. Угловой абатмент может сломаться из-за ограничений жесткости имплантата, в связи с чем использование их для протезирования задних зубов не рекомендуется. При изготовлении протеза важно правильно распределить нагрузку. В случае мостовидных протезов необходимо дополнительно обеспечить совместимость протеза и абатмента и провести окклюзионную корректировку. Мостовой протез избыточного размера может вызвать перелом имплантационной системы. Изготовление протеза с использованием керамического абатмента требует специальной техники, а специалист должен быть соответствующим образом обучен. Абатменты Port Abutment и Port Angled Abutment предназначены для съемных протезов, а не для реставрации зубов по отдельности.

Меры предосторожности для пациентов

Соблюдайте гигиену полости рта. Не оказывайте чрезмерного давления на зубы, пока не будет установлен последний необходимый протез.

Показания к применению

Система Osstem Implant была разработана для дентальной имплантации. Фиксация производится на альвеолярный отросток верхней или нижней челюсти с помощью хирургической операции по замене корня зуба. Вставленный имплантат может заменить утраченные зубы, соединив опорный штифт после остеоинтеграции с альвеолярной костью. Система имплантатов Osstem показана к применению при частичной или полной адентии нижней и верхней челюсти, для поддержки одиночных или множественных реставраций, в том числе: цементируемых ретенированных, винтовых или съемных протезов, а также постоянных или временных опор для несъемных мостовидных протезов. Предназначена для отсроченной установки протеза. Система абатментов предусмотрена для использования с дентальными имплантатами в качестве опоры для протезных реставраций, таких как коронки, мосты или съемные протезы.

Побочные эффекты

После операции могут возникнуть некоторые осложнения (утрата имплантатом стабильности, повреждение протеза и т.д.) Недостаточное качество и количество участка кости для имплантации, инфекции, аллергические реакции, неудовлетворительная гигиена полости рта, отсутствие должного участия пациента в обеспечении процесса имплантации, нежелательная подвижность имплантата, частичное ухудшение состояния тканей, а также неправильное положение или расположение имплантатов могут стать причиной проблем, упомянутых выше.

Противопоказания

Противопоказания включают, но не ограничиваются следующими состояниями:

- Гемофилия или осложнения, связанные с заживлением костной ткани или травм в целом
- Диабет в осложненной форме, алкоголизм и неумеренное табакокурение
- Ослабление иммунной системы в результате химио- или лучевой терапии

- Инфекции и воспаления ротовой полости (недостаточная забота о гигиене полости рта, бруксизм)
- Не поддающиеся коррекции нарушения прикуса/работы суставов, недостаточное пространство зубных дуг.
- Любые иные противопоказания к хирургическому вмешательству
- Аллергия и индивидуальная непереносимость к материалам изделий

Инструкция по применению - Английский / Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

Описание

Продукция Osstem Implant состоит из:

Классификация	Материалы
Абатмент	Титан, сплавы золота, полимерные материалы, сплавы кобальта и хрома, керамические материалы
Компоненты для протезирования	Полимерные материалы, титан, нержавеющая сталь, смола

Абатменты имплантатов Osstem и компоненты для протезирования совместимы только с имплантатами OSSTEM. Использование изделий в сочетании с продукцией других производителей может вызвать различные проблемы, в том числе ослабление фиксации и поломку изделий из-за недостаточной степени закрепления и проблем с совместимостью изделий. Обратитесь к инструкциям, каталогу Osstem или нашему веб-сайту (www.osstem.com) для получения более подробной информации. Коды продуктов, технические характеристики, даты изготовления и сроки годности – см. на этикетке продуктов.

Стерильность

Винты-заглушки и заживляющие абатменты стерилизуются гамма-излучением. Чтобы предотвратить загрязнение и инфицирование продукта или участка ткани оперируемого пациента, продукт должен использоваться с использованием стерильных инструментов в стерильной среде. Поврежденные продукты, продукты с вскрытой упаковкой или продукты с истекшим сроком годности использовать не допускается. Повторная стерилизация или повторное использование загрязненных изделий или изделий с истекшим сроком годности исключено; такие изделия необходимо утилизировать. Нестерильные протезные компоненты должны быть стерилизованы в автоклаве при температуре 132°C в течение 15 минут перед использованием. После паровой стерилизации, абатменты следует просушить в течение 15 минут перед использованием.

Условия хранения

Храните изделия в сухом месте при комнатной температуре. Берегите от воздействия прямых солнечных лучей.

Общие меры предосторожности

Хирургическая технология дентальной имплантации может осуществляться исключительно специалистами, т.к. представляет крайне сложную процедуру. Сертифицированное обучение – обязательное условие для проведения имплантационной хирургии.

Важно

Важно определить особенности местной анатомии и пригодность имеющейся кости для установки имплантата. Подготовьте имплантат с учетом возможных сопутствующих процессов и необходимых мер предосторожности. Визуальный осмотр, а также панорамные и периапикальные рентгенограммы посодействуют успеху имплантации и подбору правильного имплантата.

Меры предосторожности при проведении процедур (хирургия)

Операция по имплантации требует высокой точности и пристального внимания специалиста. Необходимо минимизировать повреждение клеточной ткани и уделять особое внимание температуре, избеганию хирургических травм, соблюдению мер по удалению источников загрязнения и инфекции.

Меры предосторожности при проведении процедур (протезирование)

Имплантационные конструкции, протезные конструкции и инструменты имеют небольшие размеры, в связи с чем необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить проглатывание и риск асфиксии у пациента. При изготовлении протеза важно правильно распределить нагрузку, а также обеспечить совместимость протеза и абатмента и провести окклюзионную коррекцию. Избегайте приложения чрезмерной силы в горизонтальном направлении, особенно при неотложной имплантации. Протезы, субструктура которых изготовлены из золотого сплава, должно использоваться надлежащим образом. Используйте протез после достаточного периода заживления. Абатменты Port Abutment и Port Angled Abutment предназначены для съемных протезов, а не для реставрации зубов по отдельности.

Меры предосторожности для пациентов

Соблюдайте гигиену полости рта. Не оказывайте чрезмерного давления на зубы, пока не будет установлен последний необходимый протез.

Предупреждение

Безопасное и эффективное использование имплантатов Osstem требует специальной подготовки, поскольку хирургические методы, используемые при имплантации зубов, весьма сложны. Пренебрежение недопустимыми для имплантации состояниями здоровья и необходимыми методами операции может привести к неудачной имплантации или потере кости, поддерживающей имплантат. Имплантаты Osstem не должны использоваться в целях, отличных от рекомендуемого использования. Имплантаты никогда не должны ремоделироваться. Если имплантат вступил в контакт с жидкостями организма пациента, его нельзя использовать для установки другим пациентам. Керамический абатмент требует специального подхода, которому должен быть отдельно обучен специалист. Имплантаты Osstem нельзя использовать в случае проявлений аллергии или повышенной чувствительности к материалам изделий.

Показания к применению

Система имплантатов Osstem была разработана для дентальной имплантации. Фиксация производится на альвеолярный отросток верхней или нижней челюсти с помощью хирургической операции по замене корня зуба. Вставленный имплантат может заменить утраченные зубы, соединив опорный штифт после остеоинтеграции с альвеолярной костью. Система имплантатов Osstem показана к применению при частичной или полной адентии нижней и верхней челюсти, для поддержки одиночных или множественных реставраций, в том числе: цементируемых ретенционных, винтовых или съемных протезов, а также постоянных или временных опор для несъемных мостовидных протезов. Предназначена для отсроченной установки протеза. Система абатментов предназначена для использования с дентальными имплантатами в качестве опоры для протезных реставраций, таких как коронки, мосты или съемные протезы.

Противопоказания

Противопоказания включают, но не ограничиваются следующими состояниями:

- Гемофилия или осложнения, связанные с заживлением костной ткани или травм в целом
- Диабет в осложненной форме, болезни тканей, осложняющие заживление ран и костной ткани, алкоголизм и неумеренное табакокурение
- Ослабление иммунной системы в результате химио- или лучевой терапии
- Инфекции и воспаления ротовой полости (недостаточная забота о гигиене полости рта, бруксизм)
- Не поддающиеся коррекции нарушения прикуса/ работы суставов, недостаточное пространство зубных дуг.
- Любые иные противопоказания к хирургическому вмешательству
- Аллергия и индивидуальная непереносимость к материалам изделий

Использование

Обратитесь к общей инструкции по имплантатам Osstem, каталогу Osstem и инструкции по протезированию.

Osstem Implant

Производитель: «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.)

66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea (Корея).

Тел.: 82-51-850-2500

Факс: 82-51-861-4693

	Простерилизовано радиацией
	Повторно использовать запрещено
	Предостережение! Ознакомиться с сопроводительными документами
	Номер по каталогу
	Код партии
	Использовать до
	Дата изготовления
	Не стерильно
	Не стерилизовать повторно
	Не использовать при повреждении упаковки

	Изготовитель
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
Rx only	Только для США: Федеральный закон разрешает продажу данного прибора только стоматологам или по их рецепту.

●사용자설명서 (2022. 05 버전 2.4) “일회용, 재사용 금지, 의료기기”

제품설명
OssBuilder는 비흡수성치주조직재생유도재로써, 구강 내에서 자가 골 결손이 발생한 부위에 골 이식을 시행하여 골 증대를 도와주는 맞춤형 티타늄 소재 비 흡수성 멤브레인입니다.
사용목적
OssBuilder는 비 흡수성 멤브레인으로써 임플란트에 연결하여 사용 하며, 치조골 결손 영역에 골 이식재를 보호하고 지지해주는 역할을 합니다.

사용방법

- 골 결손이 발생한 부위의 형상을 확인하고 골 증대에 필요한 1-wall, 2-wall, 3-wall, papilla, vertical 또는 horizontal augmentation 제품군을 선정합니다.
- Defect Gauge를 이용하여 골 결손 부위의 수직적, 수평적 결손량을 측정한 후 제품사양을 선정합니다.
- 임플란트가 깊이 식립된 경우 또는 연조직의 두께를 보상해야 되는 경우 OB Anchor의 사양을 선정한 후 임플란트에 체결합니다. 0.9 Hex Driver로 12~15Ncm로 torque를 인가합니다. 한편, OB Anchor는 이식재가 임플란트 내부로 들어가는 것을 방지하는 기능도 있습니다.
- 골 결손 부위에 골이식재를 필요한 양만큼 이식합니다.
- OssBuilder를 OB Anchor 위에 체결하고, 필요에 따라서 골 결손 부위의 형상에 적합하도록 OssBuilder를 bending 또는 trimming 하여 고정시킵니다.
- Healing Cap 또는 Cover Cap을 체결하여 OssBuilder를 고정 합니다. 체결은 5-8Ncm로 torque를 인가합니다. 단, Healing Cap은 0.9 Hex Driver로 체결하고, Cover Cap은 0.9 Hex Driver나 Cover Cap Driver를 이용하여 체결합니다.
- 최종적으로 시술 중 문제가 없었는지 확인한 후 봉합을 실시합니다.
- 일정 지기 이후 GBR(Guided Bone Regeneration)이 완료되면, Healing Cap 또는 Cover Cap을 제거하고 0.9 Hex Driver로 OB Anchor를 제거하면 OssBuilder가 같이 달려 나오게 됩니다. 이로써 OssBuilder를 이용한 GBR 시술은 끝나게 됩니다.
- 이후 임플란트 시술 과정은 일반적 임플란트 시술 방법에 따르면 됩니다.

보관조건

실온(1~30°C)의 건조한 곳에서 보관하시기 바랍니다. 직사광선을 피하시기 바랍니다.

일반적 주의사항

- 치과 임플란트의 외과적 기술은 전문적이고 복잡한 절차를 필요로 합니다. 임플란트 시술을 위해서는 관련된 정규 교육 및 훈련이 요구됩니다.
- 다음은 포함한 금기증 환자의 경우에는 시술을 피해야 합니다.
- 피가 응고되지 않거나 뼈 및 상처 치료의 장애가 있는 환자
 - 제어할 수 없는 당뇨병 환자, 과도한 흡연이나 알코올 중독자
 - 화학적요법과 방사선 치료로 인해 면역기능이 부족한 환자
 - 구강내 감염 또는 염증이 있는 환자(부적절한 구강위생 또는 이갈이)
 - 치료할 수 없는 고탈/관절 장애 그리고 불충분한 악궁 공간을 가진 환자
 - 기타 수술에 적합하지 않은 환자

금기증

- Contraindications include the following, but are not limited to:
- Patients with hemophilia or difficulties related to bone or wound treatment
 - Patients with uncontrollable diabetes, heavy smoke or alcoholic
 - Patients whose immunity system is inactive due to chemical therapy or radiation therapy
 - Patients with oral infection or inflammation (improper oral hygiene, bruxism)
 - Patients with untreatable occlusion/joint disorder, insufficient dental arch space
 - Any patient who is not suitable for an operation

Use

Refer to the general implant operation guide. For details, refer to the catalogue and prothesis manual.

FDA, HSA Only

The OssBuilder System has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. The OssBuilder System has not been tested for heating or migration in the MR environment.

- 환경에서 사용되어야 합니다. 만약, 포장이 파손되어있거나 유효기간이 지났다면 사용하지면 안 됩니다.
- GBR 용도 이외의 다른 용도로 사용하거나, 제품을 다른 용도로 변형하여 사용하지 말아야 합니다.
 - 시술 기구 등은 시술 전에 반드시autoclave에서 소독한 후 사용하시기 바랍니다. (온도: 132°C, 시간: 15분)
 - 소독 및 세척제로 사용되는 과산화수소는 laser marking, anodizing, color coding의 손상 또는 변색을 발생시킬 수 있으므로 사용을 금합니다.
 - 무리한 GBR은 멤브레인을 노출시키게 되고, 이는 외부 감염으로 인한 골 증대술의 실패를 초래하게 됩니다. 따라서, 술자, 환자 모두 최대한 노출이 발생되지 않도록 항상 주의해야 되며, 노출된 환자는 주기적 방문을 통해 관찰 또는 치료를 해야 됩니다.
 - 기타 - 자세한 내용은 카탈로그 및 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다.

경고

- 부적절한 환자의 선정과 시술은 골 증대술의 실패를 가져올 수 있습니다.
- 오스팀임플란트에서 규정하는 사용 목적 이외에는 어떠한 용도로도 사용되면 안 되며, 시술 이외의 용도로 개조되어 사용되면 안됩니다.
- 일회용 멸균 의료기기라서, 어떠한 경우에도 재 사용을 하면 안됩니다.

일반적 주의사항

치과 임플란트의 외과적 기술은 전문적이고 복잡한 절차를 필요로 합니다. 임플란트 시술을 위해서는 관련된 정규 교육 및 훈련이 요구됩니다.

- 다음은 포함한 금기증 환자의 경우에는 시술을 피해야 합니다.
- 피가 응고되지 않거나 뼈 및 상처 치료의 장애가 있는 환자
 - 제어할 수 없는 당뇨병 환자, 과도한 흡연이나 알코올 중독자
 - 화학적요법과 방사선 치료로 인해 면역기능이 부족한 환자
 - 구강내 감염 또는 염증이 있는 환자(부적절한 구강위생 또는 이갈이)
 - 치료할 수 없는 고탈/관절 장애 그리고 불충분한 악궁 공간을 가진 환자
 - 기타 수술에 적합하지 않은 환자

Contraindications include the following, but are not limited to:

- Patients with hemophilia or difficulties related to bone or wound treatment
- Patients with uncontrollable diabetes, heavy smoke or alcoholic
- Patients whose immunity system is inactive due to chemical therapy or radiation therapy
- Patients with oral infection or inflammation (improper oral hygiene, bruxism)
- Patients with untreatable occlusion/joint disorder, insufficient dental arch space
- Any patient who is not suitable for an operation

Use

Refer to the general implant operation guide. For details, refer to the catalogue and prothesis manual.

FDA, HSA Only

The OssBuilder System has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. The OssBuilder System has not been tested for heating or migration in the MR environment.

Instructions for Use (MAY, 2022, Ver. 2.4)- English

Description
OssBuilder System consists of OssBuilder (1wall augmentation, 2wall augmentation, 3wall augmentation and alveolar ridge augmentation), Healing Cap, Cover Cap and OB Anchor. The non-absorbable membrane that is made of titanium metal to stabilize and support of bone graft after bone transplantation of the area having autogenous bone deficiency in the oral cavity. OB Anchor is used for connecting with impacted tissue to prevent foreign material intrusion during the ossointegration and connecting with Healing Cap or Cover Cap on the top of the OB Anchor to fix the OssBuilder during the ossointegration. In case there is not enough soft tissue to closure, it is generally indicated to use Cover Cap is used for connecting with OB Anchor to fix the OssBuilder during the ossointegration.
Indications for use
OssBuilder System is a metal device intended to use with a dental implant to stabilize and support of bone graft in into-to-alveolar bony defect sites.
Instructions

- The configuration of the site with bone defects should be identified first, and then select the product group required 1-wall, 2-wall, 3-wall and alveolar ridge for bone augmentation.
- The product specifications selected after measuring the degree of vertical and horizontal defects of the bone with a Defect Gauge.
- When the implant is deeply implanted and the thickness of the soft tissue has to be restored, the OB Anchor specification should be selected first and then fixed to the implant. Tighten the torque to 12-15Ncm using a 0.9 Hex Driver. In addition, the OB Anchor has a function to prevent the graft material from entering the nose of the implant.
- Allogenic bone, xenogenic bone, synthetic bone, or autogenous bone is grafted as needed on the site with the bone defect.
- The OssBuilder is connected on the OB Anchor and fixed by bending the OssBuilder as needed to fit in the configuration of the site with the bone defect.
- Select the one of the Healing Cap or the Cover Cap. The Healing Cap is generally indicated to use when there is enough soft tissue to closure.
- The Healing Cap or the Cover Cap is connected to fix the OssBuilder. Tighten the torque of the connection to 5-8 Ncm. Connect the Healing Cap using a 0.9 Hex Driver and the Cap using a 0.9 Hex Driver or Cover Cap Driver. Finally, any problem during the operation should be checked before the start of the use.
- The GBR (Guided Bone Regeneration) is completed after about 3 to 6 months, open the flap and remove all the components of the OssBuilder System. Remove the Healing Cap or Cover Cap using the tool such as 0.9 Hex Driver, 0.9 Hex Driver or Cover Cap Driver, respectively. And then remove the OssBuilder. If connective tissue is formed between OssBuilder and soft tissue in the new bone site, surgeon can detach the connective tissue using the surgical tool such as Curette etc, and easily remove the OssBuilder. And finally, remove the OB Anchor using the 0.9 Hex Driver. With this the GBR operation using OssBuilder is finished. (All the components of the OssBuilder System should be removed after GBR is completed).
- Upon completion, the implant operation can follow the general operation procedures for an implant.

- Cautions for use**
- OssBuilder, OB Anchor, Healing Cap, and Cover Cap are disposable Sterilized Medical Devices which are sterilized by Gamma Irradiation, and should never be re-used in any cases. Sterilized products should be used with sterilized tools in a sterile environment. If the package is damaged or the product is at or over its expiration date it should not be used.
 - The product should not be used for any other purpose except for GBR use and should not be modified for any other uses.
 - Unsterilized prosthetic components and the tools should be wrapped and sterilized in a gravity displacement steam sterilizer at 132°C for at least 15 minutes and dried for 15 minutes before use. After the surgery, wash all tools used in the surgery in alcohol.
 - Do not use hydrogen peroxide for disinfecting or cleaning, otherwise, the Laser Marking, Anodizing, or Color Coding can be damaged or discolored.
 - Excessive GBR can expose the membrane and cause failure of bone augmentation due to external infection. Therefore, both operator and patient should always be careful to prevent the exposure as much as possible, and an exposed patient should be monitored and treated through regular visits.
 - Other - Detailed information is available from the catalogues and manuals.
 - The OssBuilder System is not indicated for permanent implantation.

Storage Condition

Keep the product in a dry place at room temperature. Keep away from direct sunlight.

General Precaution

The surgical technique of dental implants is a complex procedure and requires an expert. Formal training is required to perform implant surgery.

Contraindications

- Contraindications include the following, but are not limited to:
- Patients with hemophilia or difficulties related to bone or wound treatment
 - Patients with uncontrollable diabetes, heavy smoke or alcoholic
 - Patients whose immunity system is inactive due to chemical therapy or radiation therapy
 - Patients with oral infection or inflammation (improper oral hygiene, bruxism)
 - Patients with untreatable occlusion/joint disorder, insufficient dental arch space
 - Any patient who is not suitable for an operation

Use

Refer to the general implant operation guide. For details, refer to the catalogue and prothesis manual.

FDA, HSA Only

The OssBuilder System has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. The OssBuilder System has not been tested for heating or migration in the MR environment.

Gebrauchsanweisungen (MAY, 2022, Ver. 2.4)- Deutsch

Produktdescription
Die OssBuilder, ein für die Regeneration des Parodontalgewebes eingesetztes Material, ist eine membran beschichtete, nicht resorbierbare Membran aus Titan, die den Knochenbau durch das Einsetzen von Knochenspan an der intraoralen Seite mit dem autogenen Knochendefekt unterstützt.
Hinweise
OssBuilder ist eine nicht-resorbierbare Membran, die benutzt werden kann, um das Implantat zur Unterstützung und zum Schutz von Knochentransplantmaterial in dem defekten Bereich des Alveolar-Knochens zu verbinden.
Anleitung

- Die Konfiguration der Stelle des Knochendefekts wird zunächst identifiziert; Wand-1, Wand-2, Wand-3, Papille, dann wird die vertikale oder horizontale Augmentationsproduktgruppe für die Knochenaugmentation ausgewählt.
- Die Produkte werden nach der erzielten Messung der vertikalen und horizontalen Mängel des Knochendefekts mithilfe eines Fehlerschemas ausgewählt.
- Wenn ein Implantat tief eingebaut ist oder erst das Weichgewebe wiederhergestellt werden muss, sollte die Spitze als erstes ausgerichtet und anschließend an das Implantat fixiert werden. Ziehen Sie das Drehmoment auf 12-15Ncm mit einem 0.9 Hexschlüssel fest. Darüber hinaus sollte die Spitze das Transplantat vom von tiefen Eindringen in das Innere eines Implantats abhalten.
- Das Knochentransplantatmaterial wird wie benötigt auf den Knochendefekt transplantiert.
- Die OssBuilder ist an der Spitze angebracht und wird nach Bedarf durch Biegen oder Timmen so fixiert, dass sie in die Stelle mit dem Knochendefekt verpasst.
- Die Heilungskappe oder die Abdeckkappe ist verbunden, um den OssBuilder zu fixieren. Ziehen Sie den Drehmoment bis auf 5-8Ncm, um eine Verbindung herzustellen. Beachten Sie jedoch, dass die Heilungskappe einen 0.9 Hex Handschraubendreher benutzt und die Abdeckkappe einen 0.9 Hex Handschraubendreher oder einen Verschlussapparatzeher.
- Schließlich sollte jedes Problem, das während der Operation auftaucht, noch vor dem Verlassen behoben werden.
- Sobald die gesteuerte Knochenregeneration (GBR) nach einer gewissen Zeit abgeschlossen werden die Einheilplatte, die Krone und die OssBuilder entfernt, sobald die Spitze mit dem 0.9 Hexschlüssel abgegraben ist. Damit ist die GBR-Operation mit der OssBuilder beendet.
- Am Ende können allgemeine Abfälle für Implantationen befolgt werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

- Die OssBuilder, die Spitze, der Einheilkörper und die Abdeckkappe sind medizinische sterile Einweggeräte, die durch Gammastrahlung sterilisiert werden und sollten in keinem Fall wieder verwendet werden. Sterilisierte Produkte sollten nur mit sterilisierten Instrumenten in steriler Umgebung verwendet werden. Das Produkt sollte bei beschädigter Verpackung oder abgelaufenem Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke außer für GBR verwendet werden und sollte auch nicht anderweitig modifiziert werden.
- Bei den Produkten handelt es sich um medizinische Geräte, aus diesem Grund, müssen diese vor ihrem Gebrauch in einem Autoclave bei 132°C für mindestens 15 Minuten sterilisiert werden.
- Benutzen Sie zur Sterilisation oder Reinigung kein Wasserstoffperoxid, sonst kann die Laser Marking, Anodizing, oder color coding beschädigt oder verliert werden.
- Übermäßige GBR kann die Membran beschädigen und zu Austreten im Knochenbau durch äußere Infektionen führen. Daher sollen sowohl der Chirurg als auch der Patient immer vorsichtig sein, um die Belastung so weit wie möglich zu verhindern, behandelte Patienten sollten durch regelmäßige Besuche überwacht und behandelt werden.
- Sonstige detaillierte Informationen können den Katalogen und Handbüchern entnommen werden.

Warnung

- Unangemessene Patientenauswahl und Operation kann zum Versagen der Knochen-Augmentation führen.
- Das Produkt sollte für keine anderen Zwecke als die von OSTEM IMPLANT angegebenen benutzt werden. Nicht sollte es für andere Zwecke neuinstalliert werden, außer für Operationen.
- Es ist ein wegwerfbares, sterilisiertes medizinisches Gerät und sollte niemals erneut benutzt werden.

Lagerbedingungen

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur(1~30°C). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Die operative Techniken der dentalen Implantanten bedarf eines fachlichen und komplexen Verfahrens. Eine entsprechende Ausbildung ist notwendig für die Nutzung von Implantationsgeräten.

Gegenanzeigen

Gegenanzeigen können unter anderem folgende sein, ohne weitere ausschließen zu können:

- Patienten mit H.mophilie oder Problemen der Knochen- oder Wundheilung
- Patienten mit unkontrollierbarem Diabetes, erstem Nierenerkrankung oder Alkoholiker
- Patienten, deren Immunsystem aufgrund einer Chemio- oder Strahlentherapie geschwächt ist
- Patienten mit unheilbaren Infektionen oder Entzündungen (mangelnde Mundhygiene, Bruxismus)
- Patienten mit unbehandelten Okklusions-/Gelenkerkrankungen, ungenügendem Kieferknochen
- Jeder Patient, der inoperabel ist

Instrucciones de uso (MAY, 2022, Ver. 2.4)- Español

Descripción del producto
OssBuilder es un material inductor de regeneración de tejidos periodontales; se trata de una membrana personalizada hecha de titanio que ayuda al aumento del hueso realizando un injerto óseo en el sitio intraoral con defectos óseos autoógenos.
Indicación
OssBuilder es una membrana no absorbible que puede usarse mediante la conexión a l implante para el soporte y protección del material de tejido óseo en el área con defecto óseo alveolar.
Instrucciones

- Primero se identifica la configuración del lugar con defecto óseo: 1-pared, 2-pared, 3-pared; entonces se selecciona el grupo de productos para aumento de Papila, Vertical u Horizontal.
- Las especificaciones del producto se seleccionan después de la medición de los grados de defectos verticales y horizontales de los huesos defectados, mediante la utilización de la Galga de Deflectación.
- Quando se coloca profundamente un implante o tiene que restaurarse el espesor de los tejidos blandos, deben seleccionarse primero las especificaciones de Alura y después fijarse al implante. Aplique de un par de apriete de 12-15 N.cm utilizando un impulsor hexagonal de 0.9. Además, la Alura tiene una función para evitar que el material de injerto se introduzca en un implante.
- El material de tejido óseo se injerta según sea necesario en el sitio del defecto óseo.
- El OssBuilder se conecta a la Alura y se fija doblando o recordando según sea necesario para ajustarlo a la configuración del sitio con defectos óseos.
- Se conecta el Casquillo de Cizallización o la Tapa de Cubierta para fijar la OssBuilder. Aplíete con un par de 5-8 N.cm para su conexión. No obstante, tenga presente que la Cizallización se conecta utilizando un impulsor hexagonal 0.9 y la Cubierta usando un impulsor hexagonal o un impulsor de tapa de 0.9.
- Por último, si existe algún problema durante la operación, debe corregirse antes de la sutura.
- Quando se termina la GBR (regeneración ósea guiada) después de un cierto período de tiempo, se retiran la Cizallización o la Cubierta y se retira también el el refirar la Alura mediante el impulsor hexagonal 0.9. Con esto se termina la operación de GBR utilizando la OssBuilder.
- Después de esto, la operación de implante puede seguir los procedimientos generales de operaciones de implantes.

Precauciones en el uso

- La OssBuilder, la Alura, el Casquillo de Cizallización y la Tapa de Cubierta son dispositivos médicos esterilizados desechables que se esterilizan mediante radiaciones gamma y en ningún caso deben reutilizarse. Los productos esterilizados deben utilizarse con instrumentos esterilizados en ambientes estériles. Si el embalaje está dañado o se ha superado la fecha de caducidad, el producto no debe utilizarse.
- El producto no debe utilizarse para ningún propósito que no sea el empleo en GBR y no debe modificarse para usarlo en ningún otro producto.
- Los productos son dispositivos médicos, por lo tanto, deben esterizarse en un Autoclave a 132°C durante al menos 15 minutos antes del uso.
- No use período de hidrógeno para la esterilización ni la limpieza, de lo contrario, las Marcas por Láser, el Anodizado o la Codificación de Color pueden dañarse o decolorarse.
- Un GBR excesivo puede exponer la membrana y causar fallas en el aumento óseo debido a infecciones internas. Por lo tanto, tanto el operador como el paciente deben ser siempre cuidadosos para evitar en todo lo posible la exposición; un paciente expuesto debe ser monitoreado y tratado a través de visitas regulares.
- Otros: en catálogos y manuales puede estar disponible información más detallada.

Advertencia

- La selección del paciente y la operación inapropiadas pueden conducir a fallas en el aumento óseo.
- El producto no debe usarse para propósitos que no sean los indicados por OSTEM IMPLANT. Tampoco debe remediarse para otros usos que no sean una operación de implante.
- Se trata de un dispositivo médico esterilizado y para un uso único, por lo que nunca debe reutilizarse.

Almacenamiento

Mantenga el producto en un lugar seco a temperatura ambiente(1~30°C). Evite la exposición directa al sol.

Precauciones generales

La tecnología quirúrgica del implante dental implica un procedimiento experto y complejo, lo que requiere una formación específica y profesional.

Contraindicaciones

- Las contraindicaciones incluyen, entre otras, las siguientes:
- Pacientes con hemofilia o dificultades relacionadas con tratamientos de huesos o heridas
 - Pacientes con diabetes descontrolada, fumadores empedidos o alcohólicos
 - Pacientes cuyo sistema inmune está inactivo debido a quimioterapia o radioterapia
 - Pacientes con infección o inflamación oral (higiene oral inadecuada, bruxismo)
 - Pacientes con oclusión/trastorno de la articulación no tratable, espacio del arco dental insuficiente
 - Cualquier paciente que no pueda someterse a una operación

Bruksanvisning (MAY, 2022, Ver. 2.4)- Svenska

Produktskrivning
OssBuilder, ett parodontalt vävnadsregenererande inducerande material, är ett anpassat titantillverkad, icke-resorberbart membran som hjälper benuppbyggnad genom att utföra benimplantat på intraoral plats med autogen ben defekt.
Indikation
OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett parodontalt vävnadsregenererande inducerande material, är ett anpassat titantillverkad, icke-resorberbart membran som hjälper benuppbyggnad genom att utföra benimplantat på intraoral plats med autogen ben defekt.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

OssBuilder är ett icke resorberbart membran som kan användas genom att ansluta till implantatet för stöd och skydd av benimplantat material i det alveolära bendefekt området.

Mode d'emploi (MAY. 2022, Ver. 2.4) - Français

Description du produit.
Le OsBuilder, un dispositif facilitant la régénération des tissus périodontaux, est une membrane en titane non résorbable qui favorise l'augmentation du volume osseux suite à une greffe osseuse autogène sur la zone intra-buccale alvéolaire.
Remarque
Le OsBuilder est une membrane non résorbable. Relais à l'implant, il sert à soutenir et à protéger le greffon osseux dans la zone adhésive de l'os alvéolaire.

Instructions

1. Identifier d'abord la configuration de la zone osseuse alvéolaire. Ensuite, sélectionnez le groupe de produit le plus adapté à l'augmentation osseuse : 1., 2. ou 3 parois, présence de papilles, augmentation verticale ou horizontale, etc. Sélectionnez les caractéristiques du produit en fonction des degrés d'insuffisance horizontale et verticale de l'os déficiente à l'aide d'un appareil de mesure des volumes osseux.

3. Pour installer un implant très profondément ou lorsque l'épaisseur des tissus mous doit être restaurée, définissez d'abord les caractéristiques de la dent provisoire avant de la fixer sur l'implant. Serrez les deux éléments à un couple de 12 à 15 Nm avec un tournevis dynamométrique 0.9. La dent provisoire sert notamment à empêcher le greffon de pénétrer à l'intérieur de l'implant.

4. Greffez le greffon osseux sur la zone osseuse alvéolaire, en fonction des particularités de chaque situation.

5. Reliez le OsBuilder à l'implant, puis replez-le ou découpez-le pour qu'il s'adapte parfaitement à la configuration de la zone osseuse alvéolaire.

6. Posez une coiffe de guérison ou une couronne prothétique pour fixer le OsBuilder. Serrez le raccord à un couple de 5 à 8 Ncm. Veuillez noter cependant que la coiffe de guérison est fixée à l'aide d'un tournevis dynamométrique 0.9 alors que la couronne est fixée à l'aide d'un tournevis dynamométrique 0.9 ou d'un outil de pose de couronne.

Enfin, veuillez résoudre tout problème éventuel rencontré pendant l'opération avant la suture.

Laissez s'écouler un certain temps après la GBR (régénération osseuse guidée) puis retirez la coiffe de guérison ou la couronne. Reliez le OsBuilder en même temps que la prothèse à l'aide d'un tournevis dynamométrique 0.9. Cet acte conduit l'opération de GBR avec le OsBuilder.

1. Installation de l'implant peut ensuite suivre les procédures classiques.

Précisions d'utilisation

1. Le OsBuilder, la prothèse, la coiffe de guérison et la couronne prothétique sont du matériel médical. Ils sont stérilisés par irradiation gamma et ne doivent en aucun cas être réutilisés. Les éléments stérilisés doivent être manipulés à l'aide d'instruments stériles, dans un environnement stérile. N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé ou si la date d'expiration est dépassée.

2. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que les opérations de GBR. Ne le modifiez pas pour répondre à d'autres utilisations.

3. Les produits sont partie du matériel médical. En tant que tels, ils doivent être stériles dans un Autoclave à 132°C pendant au moins 15 minutes avant toute utilisation.

4. N'utilisez pas de peroxyde d'hydrogène pour stériliser ou nettoyer le matériel, cela risque d'endommager ou de décolorer le marquage au laser, l'annotation ou le code couleur.

5. Une opération de GBR excessive risque d'exposer la membrane et d'entraîner un échec de l'augmentation osseuse suite à une infection externe. Pour cette raison, le chirurgien et le patient doivent s'attacher en permanence à éviter l'exposition de la zone, dans la mesure du possible. Un patient exposé doit être surveillé et soigné lors de visites régulières. (Autres : des informations détaillées sont disponibles dans les catalogues et les manuels.

Avertissements

• Une mauvaise sélection du patient et de l'opération nécessaire peuvent entraîner l'échec de l'augmentation osseuse.

• Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que les usages indiqués par OSSTEM IMPLANT. Il ne doit pas non plus être modifié pour servir à des fins autres qu'une opération.

• Il s'agit d'un instrument médical stérile et jetable. Il ne doit en aucun cas être réutilisé.

Condition de d'entreposage

Gardez le produit dans un endroit sec à température ambiante(-30°C). Tenir loin de la lumière directe du soleil.

Précautions générales

La technologie chirurgicale de l'implant dentaire implique un expert, et une procédure complexe. Une solide formation est nécessaire pour effectuer des chirurgies de pose d'implants.

Contre-indications

Les contre-indications sont les suivantes, mais ne sont pas limités à :

• Les patients atteints d'hémophilie ou de difficultés liées à l'usage ou le traitement des plaies

• Les patients atteints de diabètes incontrôlables, les gros fumeurs ou les alcooliques

• Les patients dont le système immunitaire est affaibli en raison de thérapie chimiques ou thérapie radiothérapie

• Les patients avec une infection ou une inflammation buccale (mauvaise hygiène bucco-dentaire, bruxisme)

• Les patients présentant une occlusion incurable / trouble de l'articulation, l'espace d'arcade dentaire insuffisant

• Tout patient qui n'est pas apte à une opération

Instruções de Utilização (MAY. 2022, Ver. 2.4) - Português

Descrição do produto
A OsBuilder, sendo um material que induz a regeneração de tecidos periodontais, é uma membrana não absorvível, personalizável, feita de titânio que auxilia o aumento ósseo pela realização de enxerto ósseo no sítio intra-oral com defeito ósseo autólogo.
Indicação
A OsBuilder é uma membrana não absorvível que pode ser utilizada sozinha ou ligada ao implante para suporte e proteção do material de enxerto ósseo na área com defeito ósseo alveolar.

Instruções

1. A configuração do local com defeito é identificada em primeiro lugar: 1-parade, 2-parade, 3-parade, Papila, o grupo de Produtos para aumento Vertical ou Horizontal é então selecionado para o aumento ósseo.

2. As especificações do produto são selecionadas após se terem medido os graus de defeito vertical e horizontal do defeito ósseo utilizando uma sonda periodontal (Defect Gauge).

3. Quando um implante se encontra profundamente implantado ou a espessura dos tecidos tem de ser restaurada, seleciona-se em primeiro lugar as especificações do pilar (GB Anchor) e só depois se fixa ao implante. Aperte com um torque de 12-15Nm por meio de chave sextavada 0.9. Além disso, o pilar tem a função de prevenir que o material do enxerto entre no interior de um implante.

4. O material para o enxerto ósseo é implantado consoante necessário no sítio com defeito ósseo.

5. A OsBuilder é conectada no pilar e fixada, ajustando ou desbastando a OsBuilder conforme seja necessário para se obter a configuração do local com defeito ósseo.

6. O Cicatrizador ou Protetor é conectado para se fixar na OsBuilder. Aperte com um torque de 5-8 Nm para fixá-la. Tenha atenção, no entanto, que o Cicatrizador está fixado com a ajuda de uma chave sextavada de 0.9 e o Protetor através de uma chave sextavada de 0.9 ou de uma chave de Protetor.

7. Finalmente, deve verificar-se a existência de qualquer problema antes de se pôr a suture.

8. Após uma certa período de tempo a regeneração óssea guiada (GBR – Guided Bone Regeneration) está completa, o cicatrizador ou protetor é removido sendo a OsBuilder também removida quando o pilar é removido por uma chave sextavada 0.9. Desta forma, fica concluída a operação RGO (Regeneração Óssea Guiada) utilizando a OsBuilder.

9. De seguida, a operação de implante pode seguir os procedimentos gerais de operação para implantes.

Cuidado na utilização

1. A OsBuilder, o pilar, o pilar de cicatrização e o parafuso protetor são acessórios médicos esterilizados descartáveis que são esterilizados por radiação gama, e não devem ser reutilizados em nenhuma circunstância. Os produtos esterilizados devem ser utilizados com ferimentos esterilizados em ambiente esterilizado. Se a embalagem estiver danificada ou a data de validade estiver ultrapassada, o produto não deverá ser utilizado.

2. O produto não deverá ser utilizado para nenhum fim que não seja uma Regeneração Óssea Guiada (RGO) e não deverá ser modificado para nenhuma outra utilização.

3. Os produtos são dispositivos médicos; por isso, necessitam de ser esterilizados em Autoclave a 132°C pelo menos durante 15 minutos antes de serem utilizados.

4. Não utilize água oxigenada para esterilização e limpa, caso contrário, a Laser Marking, Anodizing, ou color coding podem ser danificados ou descoloridos.

5. Uma RGO excessiva pode expor a membrana e causar incapacidade de aumento ósseo devido a infecção externa. Portanto, tanto o operador como o paciente devem estar sempre atentos para prevenir a exposição o mais possível, e um paciente exposto deve ser monitorado e tratado através de visitas regulares.

6. Outro – Existem informações detalhadas nos catálogos e manuais.

Aviso

• A seleção e tratamento impróprio do paciente podem levar à falha do enxerto ósseo.

• O produto não deve ser utilizado com nenhum outro produto que não o indicado pela OSSTEM IMPLANT. Não deve ser modificado para outro uso, exceto a operação.

• É um dispositivo médico descartável, esterilizado e nunca poderá ser reutilizado.

Condição de armazenamento

Guarde o produto em local seco e à temperatura ambiente(-30°C). Evite a luz solar direta.

Precauções gerais

A tecnologia cirúrgica de implante dentário envolve um processo especializado complexo. O treino formal é necessário para realizar cirurgias de implante.

Contra-indicações

As contra-indicações incluem, mas não estão limitadas a :

• Pacientes com hemofilia ou dificuldades relacionadas com tratamento do osso alveolar

• Pacientes com diabetes incontroável, grandes fumadores ou alcoólicos

• Pacientes em que o sistema imunitário se encontra inativo devido à terapia química ou radioterapia

• Pacientes com infecção ou inflamação oral (higiene oral inadequada, bruxismo)

• Pacientes com occlusão intrínseca/desordem comum, insuficiente espaço arco

• Qualquer paciente que não é adequado para a cirurgia

Istruzioni per l'uso (MAY. 2022, Ver. 2.4) - Italiano

Descrizione del prodotto.
OsBuilder, un materiale che induce la rigenerazione del tessuto periodontale, è una membrana personalizzata non assorbibile realizzata in titanio che assiste l'assorbimento osseo eseguendo un innesto osseo sul sito intraorale con osso autologo.
Indicazione
OsBuilder è una membrana non assorbibile che può essere utilizzata in connessione all'implante per il sostegno e la protezione del materiale di innesto osseo nella zona alveolare con difetto osseo.

Istruzioni

1. La configurazione del sito con difetto osseo viene identificata prima: il gruppo di prodotti per l'aumento 1-pariete, 2-pariete, 3-pariet, papilla, verticale o orizzontale viene selezionato di conseguenza per l'aumento osseo.

2. Le specifiche del prodotto vengono selezionate dopo aver misurato il grado verticale e orizzontale dei difetti dell'osso avanzato utilizzando un gauge di difetto.

3. Quando un impianto è implantato in profondità oppure lo spessore del tessuto molle deve essere reintegrato, le specifiche dell'altezza dovrebbero essere selezionate per prima e poi fissate sull'impianto.

Stringere la torxione a 12-15Nm con utilizzando una chiave esagonale 0.9. In aggiunta l'altezza ha una funzione che impedisce al materiale innestato di entrare all'interno di un impianto.

4. Il materiale di innesto osseo viene innestato come necessario nel sito con difetto osseo.

5. OsBuilder viene connesso sull'altezza e fissato seguendo o tranciando OsBuilder a seconda delle necessità, in modo che si adatti alla configurazione del sito con avverta osseo.

6. Il cappuccio di copertura o cappuccio di copertura viene collegato per fissare OsBuilder. Seriare applicando una coppia di 5-8Nm per effettuare la connessione. Si noti, tuttavia, che il cappuccio di guarnigione viene collegato utilizzando un cacciavite esagonale da 0.9 e il cappuccio di copertura viene collegato utilizzando un cacciavite esagonale da 0.9 o un cacciavite per cappuccio.

7. Infine, qualsiasi problema nel corso dell'operazione dovrebbe essere controllato prima della satura.

8. Dopo un certo periodo di tempo la rigenerazione guidata dell'osso è completata, dopo un certo periodo di tempo si rimuove il pilastro o la copertura, così come OsBuilder.

9. Quindi si rimuove l'altezza usando una chiave esagonale da 0.9. Con questo si completa l'operazione di RGO utilizzando OsBuilder.

9. In seguito a ciò, l'operazione di impianto può seguire le procedure operative per l'impianto.

Fare attenzione durante l'uso

1. OsBuilder, versione, formatore di guarnigione e copertura sono dispositivi medici sterilizzati a perdere, i quali vengono sterilizzati tramite radiazioni gamma e non dovrebbero mai essere riutilizzati in nessun caso. I prodotti sterilizzati dovrebbero essere usati con degli strumenti sterilizzati in un ambiente sterilizzato. Se la confezione è danneggiata oppure la data di scadenza è stata superata, il prodotto non dovrebbe essere utilizzato.

2. Il prodotto non dovrebbe essere usato per scopi diversi dall'RGO e non dovrebbe essere modificato per altri usi.

3. I prodotti sono dispositivi medici; di conseguenza, vanno sterilizzati in Autoclave a 132°C per almeno 15 minuti prima dell'uso.

4. Non utilizzare perossido d'idrogeno per la sterilizzazione o la pulizia, in caso contrario si possono verificare danneggiamenti, scolorimenti od ossidazione del trattamento laser e delle bande di codifica a colori.

5. Una RGO eccessiva può esporre la membrana e provocare l'insuccesso dell'aumento osseo a causa di una infezione esterna. Di conseguenza sia l'operatore che il paziente dovrebbero sempre fare attenzione a evitare l'esposizione, e il paziente esposto dovrebbe essere controllato e trattato attraverso visite regolari.

6. Altro - informazioni dettagliate sono disponibili su cataloghi e manuali.

Attenzione

• Una selezione del paziente e una procedura non appropriata possono comportare l'insuccesso dell'aumento osseo.

• Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati da OSSTEM IMPLANT. Non deve essere modificato per usi diversi da quelli previsti.

• È un dispositivo medico sterile e monouso che non deve essere riutilizzato.

Conservazione

Tenere il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente(-30°C). Tenere al riparo dalla luce diretta del sole.

Precauzioni generali

La chirurgia impiantare deve essere eseguita solamente da personale specificamente addestrato.

Controindicazioni

Le controindicazioni includono (senza limitazione):

• Pazienti affetti da emofilia o a patologia relativa al trattamento di osso a ferite

• Pazienti affetti da diabete non controllabile, fumatori accaniti o alcolici

• Pazienti il cui sistema immunitario non è attivo a causa di chemioterapia o radioterapia

• Pazienti che mostrano infezione o infiammazioni orali (igiene orale non corretta, bruxismo)

• Pazienti con occlusione/disordine orali non trattabili, spazio insufficiente dell'arco dentario

• Pazienti che non possono essere sottoposti a procedura chirurgica

Инструкция (MAY. 2022, Ver. 2.4) - Русский

Описание продукции.
OsBuilder материал для стимуляции регенерации периодонта, является изготавливаемой на заказ титановой нерассасывающейся мембраной, которая способствует augmentation костной ткани путем выполнения пересадки кости на интраоральную сторону с дефектом костного интрагнативного
Показания
OsBuilder является односторонней мембраной, которая может использоваться при соединении с имплантатом для поддержки и защиты материала костного трансплантата в области дефекта альвеолярного отростка.

Инструкции

1. Выявление определяется конфигурации места костного дефекта; затем для наращивания кости выбирается группа наращивания 1-стенки, 2-стенки, 3-стенки, бортика, вертикальной или горизонтальной наращивания.

2. Спецификация продукции выбирается после измерения степени вертикальных и горизонтальных дефектов поврежденной костной ткани с помощью детектора дефектов.

3. Если имплантат имплантирован глубоко или если необходимо сохранить тонкую ткань тканей, сначала должны быть выбраны спецификации верхнего, а затем их должна быть выполнена фиксация к имплантату. Затяните боковой штифт протезного бруса зубом до 12-15Hcm, используя 0.9 шестигранный инструмент. Кроме того, верхняя метка функции штифта материала трансплантата от трюммирования внутри имплантата.

4. Материал костного имплантата при необходимости имплантируется в место костного дефекта.

5. OsBuilder соединяется с верхней и высверливается путем штифта или зажимы OsBuilder до стены, необходимой для соотнесения конфигурации стороны с дефектом костной ткани.

6. Формирователь десны или колпачок подгоняются для фиксации OsBuilder. Точно выполните соединение, затяните боковой штифт протезного бруса зубом с моментом затяжки 5-8 Н*см. Обратите внимание, что формирователь соединяется при помощи шестигранной отвертки 0.9, а колпачок – шестигранной отверткой 0.9 или отверткой для колпачка.

7. Осуществлять любую работу во время работы должна быть проверена до сшивания.

8. Если GBR (направленная регенерация костной ткани) завершена по истечению определенного периода времени, формирователь или крышка удаляются, а также удаляется OsBuilder, если крышка удаляется с помощью 0.9 шестигранной отвертки. На этом операция по GBR с использованием OsBuilder завершается.

9. После этой операции по имплантации может сопровождаться программой общей операции для имплантата.

Осторожность при использовании

1. OsBuilder, версия, формирователь десневой манжеты и крышка являются одоразовыми стерильными медицинскими устройствами, которые стерилизуются с помощью гамма-излучения и не в коем случае не должны использоваться повторно. Стерильные изделия должны использоваться со стерильными инструментами в стерильной среде. Если упаковка повреждена или истек срок годности, продукция не следует использовать.

2. Продукты не должны использоваться для каких-либо других целей, кроме их применения.

3. Продукты являются медицинскими изделиями, поэтому перед употреблением их необходимо стерилизовать в Autoclave при температуре 132 °C в течение не менее 15 минут.

4. Не используйте перекись водорода для стерилизации или очистки, в противном случае возможно повреждение или изменение цвета Laser Marking или color coding а также возможно Anodizing.

5. Излишний GBR может открыть мембрану и вызвать невозможность augmentation костной ткани из-за внешней инфекции. Следовательно, как оператор, так и пациент должны всегда соблюдать осторожность для того, чтобы предотвратить раскрытие, насколько возможно, и пациент с раскрытием должен находиться под наблюдением и проходить курс лечения в процессе регулярных посещений.

6. Прочие – Подробную информацию можно найти в каталогах и руководствах по эксплуатации.

Предупреждение

• Неправильный выбор пациента и выбор операции могут привести к неудачной augmentation кости.

• Продукт не должен использоваться в целях, не указанных OSSTEM IMPLANT. Он также не должен быть модифицирован для других целей за исключением операции.

• Это является одоразовым, стерилизованным медицинским устройством и никогда не должно использоваться повторно.

Условия хранения

Продукты необходимо хранить в сухом месте при комнатной температуре(-30°C). Защищать от прямого солнечного света.

Особые меры предосторожности

Хирургическая технология зубных имплантов представляет собой сложную процедуру, требующую высочайшей квалификации. Выполнение операции имплантации требует официальной подготовки.

Противопоказания

Противопоказания, в числе прочего, могут включать следующие:

• Пациент страдает гемофилией или ему трудно заживать ранки и кровотечения

• Пациент страдает диабетом, не поддающимся контролю, заподозрен или инфицирован

• Иммуная система пациента ослаблена в результате химиотерапии или лучевой терапии

• Пациент страдает инфекцией ротовой полости или воспалением (какой-либо уровень гигиены ротовой полости, бруксизм).

Használati utasítás (MAY. 2022, Ver. 2.4) - Magyar

Termékleírás
A OsBuilder, mint a parodontális szövetregeneráció elősegítő anyag, egy olyan tárból készül nem felszívódó membrán, amely úgy segíti elő a csontépítést, hogy az autogén csontbóval rendezhető intraorális területen védi a csontbóval.
Javallat
A OsBuilder egy olyan nem felszívódó membrán, amely az implantátumhoz csatlakoztatva az alveoláris csontbó területén alkalmazható és védi a csontbóval anyagot.

Alkalmazások

1. Először a csontbó terület konfigurációját kell beazonosítani; majd a csontépítésre a következő termékcsoportok közül lehet választani: 1-fal, 2-fal, 3-fal, papilla, függőleges- vagy vízszintes csontépítő termékcsoportok.

2. A termék műszaki adatait azután lehet meghatározni, miután a hiábarmé segítségével megmérték a hibás csont függőleges- és vízszintes hibát.

3. Ha egy implantátum mélyen van, vagy helyre kell állítani a ligazsövetek vastagságát, akkor először a magasság adatait kell kiválasztani, majd az implantátumhoz rögzíteni. 0.9-es hexagonális kulccsal való meghúzás esetén a nyomóerőt 12-15 Ncm.

4. A termék műszaki adatait azután lehet meghatározni, miután a hiábarmé segítségével megmérték a hibás csont függőleges- és vízszintes hibát.

5. Ha a csontbó területen mélyen van, vagy helyre kell állítani a ligazsövetek vastagságát, akkor először a magasság adatait kell kiválasztani, majd az implantátumhoz rögzíteni. 0.9-es hexagonális kulccsal való meghúzás esetén a nyomóerőt 12-15 Ncm.

6. A termék műszaki adatait azután lehet meghatározni, miután a hiábarmé segítségével megmérték a hibás csont függőleges- és vízszintes hibát.

7. A végén, a munka elvégzése előtt, a mőtől során felmerülő problémákat ellenőrizni kell.

8. Ha a GBR (irányított csontregeneráció) egy adott idő eltelét követően, a gyógyvázat egy zárolással, majd a OsBuilder és a magasságát is e kell távolítani egy 0.9-es hexagonális kulccsal. Ezzel a OsBuilder segítségével elősegíti GBR (irányított csontregeneráció) befejeződését.

9. Ezután követ az implantáció az általános implantációs műtét folyamatokat.

Vigyázat!

1. A OsBuilder, a magasság, a gyógyvázat és a zárolásop egy ellen előbózt sterilizáció orvosi eszközök, amelyeket deszenyázzással sterilizáltak, és semmilyen esetben nem használhatók újra. A sterilizált termékeket stéril csomagolásban és környezetben szabad csak használni. Ha a csomagolás megsérült vagy a termék lejárt dátumú, azokat ki kell távolítani.

2. A termékét tilos az irányított csontregeneráció kiülv másra használni, és más célokra is tilos átalakítani.

3. A termékek orvosi eszközök; ezért használat előtt autoklavban kell sterilizálni 132°C-on, legalább 15 percig.

4. A sterilizálókhoz vagy tisztáltközökön hidrogén-peroxidot használni, nem sérülhet vagy elszennedhet rajtuk a kezelőfelület, az eloxálás vagy a színelőz.

5. Ha a H2O2 hosszú ideig tartó GBR által a membránra, és a külső fertőzés veszélye miatt sikertelenné teheti a csontépítést. Ezért, mind a műtétet végzőknek, mind a betegeknek, amennyire lehet, ügyelni kell az expozíció megakadályozására, és a kezelt betegeket rendszeresen kell ellenőrizni és kezelni.

6. Egyéb – A részletes adatok megtalálhatók a katalógusokban és a használati útmutatókban.

Figyelme!

• A helytelen betegválasztás és műtét eljárás sikertelen csontépítéshez vezethet.

• A termékét tilos másra használni, mint amit az OSSTEM IMPLANT elő. Semmilyen esetben sem használható műtét kiülv másra célokra.

• Ez előbózt, stéril és nem újrahasználatos orvosi eszköz.

Tárolási feltételek

A termék szűz helyen szobahőmérsékleten tárolja(-30°C). Tartsa távol a közvetlen napfénytől.

Általános óvintézkedések

A foglalkoztatás implantátum művel technológiája egy szakértő, összetett műtétet igényel magába. Az implantátum műtét elővégzéséhez előváros képzés szükséges.

Ellenjavallatok

Ellenjavallatok beleértve az alábbiakat, de nem kizáróan az alábbiakat:

• Pacienstek vérkezőképességgel vagy csont nehézségeivel vagy sebekkel

• Pacienstek ellenőrizhetetlen diabéteszrel, kemény dohányzással vagy alkohollal

• Pacienstek, akiknek az immunrendszerük nem aktív vagy vagy sugárkezelés következtében

• Pacienstek szájüregi fertőzéssel vagy gyulladásal (helytelen száj higiénia, fogcsorgatás)

• Pacienstek kezelhetetlen elzáródással/zúlétt zavarral, nem elegendő fogszórv területtel

• Bármely páciens, aki nem alkalmas operációra

使用说明书 (2022. 05 版本 2.4) - 中文

国内代理人信息
奥齿森 (北京) 商贸有限公司 地址: 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东边708室 电话: 010-51265509 传真: 010-85868705
产品说明
骨科骨粉用钛膜是一种引导牙周组织再生的材料,在口腔内缺损自行骨的部位施行骨粉种植帮助骨增大。这是一种定制的材料非吸收钛膜。(有效期: 5年)

适用范围

本产品为半吸收性移植材料,与种植体配合使用。在下列情况下需下骨并支持牙槽骨骨粉用钛膜材料

使用方法

1. 首先确认牙周缺损部位的形状, 然后选择骨粉所需的大小。1-墙面, 2-墙面, 3-墙面产品系列。

2. 使用探针测量骨缺损部位的高度。水平放置膜, 然后选择骨粉所需的大小。

3. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

4. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

5. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

6. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

7. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

8. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

9. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

10. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

11. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

12. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

13. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

14. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

15. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

16. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

17. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

18. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

19. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

20. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

21. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

22. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

23. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

24. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

25. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

26. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

27. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

28. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

29. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

30. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

31. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

32. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

33. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

34. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

35. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

36. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

37. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

38. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

39. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

40. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

41. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

42. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

43. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

44. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

45. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

46. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

47. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

48. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

49. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

50. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

51. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

52. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

53. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

54. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

55. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止移植材料进入种植体内部的功能。

56. 在骨缺损部位移植适当量的同种骨, 异种骨, 合成骨, 自行骨等。

57. 将骨科骨粉用钛膜装置在基座上, 根据需要, 弯曲或修整骨科骨粉用钛膜后固定, 以确保适合骨缺损部位的状态。

58. 重复将基座固定到骨床来固定骨科骨粉用钛膜。被使用 0.9-Ncm 的扭力。但合使用 0.9 六角螺丝刀, 帽使用 0.9 六角螺丝刀或六角螺丝刀设置。

59. 如果种植体植入较深, 或需要补偿缺损的厚度时, 在选择基座后应将其置于种植体。用 0.9 六角螺丝刀施加 12-15Ncm 的扭力。基座还具有防止

